

40.C.2-91



Monographie
d e r P e t r e f a c t e n

der

Aachener Kreideformation

von

Dr. Joseph Müller,

Oberlehrer am Gymnasium zu Aachen, Ritter des rothen Adler-Ordens IV. Klasse, Mitglied der deutschen geologischen Gesellschaft in Berlin und mehrerer andern gelehrten Gesellschaften und Vereine.

Zweite Abtheilung mit 4 lithographirten Tafeln.

Herausgegeben vom naturhistorischen Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens.

B O N N ,
in Kommission bei HENRY & COHEN.
1 8 5 1 .




Row 33699:1

ETHICS ETH-BIB



0010000628546

470.C.2.-91.



MONOGRAPHIE

d e r P e t r e f a c t e n

DER

AACHENER KREIDEFORMATION

VON

Dr. JOSEPH MÜLLER,

Oberlehrer am Gymnasium zu Aachen, Ritter des rothen Adler-Ordens IV. Klasse, Mitglied der deutschen geologischen Gesellschaft in Berlin und mehrerer andern gelehrten Gesellschaften und Vereine.

Zweite Abtheilung mit 4 lithographirten Tafeln.

Herausgegeben vom naturhistorischen Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens.

Bonn,
in Kommission bei HENRY & COHEN.
1851.

R1992/267:2 q

cat E

29.10.1992

Einleitung.

Erst nachdem die Hauptgrundzüge der Geologie, die mit jedem Tage einen höheren Aufschwung nimmt, durch den nie zu ermüdenden Fleiß und den bewunderungswürdigen Scharfsinn ausgezeichneter Forscher aller Nationen festgestellt worden sind, bleibt es den Monographen vorbehalten, die großen Ergebnisse der Forschung zu erhärten und die vereinzelt Thatsachen mit neuen Beweisen zu belegen. Abgesehen von der Bereicherung der Fauna mit einer Menge bis dahin unbekannter Wesen, ist das genauere Erforschen einer Gegend weit geeigneter, dem Geiste eine klare Vorstellung der Urmeere, welche dieselbe einst durchwogten, und deren Bewohner zu verschaffen, als es eine allgemeine Auffassung der Wissenschaft möglich macht. Wenn wir nach Analogien von den Jetztmeeren auf die Urmeere schließen dürfen, so waren die Bewohner dieser letzteren, nach Verschiedenheit der Wasser-Temperatur, der Tiefe und Beschaffenheit des Meeresgrundes, der Nähe oder Ferne vom Festlande u. s. w. ebenso verschieden, wie die Bewohner der Jetztmeere unter den angegebenen Verhältnissen es heute noch sind. Man kann daher mit Recht und Zuversicht von den Resten einer untergegangenen organischen Welt, welche uns die verschiedenen Formationen in ihrem Schoofse aufgehoben haben, auf die Meere und ihre Beschaffenheit schließen, worin sie einst lebten. Sind doch die Gesetze, nach welchen der Schöpfer die Natur ordnete, ewig und unabänderlich dieselben. Wenn daher Gattungen der Mollusken, welche Küstenbewohner der heutigen Meere sind, sich in einer Lokalität in zahlreichen Arten versteinert vorfinden, so liegt der Gedanke nahe, daß einst ein Meer hier eine Küste bespülte; denn so wie jene Gattungen in den Jetztmeeren nur an den Küsten leben können, in bedeutender Tiefe aber und fern vom Lande verschwinden, so bestanden dieselben Gattungen in dem Urmeere nur unter denselben Verhältnissen. Es erhellt hieraus, wie erspriefslich und nothwendig, ja unentbehrlich dem Paläontologen eine genaue und umfangreiche Kenntniß der lebenden Meeresgebilde ist. Die Gasteropoden, welche der Gegenstand dieser Bogen sind, geben häufig Gelegenheit zu Vergleichen und Schlüssen, wie wir sie oben angedeutet haben.

Die Gasteropoden waren unter den Mollusken der Urwelt ebenso, wie die der Jetztwelt, abgesehen von der weit höheren Stufe der Organisation, zahlreicher an Gattungen und Arten, manchfacher an Form und Gestalt und reicher an äußerer Bildung und Präge, als die Acephalen. Sie reichen vom silurischen Kalk bis in das Tertiäre hinauf, welches allein an die 5000 Species derselben enthält. Bei dem großen Reichthum derselben in allen Formationen hat man

indessen nur sehr wenige als sogenannte Leitmuscheln aufgestellt, vielmehr fast nur Conchiferen, Echinodermen und Ammonoiten als solche gelten lassen; wir sind aber der Meinung, daß die Gasteropoden in dieser Beziehung eine größere Beachtung verdienen und daß man bei genauer Prüfung nicht nur für die großen Formationen, sondern auch für die Schichten derselben charakteristische Species aufstellen könne ¹⁾. Namentlich hat man in der Kreideformation dieselben aus diesem Gesichtspunkte gänzlich vernachlässigt. So finden wir z. B. in Bronn's vortrefflicher *Lethæa geognostica* aus dem Reichthum der Gasteropoden der Kreide nur *Dentalium Mosæ* und eine nicht bestimmte Species *Rostellaria* abgebildet. Wir verkennen dabei nicht, daß von allen Gasteropoden der Kreide wohl $\frac{7}{8}$ erst in dem letzten Dezzennium bekannt gemacht worden sind ²⁾. Die Meinung, daß man dieselben in der Kreide mit erhaltener Bedeckung nicht fände, ist wenigstens für das Aachener Gebiet irrig, denn wir fanden dieselben bei den meisten von uns beschriebenen Species mit der Schale versehen, ja einen großen Theil derselben, wie die chemische Untersuchung herausgestellt hat, vollständig silicificirt. Aus diesem Umstande erhellet, daß die Kieselbildungen in der Kreide wohl nicht bloß von Infusorienschalen herkommen, sondern daß sie auch noch anderen chemischen Prozessen zuzuschreiben sind. Bei den Echinodermen der Kreide finden wir sehr häufig das Innere mit Silex erfüllt, während die äußere Bedeckung noch kalkhaltig ist, bei den silicificirten Gasteropoden ist dagegen das Innere ganz leer oder mit Sand erfüllt, die ganze Schale aber in Silex verwandelt, ohne Zurücklassung von Kalkgehalt. Bei den Echinodermen rührt offenbar die Ausfüllung von Infusorien her, welche hier einst Aufenthalt und Nahrung fanden und deren Schalen eine hyalinische Masse zu Silex verband; allein bei den silicificirten Schalen der Gasteropoden können wir diese Bildung nicht annehmen. Würzchen und Ringe, wie wir sie bei der Verkieselung der Austern und Gryphæen so häufig finden, konnten wir, selbst bei sehr starker Vergrößerung, nicht entdecken ³⁾.

Durch den regen Eifer des rühmlichst bekannten französischen Paläontologen *d'Orbigny* ⁴⁾ ist eine sehr große Anzahl neuer Gattungen und Species aus der Kreideformation Frankreichs beschrieben worden, so daß die Zahl verschiedener Arten für dieselbe bereits 325 beträgt. Die übrigen uns bekannten europäischen urweltlichen Faunen erscheinen dagegen bis jetzt noch dürftig. Bei *Nilsson* finden wir aus der schwedischen Kreide nur 8 Species Gasteropoden beschrieben, aus der böhmischen bei *Reufs* 99, aus der norddeutschen bei *Roemer* 83, aus der

¹⁾ *Deshayes* bemerkt schon (1831) in seiner description de coquilles caractéristiques des terrains, pag. 124, wo er von den Univalven spricht und sie mit den Bivalven vergleicht: les coquilles univalves, plus nombreuses en espèces et en genres donnent aux observateurs des moyens plus fréquens pour reconnaître les terrains.

²⁾ Die sehr empfehlungswerthe Schrift: Grundriss der Versteinerungskunde von *Hans Bruno Geinitz*, Dresden 1846, in welcher die neuesten Forschungen benutzt worden sind, enthält eine größere Anzahl Gasteropoden der verschiedenen Formationen, als andere derartige Arbeiten.

³⁾ Vergl. *L. von Buch* über Silicification organischer Körper in den Verhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1828. p. 43 ssq. — Ebenso *Bronn*, Handbuch einer Geschichte der Natur Band II., pag. 694—712.

⁴⁾ Paléontologie française, Terrains cretacés, Tom. II.



sächsischen bei *Geinitz* 55, aus der rügenschon bei *von Hagenow* 9 und aus der polnischen bei *Pusch* nur 5, zusammen 259 Species, welche sich noch nicht auf die Hälfte reduzieren, wenn man die in den genannten Ländern gemeinsam vorkommenden davon abzieht. Ueber die englische Kreide lag uns nur das Werk von *Fitton* ¹⁾ zur Benutzung vor, worin 49 Arten Gasteropoden beschrieben sind, welche sich zumeist auch in der deutschen Kreide finden. Das kleine Gebiet um Aachen lieferte uns im Laufe der Zeit das Material, die Zahl der aus der vaterländischen Kreide beschriebenen Arten fast um die Hälfte zu vermehren.

D'Orbigny hat sich unter allen Paläontologen am ausführlichsten über die Gasteropoden der Kreide verbreitet und wenn wir auch in vielen Stücken seinen Ansichten beitreten, so müssen wir in manchen andern denselben widersprechen. Die Behauptung pag. 416—417 Tom. II., daß in den fünf Epochen der Kreidebildung, die er annimmt, auch fünf völlige Vernichtungs-Epochen (anéantissement complet) Statt gefunden hätten und keine Species von einer Schichte in die andere übergegangen sei, halten wir für sehr gewagt, zu voreilig und gar nicht begründet. Ebenso wenig können wir der Ansicht beitreten, daß die Gasteropoden sich an Zahl der Species von den untern nach den obern Gliedern der Kreide vermehren pag. 406. Tom. II. Um das Zahlenverhältniß herauszubringen ist er aber genöthigt die beiden untern Glieder der Kreide, das Terrain *aptien* und *neocomien*, so wie die beiden obern das Terrain *sénonien* und *turonien* wieder zu verbinden. Aber auch so stimmen die Zahlen mit der Behauptung nicht; die beiden untern Schichten zählen dann 90, das in der Mitte liegende Terrain *aptien* oder der *Gault* enthält nur 77 und die folgenden beiden obern Schichten weisen zusammen 158 Arten auf, wovon aber auf die oberste Schichte, die weiße Kreide nur 24 kommen. Später hält *d'Orbigny* die Kreide wieder in 5 Epochen auseinander und widerlegt dadurch seine eigene Behauptung. Wir sind, so weit uns die Kreide aus Schriften und auf Reisen nach eigener Forschung bekannt geworden ist, zu der festen Ueberzeugung gelangt, daß die mächtige Schichte der sogenannten weißen Kreide am dürtigsten mit Gasteropoden versehen ist. Wir weisen hier auf das oben angegebene Zahlenverhältniß der schwedischen, rügenschon, polnischen und französischen Kreide zurück und finden die ausgesprochene Ueberzeugung durch die Schichten bei *Vaels* und *Henry-Chapelle* noch bestärkt.

Auf Seite 422—423 versucht *d'Orbigny* für seine fünf Kreideepochen Gattungen aufzustellen, welche dieselben charakteristisch bezeichnen sollen. Auch den dort ausgesprochenen Behauptungen müssen wir entgegengetreten, lassen aber als Widerlegung die nachstehenden Species selbst reden und führen hier nur beispielweise an, daß *d'Orbigny* bemerkt, die Gattung *Phorus* sey bezeichnend für die obere weiße Kreide (Terrain *sénonien*) und käme in der tiefern Schichte (Terrain *turonien*) nicht vor. Diese Behauptung widerlegt das unbezweifelte Vorkommen von *Phorus* in unserem Grünsand auf das entschiedenste, den wir doch nach allen darin vorkommenden Petrefakten und namentlich nach seinen Gasteropoden nicht zur obern weißen Kreide zählen können, wozu wir aber die *Vaelser Mergel* rechnen, in welchen nur äußerst wenige

¹⁾ Observations on some of the strata between the Chalk and Oxford Oolite, in the South-East of England. London. 1836.



Species derselben vorkommen. Mit Sicherheit ist daraus nur zu bestimmen *Pleurotomaria linearis*, Mantell. (*Pl. plana* Münster bei Goldf. Tab. 187, Fig. 4. pag. 76, III.) Dasselbe ist der Fall mit den Horn- und Feuersteinen des Aachener Waldes, welche wir demnach nach paläontologischen Grundsätzen mit den Mergeln für gleichalterig halten.

Ehe wir zur Beschreibung der Gattungen und Species übergehen, möchten wir noch einen Grundsatz aufstellen, zu dessen Unterstützung unsere Arbeit einige Beiträge liefert. Wir sind nämlich der Ansicht, daß Gattungen, welche in einer ältern Formation und dann erst wieder im Tertiären auftreten auch in der Kreide ihre Repräsentanten haben, wenn sie auch bis jetzt in derselben noch nicht aufgefunden wurden. Denn die Natur sucht überall Uebergänge und duldet keine gewaltsame Sprünge. Wenn *Helix*, *Bulla* u. s. w. im Jura nicht selten vorkommen und im Tertiären außerordentlich häufig werden, so müssen diese Gattungen auch ihre Vertreter in der Kreide haben, wenn wir die Richtigkeit der Gattungsbestimmungen in der ältern Formation nicht bezweifeln wollen. Wie schwer es ist, namentlich bei verwandten Gattungen mit Sicherheit das richtige Genus zu bestimmen, zumal, wenn das Innere des Petrefaktes nicht bloß zu legen ist, wissen die Paläontologen und Conchiliologen aus eigener Erfahrung. Wer ist im Stande *Fusus*, *Pleurotoma*, *Pirula* u. a. mit Bestimmtheit zu unterscheiden, wenn die Mundöffnung im Gestein sitzt und das Petrefact uns gleichsam den Rücken zuwendet? So weit es möglich war, haben wir daher, nicht ohne Aufopferung mancher Exemplare, das Innere der Petrefacten bloß gelegt, und wo dies nicht thunlich war es bei der Beschreibung jedesmal angegeben. Viele Steinkerne, welche uns zur sichern Bestimmung der Gattung nicht Anhaltspunkte genug darboten haben wir auf Seite gelegt um die Wissenschaft nicht mit Namen zu behelligen, die oft nur zu bald eine Last für weitere Forschungen werden, wie dies leider jetzt schon in der Paläontologie nur zu häufig der Fall ist. Bei sehr vielen der bekannten Species konnten wir autoptische Vergleiche anstellen, bei andern mußten wir uns auf die naturgetreuen Zeichnungen und gewissenhaften Beschreibungen verlassen. Sollten wir trotz aller Sorgfalt hin und wieder geirrt haben und etwas bekanntes für neu hingestellt haben, so mag der Umstand uns entschuldigen, daß uns außer unserer Sammlung und Bibliothek nur noch geringe Hilfsmittel zu Gebote standen. Was die Terminologie betrifft, so haben wir die von *Lister* eingeführte und von *d'Orbigny* ¹⁾ befolgte Bezeichnung nicht angenommen, sondern uns nach *Linné*, *Lamarck* ²⁾ und den deutschen Paläontologen gerichtet und die Windung mit der Mundöffnung als die unterste und die entgegengesetzte mit der Spira als die oberste bezeichnet.

¹⁾ Paléontologie française, terrains cretacés Tom. II. pag. 7.

²⁾ Animaux sans vertèbres Tom. VII. ssq.



GASTEROPODA, CUVIER.

Bauchfüßer.

(Einkammerige Schnecken.)

Dentalium, ¹⁾ Linné.

1. *D. glabrum*, Geinitz. Tab. 18, fig. 18, pag. 74. — Dessen Nachtrag ²⁾ Tab. 1, fig. 27, pag. 11.

Die Röhre ist ganz glatt, wohl erhalten erscheint sie 'glänzend und fast durchscheinend. Sie ist nur wenig gebogen und im Durchschnitt fast rund. Kommt nicht selten vor am Lusberg und im Grünsand bei Vaels.

2. *D. ellipticum*, Sow. Bei Reufs Tab. 11, fig. 20, pag. 41, I.

Kommt wie die meisten Dentalien nur in Bruchstücken vor und sind wir zu der Ansicht geneigt, daß dieses Petrefact wohl zu *Serpula* gehören möchte. Fundort wie bei der vorstehenden Species.

3. *D. alternans*, Müller. Tab. 3, fig. 1, a—b.

Hat beim ersten Anblick Aehnlichkeit mit *D. striatum* Sow., unterscheidet sich aber von demselben ganz wesentlich. Unsere Species ist der Länge nach mit erhabenen, gedrängt stehenden Linien versehen, wovon immer zwei stärkere eine schwächere erfassen. Die Zwischenräume sind glatt ohne alle Querlinien. An dem unteren Ende sind die abwechselnden Linien plötzlich durch einen Ring abgeschnitten, unter welchem in geringer Entfernung ein zweiter steht. Von dem ersten Ringe bis zur Basis befindet sich eine große Anzahl gleichförmiger, dicht gedrängter, feiner Längslinien. Die Länge beträgt 3'' und mehr; die stärkere Biegung ist in der obern Hälfte. Kommt nur selten mit erhaltener Bedeckung vor dem Königsthore ³⁾ vor.

¹⁾ Was die Einreihung der Gattung *Dentalium* in die Gasteropoden betrifft, so verweisen wir auf die Monographie derselben von Deshayes in den mémoires du mus. d'hist. nat. 1825. Ebenso auf die Schrift desselben Descript. de coquilles caractéristiques des terrains pag. 125. — Lam. anim. sans vertèbres Tom. V pag. 588.

²⁾ Die Versteinerungen von Kieslingswalda und Nachtrag zur Charakteristik des sächsisch-böhmischen Kreidegebirges. Dresden und Leipzig 1843.

³⁾ Um Irrthümern zu begegnen müssen wir bemerken, daß wir mit diesem Namen in Zukunft die Lokalität bezeichnen werden, welche wir in dem ersten Theile unserer Monographie und an andern Orten *Schindanger* nannten. Der Ort hat nämlich in den letzten Jahren seine Bestimmung verloren und führt durch denselben jetzt ein schöner Weg nach Septfontaines und Melaten. Die dort aufgeschlossene Sandgrube



4. ? *D. rugosum*, Müller. Tab. 3, fig. 2.

Die Schale dieser Species ist sehr dünn und zeigt auf der ganzen Oberfläche unregelmäßige Querfalten. Vollständig erhaltene Exemplare besitzen wir von dem Petrefact nicht, und ist es möglich, daß dasselbe sich später als *Serpula* ausweist. Bei Bruchstücken, welche den obern Theil mit der Biegung nicht haben, bleibt es immer zweifelhaft, ob sie zu *Dentalium*, *Serpula* oder gar zu *Fistullana* gehören; von letzterer Gattung sind solche Bruchstücke oft nur der verschmälerte Theil des offenen Endes. Bis jetzt kommt die Species nur am Lusberg vor.

5. *D. Mosae*, Bronn. Leth. geogn. Tab. 33, fig. 18. — Besser bei *Goldfufs* Tab. 166, fig. 10. a—c. pag. 2. III.

Nur bei Vetschau und in dem Gerölle über der obersten Mergelschichte auf dem Lusberg, worin zugleich die Vetschauer und Mastrichter kleinen Korallen, Fischzähne und Bruchstücke von Zähnen des *Mosasaurus Hoffmanni* nebst Schnecken der Quaternärbildung und Bruchstücken von Knochen noch lebender Thiere vorkommen. Das bezeichnete Gerölle mit seinen Petrefacten befindet sich demnach offenbar auf sekundärer Lagerstätte, denn weder in dem Grünsand des Lusbergs noch bei Vaels, noch in den anstehenden Mergeln kommt dies Petrefact vor. Noch augenfälliger wird dieser Umstand durch die häufigen Reste zweier Species von *Cervus*, welche die oft tiefen Spalten und Klüfte der unterliegenden Mergel mit diesem Gerölle erfüllen.

Vermetus, Adanson.

1. *V. cochleiformis*, ¹⁾ Müller. Tab. 3, fig. 3. a—b.

Im Ganzen sind nur sehr wenige Species dieser Gattung bekannt und bis jetzt aus der deutschen Kreide noch keine, es freut uns daher um so mehr diese neue Species in einem vollständig erhaltenen Exemplar gefunden zu haben, was bei der großen Zerbrechlichkeit des Gehäuses immer zu den Seltenheiten gehört. Das niedliche Gebilde gleicht einer zugespitzten Schraube in Form des obern Theiles eines Korkziehers. Die Windungen laufen sehr schräg und stehen weit voneinander ab. Das Ganze ist mit feinen doch scharf markirten Querlinien bedeckt. Die Mundöffnung ist kreisrund. Kommt im Grünsand vor Königsthor, am Lusberg und bei Vaels vor.

mit ihren Muschelschichten gehört zu den reichsten Fundorten von Petrefacten und zeigt den Geologen die Lagerungsverhältnisse der hiesigen Kreide sehr deutlich. Wir haben uns zu dieser Anmerkung um so mehr veranlaßt gefühlt, weil wir sehen, daß die Benennung *Schindanger* bereits in auswärtigen Schriften übergegangen ist.

¹⁾ Es gibt wohl kaum eine Zusammensetzung, welche in den Naturwissenschaften so häufig vorkäme, wie die Bildungen mit *formis*. Die Regel, daß bei solchen Zusammensetzungen das Substantivum ohne Rücksicht auf die Deklination auf ein kurzes *i* ausgeht, wird dabei sehr häufig namentlich bei den Substantiven der ersten Deklination vernachlässigt, indem *ae* statt *i* gesetzt wird z. B. *squamaeformis*, *chamaeformis*, *alaeformis*, *mitraeformis*, *limaeformis* und viele andere in den neuern Schriften. Bei *Linné* u. a. sorgfältigern Schriftstellern finden wir sprachrichtig *araneiformis*, *limiformis*, *harpiformis*, *aliformis* u. s. w. Bildungen wie *borealiformis*, *nodosiformis* *rugosaeformis* sind gar nicht zu rechtfertigen.

Bulla, Linné.

1. *B. cretacea*, Müller. Tab. 3, fig. 4. a—c.

Aus der europäischen Kreide ist bis heute noch keine Species dieser Gattung nachgewiesen, ¹⁾ obgleich aus dem Oolithengebirge ²⁾ bereits eine Anzahl derselben beschrieben ist. Im Tertiären mehren sich die Arten außerordentlich und überragen die noch lebenden um mehr als das Doppelte.

Das Gehäuse ist cylinderförmig, lang gestreckt, nach unten nur wenig aufgetrieben, ohne alles sichtbare Gewinde, mit tiefem Nabel. Die Mundöffnung ist so lang als das ganze Gehäuse. Der Mundrand glatt, scharf, ragt nach oben noch etwas hervor und erweitert sich ein wenig nach unten. Die Schale äußerst dünn und ihre ganze Oberfläche mit höchst zarten, dichtgedrängten Querlinien versehen. Das Petrefact kommt vor am Lusberg, vor dem Königsthor und im Grünsand bei Vaels.

Scalaria, Lamarck.

1. *Sc. pulchra* Sow. bei Fitton Tab. 18, fig. 11. pag. 343.— Weniger gut bei Geinitz Tab. 15, fig. 14—15 pag. 45.

Diese Species war lange die einzige aus der europäischen Kreide beschriebene. *D'Orbigny* pag. 50 und pag. 59. II. behauptet die Gattung trete erst in der Kreideformation auf, *Roemer* fand aber *Sc. Münsteri* im Coral rag und nicht Eine Species in der Norddeutschen Kreide. Graf *Münster* beschreibt sogar eine *Sc. antiqua* aus dem devonischen Kalk. Bis dahin stehet diese Species noch vereinzelt da und es ergibt sich nach den neuesten Forschungen, daß die Gattung in der Kreide erst eine bedeutendere Anzahl Arten entwickelt.

Das Gehäuse von *Sc. pulchra* ist thurm förmig, besteht aus 8—9 convexen, ziemlich breiten Windungen, welche der Länge nach mit stark hervortretenden, stumpfen, wenig gebogenen Rippen (15) versehen sind. Die Rippen der untern Windungen sind der Länge nach gespalten. Dieselben stehen genau übereinander. Zwischen ihnen ist die Schale völlig glatt. Im Ganzen hat das Petrefact sehr große Aehnlichkeit mit *Scalaria vulgaris* Lin. Es findet sich selten vor dem Königsthor und am Lusberg.

2. *Sc. striatocostata*, Müller. Tab. 5. fig. 3.

Diese Species unterscheidet sich von der vorhergehenden durch folgende Merkmale. Die Längsrippen sind schmaler, treten nur sehr schwach hervor, sind halbmondförmig gebogen und stehen weit enger zusammen, als bei jener. Zwischen den Rippen laufen dichtgedrängte Querlinien, welche mit denselben ein zartes Netz bilden. Nach der Spitze hin verlieren sich die Rippen

¹⁾ In Mortons Synopsis of the organic remains of the cretaceous Group of the united states. Illustrated by XIX plates. Philadelphia 1834, finden wir pag. 46 Steinkerne von *Bulla* aus der Kreide erwähnt jedoch ohne Beschreibung und Abbildung. Es heißt dort wörtlich: 1. Casts not very unlike *Bulla lignaria*. From New Jersey. Und 2. A solitary cast of a large, ventricose species was found in Alabama. — Die ad 1. angeführten Steinkerne werden wohl die *Bulla Mortoni* Lyell sein, welche in der 81. Lieferung der Naturgeschichte der drei Reiche pag. 486. verzeichnet ist.

²⁾ Siehe die Einleitung pag. 4.

fast gänzlich, bei *Sc. pulchra* sind dieselben noch deutlich zu erkennen. Die einzelnen Umgänge sind kugelförmig, die Nähte weniger tief als bei der vorhergehenden Species.

3. *Sc. Philippi*, Reufs. Tab. 44, fig. 14. pag. 124. II.

Die Abbildung ist genau, der Beschreibung ist nichts zuzufügen. Das Petrefact ist nicht ganz selten im Grünsand bei Vaels.

4. *Sc. macrostoma*, Müller. Tab. 3. fig. 7. a—b.

Diese Species steht in der Mitte zwischen der vorhergehenden Art und der *Scalaria Rauliniana* bei *d'Orbigny* Tab. 155, fig. 1—4. pag. 57—58., unterscheidet sich indessen augenfällig von beiden. Sie hat förmlich die Gestalt eines Turbo mit 4 bis 5 niedergedrückten, bauchigen, stark gerundeten, verhältnismässig schmalen Windungen, welche fest aneinander schliessen. Jede derselben ist mit zahlreichen Längsrippen versehen, welche mit vielen zarten Querlinien durchkreuzt werden, die im Durchschnittspunkte Knötchen bilden. Die Mundöffnung ist im Verhältniss zum Ganzen groß, völlig rund und mit einem breiten, ganz glatten, dicken Rande versehen, der nach Ausen sich umschlägt und einen Wulst bildet. Wir besitzen bis jetzt nur Ein Exemplar aus dem Grünsand bei Vaels.

Rissoa, Fréminville.

1. Turbiniformes, d'Orbigny.

1. *R. costata*, Müller. Tab. 3, fig. 5.

Das Petrefact nähert sich der Form von *Buccinum*; wir haben die Mundöffnung nicht ganz blofs legen können, der starke Wulst des Mundsauces und der ganze Habitus bewog uns indessen, dasselbe hierher zu stellen. Das Gehäuse besteht aus 4—5 bauchigen Windungen, welche mit schwach hervortretenden Längsrippen versehen sind. Zwischen diesen und über dieselben laufen feine Querlinien. Der sehr verdickte Mundsauum ist fast glatt. Findet sich vor dem Königsthor.

2. Melanoides, d'Orbigny.

2. *R. Winkleri*, Müller. Tab. 3, fig. 6 a—b.

Das Gehäuse hat ganz die Form einer *Melania*, es besteht aus 8 nur schwach gewölbten Windungen, welche dem unbewaffneten Auge glatt erscheinen, unter der Lupe aber schwache Längsfalten zeigen, die auf dem untersten Umgang ganz deutlich hervortreten. Der Wulst auf demselben ist stark umgeschlagen, hoch aufliegend und beträgt $\frac{1}{3}$ der Breite der ganzen Windung, er wird von regelmässigen Längsfalten gebildet. An der Spindel befindet sich eine gewundene, sehr erhabene, breite Schwielle, welche oben und unten mit dem äussern Saume zusammenfließt. Die Mundöffnung ist halbmondförmig, länglich gezogen. Herr *Winkler*, dem wir unser Exemplar verdanken, fand das Petrefact im Aachener Walde im Sandstein.

Eulima, Risso.

Auch diese Gattung vermifsten wir bis jetzt in der Kreideformation; *d'Orbigny* beschrieb zuerst Pag. 64—68, II. vier Species derselben aus der Kreide Frankreichs. Die Gattung hat am

meisten Aehnlichkeit mit *Melania*. Bei *Lamarck* in der zweiten Ausgabe von *Deshayes* und *Milne Edwards* Tom. VIII, pag. 449—456 ist dieselbe daher bei *Melania* als besondere Gattung eingeschoben.

1. *Eu. acuminata*, Müller. Tab. 3, fig. 8. a—c.

Das kleine, niedliche Gehäuse ist thurmförmig und besteht aus 7 Windungen, welche sich mit fast unbemerkbaren Nähten aneinander schliessen und allmählig in eine Spitze auslaufen. Die Windungen sind bauchig und unterscheidet sich die Species dadurch schon von *Eu. albensis* *d'Orb.* Tab. 155, fig. 14—15 pag. 64—65. Die Mundöffnung ist länglich rund, der Mundrand scharf. Die Spindel, so wie das ganze Gehäuse sind vollkommen glatt. Das Petrefact ist durchscheinend und bei seiner Zartheit und äusserst dünnen Schale so vollkommen erhalten, dass die Ansicht *d'Orbigny's*, als hätte diese Schneckengattung im Innern von Asterien gelebt, wie dies bei *Stilifer*, *Sowerby* der Fall ist, sich auch uns aufdrängt. Selten im Grünsand bei Vaels.

2. *Eu. lagenalis*, Müller. Tab. 3, fig. 9. a—b.

Die Gestalt des Gehäuses ist flaschenförmig. Es besteht dasselbe aus 6 Windungen, von welchen die unterste so groß ist, als das ganze übrige Gewinde. Dieser unterste Umgang ist bauchig, stark aufgeblasen, der zunächst folgende noch schwach convex und die 4 übrigen Umgänge fast flach. Diese letztern, welche gleichsam den Hals der Flasche bilden, verschmälern sich sehr rasch und stehen etwas gebogen, was mit zu den charakteristischen Zeichen der Gattung gehört. An den Nähten der beiden untersten Windungen sind schwache Rinnen bemerkbar. Die Oberfläche ist durchaus glatt. Findet sich mit der vorstehenden Species zusammen, bis jetzt nur sehr selten.

Chemnitzia, d'Orbigny.

1. *Ch. Kochi*, Müller Tab. 4, fig. 7. a—b.

Das Gehäuse ist thurmförmig und besteht aus 10—11 Windungen, welche nur schwach gewölbt sind; die unterste derselben ist am breitesten, jede der folgenden verschmälert sich verhältnismässig und nur nach der Spitze hin ist die Abnahme der Breite plötzlicher. Die Nähte zwischen den Windungen sind schmal, jedoch scharf markirt. Das ganze Gehäuse ist mit äusserst zarten, sehr dicht gereihten, gleich starken Querlinien bedeckt, (etwa wie bei *Cyclostoma elegans*, nur dass jene Linien dichter und feiner sind) am Mundrande zeigen sich einige Querspalten. Die Höhe des Petrefactes beträgt 10^{'''} Rh. Fundort: Vaelsbrug im Grünsand und am Lusberg.

Pyramidella, Lamarck.

1. *P. involuta*, Müller. Tab. 3, fig. 10.

Das Gehäuse ist schlank, thurmförmig und besteht aus 6 Windungen, welche durch tiefe Nahtfurchen von einander getrennt sind und sich gar nicht berühren. Die Windungen erscheinen daher becherförmig in einander geschoben. Die unterste Windung ist die längste und nehmen die folgenden an Dicke und Breite ganz allmählig ab, was die Gattung noch als bezeichnendes äußeres Merkmal von *Actæon* unterscheidet. Die Oberfläche der Windungen ist mit scharf mar-

kirten, kahlen Gürtelchen bedeckt, zwischen welchen tiefe Rinnen liegen. Wir fanden bis jetzt nur ein vollständiges Exemplar am Lusberg.

Volvaria, Lamarck.

1. *V. tenuis*, Reufs. Tab. 10, fig. 20. pag. 50. I.

Das Gehäuse ist cylindrisch, aufgeblasen, oben und unten kaum merkbar verschmälert. Das Gewinde ist nach innen aufgerollt, so daß der Rand des äußersten Umganges etwas hervortritt und die übrigen vertieft liegen. Unsere Steinkerne zeigen noch schwach die feinen Querlinien, womit die Oberfläche bedeckt war. Die Spindel haben wir nicht sehen können. Das Petrefact kommt sehr selten am Königsthore vor.

Actaeon, 1) Montfort.

Tornatella, Lamarck; auctororum.

Wenn *d'Orbigny* pag 125. II. der Ansicht ist, daß die Gattung *Actæon* dem *Néocomien* besonders eigen und in der chloritischen Kreide kaum vertreten sei, so widersprechen unsere Resultate dieser Meinung gar sehr, denn grade an Species dieser Gattung ist unser Grünsand reich.

1. *A. giganteus*, Sow.

Tornatella gigantea Sow. Bei Goldf. Tab. 177, fig. 12, pag. 48. III.

Das Gehäuse ist eiförmig, bauchig, glatt, die unterste Windung ist dreimal so hoch, als das übrige Gewinde, welches kegelförmig in eine Spitze ausläuft. An der Spindel sind drei starke, schräglauende Falten, wovon die oberste stärker hervortritt und doppelt so weit von den beiden tiefern entfernt liegt, als diese unter sich voneinander stehen. Wir fanden vier Exemplare völlig silicificirt im Sande des Aachner Waldes, von welchen das gröfsere mit vollkommen erhaltener Spindel die Zeichnung bei *Goldfufs* noch um die Hälfte an Gröfse übertrifft.

2. *A. affinis*, Sow.

Tornatella affinis, Sow. bei *Fitton*. Tab. 18, fig. 9, pag. 343.

Nur die Figur in natürlicher Gröfse rechts ist vollkommen naturgetreu.

Tornatella affinis, *d'Orbigny*. Tab. 167, fig. 4-6, pag. 117 gehört nicht hierher, sondern bildet eine neue Species. *Fitton* selbst setzt pag. 242 ein Fragezeichen hinter *Tornatella*, wir haben uns indessen durch Exemplare, die nichts zu wünschen übrig lassen, völlig überzeugt, daß *Sowerby* die Gattung richtig erkannt hatte, wir haben nur den ältern Namen derselben hergestellt. Das Gehäuse ist oval, besteht aus fünf Windungen, die in eine Spitze auslaufen. Die unterste derselben ist nur um etwas gröfser, als das übrige Gewinde. Alle Umgänge sind mäfsig gewölbt. Die Schale ist mit Querrippchen versehen, zwischen welchen sich Furchen befinden, in denen scharf markirte, höchst regelmäfsige Längslinien viereckige Vertiefungen bilden. Die Mundöffnung ist ohrförmig, der Mundrand platt; auf der Spindel stehen zwei starke Falten in

1) Nicht *Actæon* wie bei *d'Orbigny* u. a. Vergl. *Herrmannsen indicis generum malacozoom vol. I. pag. 16*



ziemlich starker Entfernung von einander, wovon die untere stärker ist, als die obere. Wenn *Sowerby* die untere Falte doppelt nennt, so beruht dies wohl nur auf einem Irrthum. Kommt am Lusberg und im Grünsand bei Vaels vor.

3. *A. Doliolum*, Müller. Tab. 3, fig. 11.

Die Gestalt dieses *Actaeons* ist eiförmig-kegelig, die unterste Windung ist stark aufgetrieben und doppelt so lang als das übrige Gewinde, welches von derselben durch eine tiefe Naht getrennt ist und noch aus vier nur schwach gewölbten etwas niedergedrückten Umgängen besteht. Die Oberfläche ist mit Querlinien in regelmäßigen Abständen geziert. Diese Species hat Aehnlichkeit mit *Tornatella pulla* (*Actaeon pullus*) *Dunker* und *Koch* Tab. II, fig. 11 a—c, pag. 33, die nur 2''' groß ist. Vollständig erhaltene Exemplare sind höchst selten, Bruchstücke und Steinkerne häufiger vor Königsthor und am Lusberg.

4. *A. cylindraceus*, Müller. Tab. 3; fig. 12.

Das Gehäuse ist schlank, walzenförmig, besteht aus fünf Windungen, welche sich nur ganz allmählig verschmälern, nur wenig gewölbt sind und bei den Steinkernen wie übereinander geschobene Cylinder erscheinen. Die unterste Windung ist nicht völlig doppelt so lang, als das übrige Gewinde. Die Schale ist mit zarten, etwas rückwärts gebogenen faltenartigen Längslinien versehen, welche von regelmäßigen Querlinien durchkreuzt werden. Vor dem Königsthor und am Lusberg.

5. *A. bulliformis*, Müller. Tab. 5, fig. 4.

Diese Species ist länglich-oval und erinnert sehr an *Bulla spirata* *Roemer* aus dem obern *Coral rag* Tab. 9, fig. 32, pag. 137. Das Gehäuse endet oben und unten in eine Spitze. Die unterste Windung ist mehr, als doppelt so lang, als die drei übrigen Umgänge zusammen, dazu mächtig stark aufgeblasen, während die übrigen Windungen nur schwach convex sind. Die Oberfläche ist mit feinen Querlinien bedeckt. Kommt an denselben Fundorten mit den beiden vorstehenden Species vor.

6. *A. acutissimus*, Müller. Tab. 3, fig. 13.

Das Bild stellt das Petrefact etwas vergrößert dar. Das Gehäuse besteht aus sechs Windungen, die unterste derselben ist bauchig viel länger, als die übrigen fünf zusammen, welche sich rasch verschmälernd in eine scharfe Spitze enden. Dieselben sitzen wie ein Kegel auf der untersten Windung. Die Oberfläche ist mit feinen Querlinien versehen. Die Spindel haben wir nicht sehen können, vielleicht wird diese Species sich später als zu *Actæonella* gehörend ausweisen. Wir fanden das Exemplar am Lusberg.

7. *A. coniformis*, Müller. Tab. 3, fig. 14.

Diese Species erinnert sehr an *Conus*, sie ist eiförmig. Die unterste Windung ist sehr bauchig, dreimal so lang, als das übrige Gewinde, das aus drei schwach convexen Umgängen besteht. Nach den Hohlabdrücken war die Schale sehr fein querliniirt. Auch hier haben wir die Spindel nicht bloß legen können. Findet sich beim Königsthor und am Lusberg.

Avellana, d'Orbigny.

Cassis, Auricula auctorum.

1. *A. Archiaciana, d'Orbigny.* Tab. 169, fig. 7—9. pag. 137. II.

Das Gehäuse ist oval, bauchig; es besteht aus vier stark convexen Windungen, von welchen die unterste $\frac{3}{4}$ der ganzen Schnecke ausmacht. Alle Windungen sind mit Querrippen versehen, die unterste zählt deren 22—24, zwischen diesen liegt eine gleiche Anzahl Querrillen, in welchen sich dicht gereihte, vertiefte Punkte befinden. Die feinen Längslinien auf den Rippchen, deren *d'Orbigny* erwähnt, vermögen wir nicht zu erkennen. Der Mundsaum ist mit einem breiten, nach außen umgeschlagenen, glatten Wulst versehen. Das Innere haben wir bis jetzt ebensowenig wie *d'Orbigny* sehen können. Nicht selten vor dem Königsthor, am Lusberg und im Aachner Wald. Von letztem Fundort ist auch das Exemplar, welches *d'Orbigny* beschreibt, wobei er aber den Aachner Wald nach Belgien verlegt.

2. *A. paradoxa, Müller.* Tab. 3, fig. 17. a—b.

So lange es uns nicht gelungen war, das Innere dieser Species völlig bloß zu legen, und ganz deutlich und bestimmt die Bezahnung, wie die Figur 17 sie genau darstellt, zu sehen, haben wir dieselbe für *Avellana cassis d'Orbigny.* Tab. 169, fig. 10—13, pag. 138 gehalten. Und in der That vermögen wir, bei der sorgfältigsten Untersuchung und der gewissenhaftesten Vergleichung beider Species, im Aufsern derselben keine Verschiedenheit aufzufinden. Vielleicht würde eine autoptische Vergleichung auch hier kleine Unterscheidungs-Merkmale ergeben. Das Innere unserer Species ist indessen von der *A. cassis* völlig verschieden.

A. paradoxa ist bauchig, oval doch mehr kugelförmig, als *A. Archiaciana*. Sie besteht aus vier flachconvexen Windungen, von welchen die unterste fast $\frac{3}{4}$ der ganzen Schnecke ausmacht. Das Gehäuse ist mit Querrippen besetzt, zwischen denen sich Furchen bilden, in welchen sich ziemlich dicht gereihte, etwas vertiefte Längslinien oder Streifen in größter Regelmäßigkeit ausprägen. Die Schale ist dick. Der Wulst am Mundrande ist breit, mit starken Längsfalten versehen, nach Außen stark umgeschlagen. An der Spindel sind drei starke Zähne, wovon der mittlere der stärkste ist; eine gleiche Anzahl Zähne und fast von gleicher Stärke stehen auf der entgegengesetzten innern Lippe. Der Spindel entlang befindet sich eine Schwiele. Die Mundöffnung ist ohrförmig. Wegen der abweichenden Bezahnung von allen bis jetzt bekannten Avellanen nannten wir diese Species *paradoxa*. Wir fanden das Petrefact vor Königsthor.

4. *A. Humboldti, Müller.* Tab. 3, fig. 15. a—c.

Das Gehäuse ist oval, bauchig, besteht aus vier convexen Windungen, wovon die unterste stark aufgetrieben ist. Ueber dasselbe laufen ziemlich breite, schwach gekörnte Querrippen, zwischen denen tiefe, platte Furchen liegen. Außerdem sind für diese Species noch charakteristische Merkmale der am Mundrande nach außen schwach umgeschlagene Wulst, welcher von oben nach unten allmählig breiter wird und fast glatt ist. An der Spindel, die mit einer schwachen Schwiele bedeckt ist, befinden sich 2 Zähne, von welchen der untere der stärkere ist. Die der Spindel entgegenstehende Lippe scheint sehr schwach bezahnt gewesen zu sein.



Mit erhaltener Bedeckung nur im Grünsand bei Vaels, als Steinkerne vor Königsthor und am Lusberg.

A. A. Hagenowi, Müller. Tab. 3, fig. 16. a—b.

Diese Species hat Aehnlichkeit mit *Ringinella inflata* d'Orbigny. Tab. 168, fig. 1—4. pag. 128. II. sie ist aber eine wirkliche *Avellana*. Das Gehäuse ist länglich oval, etwas kegelförmig; es besteht aus 5 convexen Windungen, von welchen die unterste aufgetrieben, bauchig und noch etwas länger, als das übrige Gewinde ist. Zarte Querrippchen bedecken das Ganze, dieselben verschwinden aber immer mehr nach der Spitze, so daß die obern Windungen fast glatt erscheinen. Zwischen den Rippen sind feine Furchen in denen bei starker Vergrößerung sich tiefliegende Punkte zeigen. Der Wulst des Mundrandes ist glatt, im Verhältniß zum ganzen Gehäuse breit. An der Spindel stehen 2 Zähne nach Art der Gattung *Actæon*, die entgegenstehende Lippe ist aber mit 8 scharf hervortretenden ziemlich gedrängt stehenden Zähnen versehen. Exemplare mit abgebrochenem Wulste und diesen Zähnen sind daher von *Actæon* nicht zu unterscheiden. Nicht gar selten am Lusberg, vor dem Königsthor und im Grünsand bei Vaels.

***Globiconcha*, d'Orbigny.**

D'Orbigny pag. 143. II hält für wesentliche Unterscheidungs-Merkmale dieser Gattung von den andern der Familie der *Actæonideen* den Mangel der Falten und der Zähne auf der Spindel und der entgegengesetzten Lippe. Außerdem die kugelförmige Gestalt und der eigenthümliche Habitus des Gehäuses. *D'Orbigny* beschreibt 4 Species dieser Gattung, von welchen er indessen bis jetzt nur Steinkerne fand, wir selbst waren nicht glücklicher, als er. Eine zuverlässige Diagnose der Gattung vermögen wir daher ebenfalls nicht aufzustellen und nehmen vorläufig die mehr negative des Auctors derselben an, obgleich wir geneigt sind der Ansicht von *Geinitz* beizutreten, der sie mit *Actæon* vereinigt. *D'Orbigny* bezeichnet die Gattung als charakteristisch für die chloritische Kreide. (Terrain turonien.)

G. nana, Müller. Tab. 3, fig. 18. a—b.

Das Gehäuse dieser Species ist fast kugelförmig, beinahe so breit als lang; es besteht aus 4 Windungen, von denen die 3 obern nur schwach über die unterste hervortreten, welche letztere sehr bauchig und aufgeblasen ist. Der Mundrand ist nach Innen gebogen. Die Bedeckung der Schale, welche wohl sehr dünn gewesen sein muß, scheint uns nach Andeutungen auf dem Steinkern mit Querlinien bedeckt gewesen zu sein. Bis jetzt nur selten am Königsthor.

***Naticidae*, d'Orbigny.**

a. *Natica*, Lamarck.

1. *N. canaliculata*, Sow.

Sowerby bei *Fitton*. Tab. 11, fig. 12. a—c und Tab. 18, fig. 6, pag. 336.

Geinitz. Tab. 15, fig. 25 (Steinkern), fig. 26 (verdrückter Steinkern), pag. 47.

Reufs. Tab. 11, fig. 1, pag. 49. I und 113—116. II.

Natica Gaultina, d'Orbigny. Tab. 173, fig. 3—4, pag. 156. II.

Diese Species ist bezeichnend für die Kreideformation. Mit Unrecht beschränkt *d'Orbigny* ihr

Vorkommen auf den Gault; *Fitton* fand sie im Gault und im Grünsand von Blackdown, *Reufs* in verschiedenen Schichten, auch im untersten Quader ¹⁾ von Thyssa; *Geinitz* im Pläner von Strehlen und *Roemer* im oberen Kreidemergel bei Quedlingburg und Dülmen. Nach unserer Ansicht ist diese Art charakteristisch für die mittlere der drei Kreide-Epochen. Vollwachsene Exemplare mit erhaltener Bedeckung sind selten, dann aber auch leicht von allen anderen Species zu unterscheiden. Die breite Rinne vor der Naht auf der untersten Windung, welche nach Aufsen durch eine vorstehende Kante begränzt wird, zeichnet diese Species besonders aus. Die gröbern und feinern, gedrängten Längslinien, welche die Oberfläche bedecken, hat sie mit mehreren Arten gemein; daß diese Linien aber in der Rinne fast quer laufen und sich dann bedeutend rückwärts biegen und stärker hervortreten, ist ebenfalls characteristisch. Es ist dies in den Zeichnungen bei *Reufs* und *Fitton*, doch nur Tab. 18, fig. 6, richtig herausgehoben. Die oberen Windungen scheinen uns bei *Reufs* etwas zu flach gehalten. Kommt vor dem Königsthor und am Lusberg vor.

2. *N. acutimargo* Roemer. Tab. 12, fig. 14, pag. 23.

Reufs und *Geinitz* ziehen diese Species, wie wir glauben, mit Unrecht zu *N. canaliculata*. Ein Steinkern vom Lusberg verglichen mit Steinkernen der letzteren ergibt sich als eine verschiedene Species. Sie übertrifft *N. canaliculata* wohl noch an Größe, zeigt weder Rinne noch Kante auf der untersten Windung, welche ganz convex bis zur Naht fortläuft; ein wesentlicher Unterschied besteht ferner darin, daß alle Windungen fast in einer Ebene liegen. Die Beschreibung bei *Roemer* paßt nur theilweise auf unser Petrefact. Vielleicht sind wir, wenn mehrere Exemplare aufgefunden sein werden, veranlaßt, eine neue Species daraus zu bilden. Diese und die vorstehende *Natica* sind die bis jetzt bekannten größten Arten der Kreide.

3. *N. vulgaris*, *Reufs*. Tab. 10, fig. 22, pag. 50, I.

N. lamellosa, *Roemer*? Tab. 12, fig. 13, pag. 83.

N. cretacea, *Goldf.* Tab. 199, fig. 12, pag. 119, III.

Geinitz, Nachtrag, Tab. 1, fig. 21—23, pag. 10. Die unterste Windung ist etwas zu bauchig und zu lang; eine bessere Abbildung befindet sich in dessen Grundriß, Tab. 15, fig. 18. a—b. pag. 339. Nur ein junges Individuum.

Unsere Exemplare aus allen Lokalitäten des hiesigen Grünsandes stimmen mit *N. vulgaris* überein, nur vermögen wir die feinen, vertieften Querlinien, welche nach *Reufs* die Längslinien durchkreuzen sollen, auf den besterhaltenen Exemplaren nicht zu entdecken. Zur nähern Bezeichnung vergleichen wir diese Species mit

4. *N. Klipsteini*, *Müller*. Tab. 5, fig. 1. a—b.

Wir besitzen das Petrefact so wie die vorstehende Species mit völlig erhaltener Schale aus dem Grünsand bei Vaels und als Steinkern vom Lusberg und andern Orten. *N. Klipsteini* ist der Länge nach mit runzlichen, sehr unregelmäßigen, stark rückwärts gebogenen Linien und Falten

¹⁾ Beim Vergleiche der von *Reufs* aus dem untersten Quader, und von *Roemer* aus dem obern Kreidemergel von Quedlinburg beschriebenen Petrefacten, können wir uns der Ansicht nicht erwehren, sowohl jene unterste Quader, als diese obern Kreidemergel für die mittlere Kreideepoche anzusprechen.



versehen. Sie hat nur 4 bauchige Windungen, wovon die unterste sehr aufgetrieben ist und mehr als doppelt so lang ist, als das übrige niedergedrückte Gewinde. *N. vulgaris* hat 5 Windungen, wovon die unterste weniger bauchig ist als bei *N. Klipsteini*, das übrige Gewinde ist aber bei *N. vulgaris* mehr hervortretend, kegelförmig. Bei *N. Klipsteini* schliessen sich die Windungen gerundet in sanften Bogen aneinander, bei *N. vulgaris* bilden dieselben schwache Kanten und flachen sich vor den Nähten ab, was besonders auf der untersten Wirkung stark hervortritt. Die zuletzt angegebenen Merkmale machen auch die Steinkerne beider Arten noch kenntlich. Ausserdem hat *N. Klipsteini* einen tiefen, breiten, ohrförmigen Nabel, und über demselben eine längere Schwielle; letztere ist bei *N. vulgaris* nur schwach angedeutet, dabei fließt der schmale, wenig vertiefte Nabel mit dem Mundsaume zusammen. Die Schale ist bei unserer Species stark und dick, bei der verglichenen dünn und schwach.

5. *N. exaltata*, Goldf. Tab. 199, fig. 13, pag. 119. III. — Nicht aber Geinitz, Grundrifs, Tab. 15, fig. 19.

Wir halten diese Species für verschieden von *N. vulgaris*, womit Reufs pag. 113. II. sie vereinigt und nur als eine schmalere Varietät ansieht. Der ganze Habitus scheint uns indessen bei *N. exaltata* ein anderer. Sie ist länglich gezogen, die Windungen sind nur schwach gewölbt, treten einzeln gesonderter hervor und nehmen nach der Spitze hin mehr allmähig ab, so dafs sich das Petrefact mehr der Gattung *Paludina* nähert. Die Bedeckung ist uns unbekannt, ebenso haben wir das Innere nicht bloß legen können. Sie kommt bis jetzt nur am Lusberg vor.

Wir sind der Meinung, dafs bei der Gattung *Natica* und ähnlichen selbst ein geringerer Formunterschied, eher zu einer neuen Species berechtigt, als bei anderen, wenn man bedenkt, wie schwer es fallen würde, die noch lebenden Arten zu unterscheiden, wenn Färbung und Bedeckung ihnen fehlten.

6. *N. uncarinata*, Geinitz. Tab. 18, fig. 17, pag. 74.

N. carinata, Roemer. Tab. 12, fig. 15, pag. 83.

Wir besitzen vom Lusberg das Petrefact ganz genau so, wie es bei Roemer l. c. abgebildet und beschrieben ist, und Dr. Geinitz erkannte dasselbe, beim Besuche meiner Sammlung, für *N. uncarinata* an, wir können uns indessen bei genauer Betrachtung desselben der Ansicht nicht entschlagen, dafs die Querrippe auf dem letzten Umgange von einer abgebrochenen Windung herrühre. Roemer erwähnt, wie auch unser Exemplar zeigt, nur einer Querrippe auf dem untersten Umgang, Geinitz will dieselbe auch auf den übrigen Windungen erkannt haben. Es bedarf diese Species wohl noch der Bestätigung.

7. *N. Geinitzi*, Müller. Tab. 3, fig. 19.

N. exaltata, Geinitz. Grundrifs. Tab. 15, fig. 19, pag. 340.

Es gehört diese Species zu der Abtheilung *naticæ prælongæ* bei d'Orbigny pag. 148. II., denn sie ist viel länger, als breit. Das Gehäuse besteht aus 5 wenig gewölbten Windungen, welche mit sehr tiefen Nähten gleichsam lose an einander gefügt sind. Die unterste Windung ist länger, als das ganze übrige Gewinde, wovon sich die 3 obersten Umgänge rasch verschmälern. Die dünne Schale ist mit Längslinien und Längsfalten bedeckt, welche die Zeichnung nicht zeigt, da der Abdruck der Tafel schon Statt gefunden hatte, ehe wir ein ganz vollkommen

erhaltenes Exemplar besaßen. Die Mundöffnung ist länglich rund, ohrförmig. Der Nabel ist eng und wird von einer Schwiele fast bedeckt. Nur selten im Grünsand bei Vaels.

b. *Naticella*, von Münster.

Obgleich wir *Naticella* nicht füglich als eigene Gattung betrachten können, so sehen wir sie dennoch als eine passende Unterabtheilung von *Natica* an, welche von *Klipstein* ¹⁾ pag. 197, ssq. der eine große hierhergehörende Anzahl Species beschrieben hat, sehr bezeichnend verzierte *Naticas* nennt. Aus der Kreide sind nur erst wenige beschrieben, welche man hierher zählen könnte, so *Natica nodosa*, *Geinitz*; *N. rugosa*, *Hæninghaus*; *N. fasciata*, Goldf. Wir stellen dazu:

8. *N. Strombecki*, Müller. Tab. 3, fig. 20.

Das Gehäuse dieser Species ist sehr bauchig, kugelig und besteht nur aus 3 Windungen, von welchen die unterste stark aufgeblasen und vielmal breiter ist, als die beiden andern zusammen. Letztere treten kaum als Gewinde hervor. Der Nabel ist verdeckt, der Mundrand glatt, die Oeffnung länglich, halbkreisförmig. Die vollständig erhaltene, äußerst dünne Schale ist mit scharfmarkirten Querlinien oder vielmehr glatten Querrippchen geziert, zwischen welchen unter der Loupe sich glatte Zwischenräume zeigen. Die Steinkerne sind ganz glatt. Kommt am Lusberg und Königsthor vor.

Litorina, Sowerby.

L. rotundata, Sow.

Turbo rotundus, Sow.

Auricula spirata, Roemer. Tab. 9, fig. 4, pag. 77.

Bei *Reufs*, Tab. 10, fig. 15, pag. 49, I. — Bei *Geinitz* wohl nur Tab. 14, fig. 10, pag. 45. Dagegen scheinen uns die Abbildungen Tab. 13, fig. 7 und Tab. 15, fig. 16 und 17, nicht hierher zu gehören.

Das Gehäuse besteht aus 4–5 Windungen, wovon die unterste sehr bauchig, aufgeblasen und höher ist, als das übrige Gewinde, welches sich plötzlich verschmälert thurmförmig erhebt. Die Schale ist dünn, zart längsgestreift, fast glatt. Die Mundöffnung ist länglich eirund, der Mundrand scharf, glatt. Steinkerne dieser Species sind am Lusberg und vor dem Königsthor nicht selten. Vollständige Exemplare, welche das Innere sehen lassen, werden sich vielleicht als *Natica* erweisen, gewiß aber nicht als *N. exaltata*, wozu *Geinitz* dieselbe zieht. Unsere Exemplare haben mit *N. exaltata* auch nicht eine entfernte Aehnlichkeit.

Cassidaria Lamark.

Bis jetzt sind nur erst wenige Species dieser Gattung in dem Tertiären aufgefunden worden ²⁾ aus der Kreide ist uns noch keine bekannt, wir fanden eine solche und nannten sie :

¹⁾ A. v. *Klipstein*, Mittheilungen aus dem Gebiet der Geologie und Paläontologie. Giesen 1845.

²⁾ In der neuen Ausgabe *Lamarcks* les animaux sans vertèbres sind nur Species aus dem Tertiären Frankreichs angeführt. *L. v. Buch* hat in der Verhandlungen der Berliner Akademie 1830. pag. 61. 559. Zwei neue Arten *Cassidaria depressa* und *concellata* aus Mecklenburg vortrefflich abgebildet und beschrieben. Die *Cassidaria cancellata* Lam. ist eine *Cassis* und bleibt daher *Cassidaria cancellata* von *Buch* bestehen.



1. *C. cretacea*, Müller. Tab. 3, fig. 21.

Wir besitzen nur das abgebildete Exemplar aus einem festen, weissen Sandstein des Aachener Waldes. Das Gehäuse ist eiförmig, es besteht aus 4—5 Windungen; die unterste derselben ist dick, aufgeblasen, länger, als das übrige Gewinde, dessen Umgänge sich nach der Spitze allmählig verschmälern. Auf den Kanten der Windungen stehen in geringer Entfernung von einander stark hervortretende Knoten, ¹⁾ welche auf den oberen Umgängen allmählig verschwinden. Von den Kanten der Windungen bis zur Naht bildet sich eine deutliche Fläche. Am Mundrand ist ein ziemlich breiter, flacher Saum, welcher mit dem Kanal zusammen fließt. Dieser letztere ist kurz, rückwärts gebogen und läßt, obgleich er etwas abgebrochen ist, deutlich erkennen, daß wir eine *Cassidaria* und keine *Cassis* vor uns haben. Wollte man sie mit einer lebenden Schnecke vergleichen, so würde man an *Cassis erinaceus* Lin. denken.

***Strombus*, Lamarck.**

D'Orbigny hat diese Gattung in 2 Species zuerst für die Kreide nachgewiesen, *Reufs* fügte eine dritte *St. ventricosus* pag. 46, I, Tab. 9, fig. 11, hinzu. Davon gehört *St. Dupinianus d'Orb.* Tab. 217, fig. 3, pag. 313—314 dem *Gault*, *St. inornatus d'Orb.* 214, pag. 314—315 und die Art bei *Reufs* der oberen Kreide an, das Mittelglied der Kreide wird daher auch Representanten der Gattung haben, wenn wir auch bei den nachstehenden Species in der Gattung geirrt haben sollten. So weit bis jetzt bekannt, tritt dieselbe erst in der Kreide auf, entwickelt sich sehr im Tertiären und erreicht die höchste Ausbildung an Formmanigfaltigkeit und Zahl der Species in den jetzigen Meeren. Wir glaubten unsere beiden Petrefacten hierher rechnen zu dürfen, bemerken aber ausdrücklich, daß wir nicht im Stande waren dieselben bloß zu legen, und daher nur nach dem ganzen Habitus mit der flügelartigen Ausweitung urtheilen konnten.

1. *St. fenestratus*, Müller. Tab. 3, fig. 22.

Dieses Species hat 5—6 Windungen. Die unterste derselben fast doppelt so lang, als das übrige Gewinde ist mehr flach, als bauchig. Ueber das ganze Gehäuse laufen der Länge nach Wulste, welche besonders auf der Kante der untersten Windung stark hervortreten, nach dem Kanale hin sich allmählig verschmälern und endlich verschwinden. Der Quere nach laufen ziemlich breite, in regelmässigen Abständen von einander liegende, etwas hervortretende Linien, welche die Wulste durchkreuzen. Diese Linien gehen aber nur bis zu der flügelartigen Ausweitung der Schnecke; auf diesem Flügel laufen Längsfalten bis zum Kanal. Der Mundrand ist verdickt und nach außen etwas umgebogen. Der Kanal ist ziemlich breit, kurz, etwas rückwärts gebogen. Wir besitzen diese Species nur in Einem Exemplar aus dem Grünsande bei Vaels.

2. *St. inermis*, Müller. Tab. 3, fig. 32 a—b.

Wir stellen diese Species mit größerem Bedenken zu *Strombus*, als die vorhergehende, es ist möglich, daß sie zu *pirula* zu verweisen ist. Sie besteht aus vier gewölbten Windungen,

¹⁾ Die Knoten sind in der Abbildung etwas zu rund gehalten; auch ist die Umbiegung des Kanals zu schwach hervorgehoben.

von denen die unterste viermal so lang ist, als das übrige nur wenig vorragende Gewinde. In der Zeichnung ist dieselbe etwas zu eckig gehalten. Die flügelartige Ausweitung der untersten Windung ist am Rande glatt. Nach dem Steinkern zu urtheilen war die Oberfläche mit zarten Längslinien bedeckt. Der Kanal ist ziemlich breit, kurz, etwas rückwärts gebogen, was uns abhört das Petrefact für *Conus* zu halten. Kommt am Königsthor vor.

Rostellaria, Lamarck.

Mit Recht bildete *Lamarck* aus der zu zahlreichen linneischen Gattung *Strombus*, welche alle Flügelschnecken umfasste, neben derselben noch die Gattungen *Pterocera* und *Rostellaria*. Diese letztere scheint uns ganz natürlich zwischen *Strombus* und *Pterocera* in der Mitte zu stehen und bald mehr in die eine, bald mehr in die andere Gattung überzugehen. Die Rostellarien mit glatten Flügeln lehnen sich an *Strombus* an, während die mit gefingerten Flügeln den Uebergang zu *Pterocera* bilden. Davon ausgehend haben wir die nachstehenden Rostellarien in zwei Gruppen gebracht und glauben, daß die übrigen bekannten Species aller Formationen so geordnet werden können. Selbst Species, von denen der Flügel unbekannt ist, werden sich leicht in die Abtheilungen bringen lassen, denn nach unserer Beobachtung bilden alle Species Finger auf dem Flügel, welche auf der untersten Windung Querrippen oder Kiele haben, ist dieselbe dagegen glatt oder nur mit Längsrippen versehen, so ist der Flügel nicht gefingert.

1. *Rostellariae rostris planis. (Stromboides.)*

2. *Rostellariae rostris digitatis. (Pteroceroides.)*

Was die Verbreitung der Gattung betrifft, so hat dieselbe nach den bis jetzt bekannten Resultaten ihre größte Entwicklung in der Kreide-Epoche erreicht, sie tritt im *Jura*, vielleicht schon im Muschelkalk und buntem Sandstein, zuerst auf und ist im Tertiären noch ziemlich zahlreich vertreten. Ob einzelne Species der Kreide zur Gattung *Chenopus (Philippi)* zu zählen sein möchten, ist schwer oder gar nicht zu unterscheiden, da dieselbe mehr nach der Organisation des Thieres, als nach charakteristischen äußeren Merkmalen aufgestellt ist. Weßhalb *Deshayes* und *Milne Edwards* in der neuen Ausgabe *Lamarcks Tom. IX. pag. 657* vermuthen, daß einige der Rostellarien mit 2 oder 3 Finger aus dem *Oolith* zu *Chenopus* zu ziehen seien, ist uns aus ihren Angaben nicht ersichtlich, da doch die Fingerung des Flügels keinen Anhalt dazu gibt.

I. *Rostellariae rostris planis.*

1. *R. papilionacea, Goldf. Tab. 170, fig. 8, pag. 18 III.*

R. Schlotheimi, Roemer. Tab. 11, fig. 6, pag. 77. Bruchstück eines Steinkerns.

Reufs. Tab. 9, fig. 6, pag. 44 I.

Strombites papilionatus, von Schlotheim, pag. 154.

Unsere Exemplare stimmen mit der Zeichnung bei *Goldfufs* fast in allen Theilen ganz genau überein, nur reicht bei ihnen der untere Theil des Flügels tiefer hinunter und zeigt die scharfe Einbiegung nicht. Dies Letztere hat *Reufs* in dem jüngeren Individuum, welches das Bild darstellt richtig angegeben. Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 8—9 wenig convexen Windungen, welche mit Längsrippen versehen sind. Auf der untersten Windung treten nur noch

4—5 dieser Rippen nach der Spindel hin hervor, verschwinden aber nach dem Flügel hin und auf demselben gänzlich. Die Versteinerung ist mit abgebrochenem Flügel und als Steinkern gar nicht selten am Königsthor und am Lusberg.

2. *R. inornata*, *d'Orbig.* Tab. 210, fig. 4—5. pag. 296.

Diese Species unterscheidet sich von allen übrigen durch ihre völlig glatte Oberfläche, welche nur äußerst zarte Wellenlinien zeigt. Unter den Nähten laufen einige 4—6 feine, dichtgereimte Querlinien, die zusammen ein kleines Band bilden. Das Gehäuse ist länglich, die einzelnen Windungen sind nur sehr wenig gewölbt. Dieselben nehmen ganz allmählig nach der Spitze zu an Breite ab und gränzen mit kaum sichtbaren Nähten aneinander. Nach unserem besten Exemplar mit fünf Windungen zu urtheilen bestand das Ganze aus 7—8 derselben. *D'Orbigny* kennt den Flügel des Petrefactes nicht, wir besitzen ein Exemplar mit grofsentheils erhaltenem Flügel. Derselbe ist so breit, wie der ganze unterste Umgang, ja er scheint denselben noch etwas überragt zu haben. Die Mundöffnung in der Zeichnung bei *d'Orbigny* ist darnach zu berichtigen, sie geht bis zur ersten Naht hinauf. Das Uebrige des Bildes ist genau und stimmen unsere Exemplare vollkommen damit überein. Wir fanden das Petrefact am Lusberg und im Grünsand bei Vaels. *D'Orbigny's* Exemplar stammt von dem berühmten Fundort für Kreidepetrefacten Sainte Katharinenberg bei Rouen.

3. *R. Roemeri*, *Müller.* Tab. 5, fig. 5.

Die ersten Bruchstücke dieser Species hielten wir für *R. papilionacea*, vollständigere Exemplare belehrten uns später, dafs wir eine neue Species vor uns hatten. Das Gehäuse ist völlig glatt, während *R. papilionacea* auf allen Windungen Längsrippen hat, welche auch auf den Steinkernen noch deutlich hervortreten. Die unterste Windung ist nicht ganz so lang, wie das übrige Gewinde, welches noch aus 7—8 Umgängen besteht, die sich nach der Spitze rasch verjüngen. Der glatte Flügel dehnt sich grade und nur mit schwacher Einbiegung nach dem Kanale hin aus; er umfaßt noch die zweite Windung auf unserem Exemplar und scheint noch höher empor geragt zu haben. Kommt am Lusberg und am Königsthor nur selten vor.

4. *R. minuta*, *Müller.* Tab. 3, fig. 26.

Ohne Flügel erscheint das Gehäuse einer *Paludina* nicht unähnlich; es besteht aus 5—6 drehrunden, flach gewölbten Windungen. Die unterste derselben ist etwas aufgetrieben und fast so lang, wie das übrige Gewinde. Der Flügel ist so wie das ganze Petrefact glatt, breiter, als der ganze unterste Umgang. Von der Spitze des Kanales geht derselbe in einem spitzen Winkel bis zur Höhe der zweiten Windung, wo er sich dann an dieselbe anlehnt. Wir fanden bis jetzt nur Ein Exemplar am Lusberg.

II. Rostellariae rostris digitatis.

5. *R. calcarata*, *Sow.*

R. Stenoptera, *Goldf.* Tab. 170, fig. 6. a, pag. 18. III.

Reufs. Tab. 9, fig. 5. a—b. — *Geinitz.* Tab. 18, fig. 2, pag. 70. — *D'Orbigny.* Tab. 207, fig. 3—4, pag. 285 II.

Wir besitzen bis jetzt nur Steinkerne aus den Muschelschichten am Königsthor von der Gröfse

wie die Abbildung bei *Goldfufs*, alle andere Darstellungen dieser Species sind bedeutend kleiner. Dieselbe ist leicht kenntlich durch den starken, gekielten Finger, welcher von der Mitte der untersten Windung über den Flügel geht. Ein zweiter schwächerer Finger liegt in einiger Entfernung vom erstern. Diese Species scheint zu den verbreitetsten der Kreide zu gehören und die Mittelepoche derselben zu characterisiren.

6. *R. anserina*, Nilsson. Tab. 3, fig. 6, pag. 13. — Reufs. Tab. 45, fig. 19, pag. 111. II. — Roemer. Tab. 11, fig. 7 b, pag. 78.

Wir sind der Ansicht, dafs *Reufs* mit Unrecht auch *Rostellaria vespertilio Goldf.* hierher zieht, wenn Zeichnung und Beschreibung nicht völlig täuschen. Die Abbildung bei *Nilsson* ist gar zu dürftig um eine deutliche Vorstellung von der Species zu gewinnen. Er bemerkt selbst, dafs er nur zerbrochene und unvollständige Exemplare gehabt habe, und ihm erst, als das Bild fertig gewesen, bessere zugeführt worden seien.¹⁾ Die Abbildung bei *Reufs* ist im Ganzen gut, nur die Form des Flügels ist verschieden von der bei *Nilsson*, welcher richtig beobachtete, dafs der Flügel bis zur dritten Windung hinaufragt, was auch wir bestätigen können. Das thurm-förmige Gehäuse hat 9 Windungen, welche sich von der dritten an nach der Spitze schnell verjüngen. Dagegen hat *Rostellaria vespertilio* deren nur 6—7, die sich nur ganz allmählig verschmälern.

In Bezug auf den Flügel läuft bei *R. anserina* von dem stärksten Kiele der untersten Windung, welcher in der obern Hälfte derselben liegt, auch der stärkste Finger über denselben. Der Finger über dem letztern, und 2—3 Finger unter demselben sind schwächer und divergiren erst bedeutend gegen den Flügelrand; bei *R. vespertilio* sind auf der untersten Windung drei fast gleich starke Kiele, von dem obern und untern laufen stark hervortretende Finger über den Flügel; der etwas schwächere Mittelkiel hat keinen Fortsatz auf dem Flügel. Die Finger divergiren gleich von der Mündung aus, und ist daher die Divergenz am Flügelrande viel bedeutender, als bei *R. anserina*. Das Petrefact fanden wir bis jetzt nur im Grünsand bei Vaels.

7. *R. Vespertilio*, Goldf. Tab. 70, fig. 4. pag. 17.

Bronn Lethaea geognostica, Tab. 33, fig. 18. a—b.

Die Beschreibung geht schon theilweise aus dem Vergleich mit der vorstehenden Species hervor; zur Vervollständigung setzen wir noch hinzu, dafs die unterste Windung, aufser den oben angeführten 3 Kielen, über dem obersten und unter dem untersten noch ein zartes Reifchen zeigt. Die Kiele sind mehr oder weniger gekörnt. Längsrippen bedecken alle Windungen; dieselben gehen aber auf der untersten Windung nur bis zum zweiten Kiele. Kommt am Lusberg und beim Königsthor vor.

¹⁾ *Nilsson* war der erste, welcher die Gattung *Rostellaria* in der Kreide nachwies, er hatte daher um so mehr Anlafs auch schwache Bruchstücke zeichnen zu lassen, er sagt darüber l. c.: cum vero, quantum scimus, nulla hucusque hujus generis inventa in formatione cretacea haud ineptum aut superfluum judicamus, quae invenimus, quamvis incompleta, publici juris facere.

8. *R. Parkinsoni* Sow. — *Geinitz*, Tab. 15, fig. 1, 2. und Tab. 17, fig. 3. pag. 70. — Ob auch *Reufs*, Tab. 9, fig. 7? — Die Abbildungen bei *d'Orbigny*, Tab. 208, fig. 1, 2, scheinen uns nicht hierher zu gehören. Dagegen möchte *R. marginata* Sow. bei *Fitton* Tab. 11. fig. 18. hierher zu ziehen sein.

Diese *Rostellaria* ist von allen andern Species der Gattung sehr leicht durch den dem Gewinde entlang emporstehenden Finger zu unterscheiden. Die 6—7 Windungen sind mit scharfen Längsrippen versehen, über welche noch feine Querlinien laufen. In der obern Hälfte der untersten Windung liegt ein dicker Kiel, welcher als zweiter Finger fast in grader Linie über den Flügel geht und demnach mit dem ersten Finger einen rechten Winkel bildet. Zur Erkennung der Steinkerne ohne den Flügel, der nur selten erhalten ist, bemerken wir hier, dafs dieselben immer noch den Kiel der untersten Windung zeigen und von diesem bis zur Naht eine Concavität bilden. Die meisten Bruchstücke von nicht bestimmbarern *Rostellarien* haben bis jetzt das Loos, *Rostellaria Parkinsoni* sein zu müssen. Kommt am Lusberg, am Königsthor und im Grünsand bei Vaels vor.

9. *R. striata*, *Goldf.*, Tab. 170, fig. 7. a—b. pag. 18. III.

Wir führen hier diese Species der Vollständigkeit wegen nur an. Wir besitzen mehrere Bruchstücke, wie sie bei *Goldfufs* abgebildet sind, wir haben indessen nie eine Spur der Flügelbildung gesehen. Die Mundöffnung, welche wir theilweise blofs legen konnten, scheint mehr auf *Cerithium* hinzudeuten.

10. *R. furca*, *Müller*, Tab. 3, fig. 29.

Das Gehäuse besteht aus 5—6 Windungen, welche alle stark gewölbt sind. Die unterste Windung hat nach der Naht hin einen ziemlich breiten Kiel, welcher sich über den Flügel in einen Finger verlängert, in der Hälfte theilt sich derselbe und biegt sich im Bogen plötzlich abwärts. Der Kanal ist lang, auswärts gebogen und läuft in eine scharfe Spitze aus. Wir besitzen den Steinkern vom Lusberg.

11. *R. Nilssoni*, *Müller*, Tab. 3, fig. 30.

Das Gehäuse ist thurmformig, kurz und besteht aus 6 Windungen. Die unterste derselben hat 5 stark hervortretende Querlinien, von welchen die zweite unter der Naht sich zu einem scharfen Kiele erhebt. Dieser und die Linien zunächst über und unter demselben verlängern sich als Finger über den Flügel. Die folgenden Umgänge haben in der Mitte einen scharfkantigen Kiel, unter und über demselben eine zarte Linie. Von den Kielen bis zu den Nähten dachen sich die Windungen stark ab. Die Schale der Schnecke war aufer den Kielen und Linien völlig glatt. Den vollständigen Flügel kennen wir nicht. Das ganze Gebilde erinnert stark an *R. tenuistriata* von Münster, bei *Goldfufs* Tab. 169, fig. 9. a--b. Wir fanden bis jetzt nur das abgebildete Exemplar und ein Bruchstück mit den 5 oberen Windungen mit ganz erhaltener Schale bei Vaels im Grünsand.

12. *R. granulosa*, *Müller*, Tab. 3, fig. 27.

Das erste Exemplar ohne Flügel, welches wir fanden, hielten wir für eine scharfe Ausprägung von *R. vespertilio*, wir erlangten aber bei fernerm Nachsuchen noch zwei andere in völlig constanter Form und beanstanden nun nicht mehr, eine neue Species darin aufzustellen. Das

Gehäuse ist thurmförmig, hat 7—8 Windungen mit schwächerer Verjüngung nach der Spitze, als bei *B. anserina* und etwas stärkerer, als bei *B. vespertilio*. Die unterste Windung trägt 7 Reifchen, von welcher die vier obern stärker hervortreten und scharf gekröt sind. Die Körnchen oder Knötchen sind durch zarte Längsrippchen verbunden, so dafs sich zwischen je vier Knötchen eine Vertiefung bildet. Von den gekörnten Reifchen ist das zunächst unter der Naht das schwächste und das darauf folgende das stärkste. Das übrige Gewinde ist mit scharf ausgeprägten Längsrippen versehen. Der Flügel ist äufserst dünn. Von dem zweiten und vierten gekörnten Reifchen laufen sehr erhabene Finger über den Flügel. Bis jetzt nur im Grünsand bei Vaels.

13. *R. arachnoides*, Müller. Tab. 3, fig. 28.

Diese Species ist unstreitig eine der merkwürdigsten der Gattung, ja man könnte versucht sein, ein neues Genus daraus zu bilden. Zu *Pterocera* konnten wir sie nicht stellen, weil, von der zweiten Windung an, das Gewinde vom Flügel nicht mehr berührt wird. Das Gehäuse ist thurmförmig und besteht aus 7 Windungen, die sich terrassenförmig ohne sichtbare Naht über einander setzen. Jede Windung trägt 2 scharfe Kiele (die unterste 3), wovon der untere etwas schwächer ist. Auf den oberen Umgängen bilden dieselben nur noch erhabene Linien. Der Kanal ist schmal, fast so lang, wie das ganze übrige Gehäuse, er ist auswärts gebogen und mit zwei Fingern versehen, wovon der innere abwärts, der äufsere aufwärts gerichtet ist. Sie endeten wohl beide in eine scharfe Spitze, die bei dem äufseren noch vollkommen erhalten ist. Von dem stärksten Kiele der untersten Windung geht in schwachem Bogen ein sehr langer scharf gekielter Finger aus, aus welchem ungefähr gegen die Mitte nach unten und nach oben ein neuer Finger entspringt. Der untere scheint sich abermals getheilt zu haben. Wir glauben, dafs die Finger durch eine dünne Schale mit einander verbunden gewesen sind. Wir fanden das abgebildete Exemplar und noch 2 andere, ohne erhaltene Finger, mit vollständig erhaltener Bedeckung silicificirt im Grünsand bei Vaels. Dr. Geinitz besitzt, wie er uns mittheilte, dieselbe Species von Lemberg und überliefs uns die Ehre der Bestimmung dieses wunderbaren Gebildes.

Mitra, Lamarck.

So zahlreich die Species dieser Gattung noch lebend vorkommen, und in dem Tertiären gefunden werden, eben so selten erscheinen dieselben in der Kreide-Epoche, worin sie wohl zuerst auftreten. Sowerby beschreibt aus der oberen Kreide *Mitra cancellata*, welche d'Orbigny, ohne jedoch von der Identität des von ihm aufgefundenen Petrefactes mit der Sowerby'schen Art völlig überzeugt zu sein, Tab. 221, fig. 5, pag. 329. II, als solche abgebildet und beschrieben hat. In dem aachener Grünsande fanden wir drei neue Species, die wir ohne alle Bedenken zu *Mitra* stellen. Wir bemerken noch, dafs wir die Hauptunterscheidung in den Falten auf der Spindel finden, die übrigen in der Diagnose von Lamarck, Tom. 10, pag. 294 angegebenen Merkmale sind nicht stichhaltig. Die Falten auf der Spindel laufen schräg, unter sich parallel, die untersten sind die schwächsten und erbreiten sich allmählig nach oben, bei *Voluta* sind dagegen die untersten die stärksten und verschmälern sich allmählig nach oben. Bei glei-

cher Stärke aller Falten entscheidet bei lebenden Mollusken der als verschieden nachgewiesene Organismus der Thiere beider Gattungen, bei Petrefacten bleibt es dann aber unmöglich zu entscheiden, ob sie zu *Mitra* oder *Voluta* gehören, die äußere Form muß dann maßgebend sein.

1. *M. Murchisoni*, Müller, Tab. 3, fig. 23. a—b.

Beim ersten Anblick erinnert das Petrefact an *Voluta elongata* Sow. bei d'Orbigny, Tab. 220, fig. 3, ist aber davon in allen Stücken verschieden. Die Gestalt desselben ist langgestreckt, nach oben thurmformig zugespitzt, nach unten läuft es in einen sich allmählig verschmälernden langen Kanal aus. Die glatte Spindel trägt drei scharf hervortretende Falten, von welchen die unterste schwächer ist, als die beiden oberen. Das Gehäuse ist mehr als 4 Zoll lang und in der Mitte über 1 Zoll breit. Es besteht aus 5—6 Windungen, wovon die unterste mehr als dreimal so lang ist, als das übrige Gewinde. Die Umgänge reihen sich so dicht aneinander, daß die Nähte fast verschwinden. Die Schale ist mit breiten, fast viereckigen, scharf hervortretenden Knotenreihen der Quere nach versehen. Die Knoten liegen aber auch senkrecht übereinander und sind unter sich durch Vertiefungen sowohl der Quere, als der Länge nach von einander getrennt. Außerdem laufen der Länge nach über das Ganze wellenförmige Linien, welche sich nach dem Mundrande hin in immer stärkern Längsfalten gestalten, zwischen welchen starke Vertiefungen sind. Die Knoten verschwinden fast gänzlich auf diesen Falten. Der Mundsaum ist wulstig, dick. An den Nähten bildet sich ein etwas vertieft liegendes Band von 3—4 feingekörnten Querlinien. Beim Herausklopfen hatten wir das Unglück, das Petrefact zu zerbrechen, wir haben dasselbe daher genau so zeichnen lassen, wie es sich in unserer Sammlung befindet, es stammt dies bis jetzt einzige Exemplar aus dem Grünsande bei Vaels.

2. *M. nana*, Müller, Tab. 3, fig. 24. a—b.

Die Gestalt dieser *Mitra* ist genau die eines *Fusus*, wozu wir das Petrefact unbedenklich gezählt hätten, wenn es uns nicht gelungen wäre, die Spindel an mehreren Exemplaren völlig bloß zu legen. Es dient diese Species, wie so viele andere zum Beweis, mit wie geringer Sicherheit man selbst die Gattung nach dem Habitus allein zu bestimmen im Stande ist, wenn das Petrefact noch in der Masse liegt oder gar nur als Steinkern vorhanden ist.

Das Gehäuse besteht aus 6—7 nur wenig gewölbten Windungen, welche in schönem Verhältniß sich verschmälern und in eine scharfe Spitze endigen. Das Ganze ist mit niedlichen, gedrängten Längsrippchen versehen. Die Schale ist äußerst zart und dünn, die Mundöffnung länglich, der Mundrand, welcher mit dem kurzen Kanal zusammen fließt, ist dünn, glatt, scharf. Auf der Spindel stehen drei scharf markirte, schmale Falten, von welchen die unterste die zarteste ist. Bis jetzt fanden wir die Species nur im Grünsand bei Vaels.

3. *M. piruliformis*, Müller, Tab. 3, fig. 25. a—b.

So wie die vorstehende Species der Gestalt nach der Gattung *Fusus*, so nähert sich diese auf der einen Seite der Gattung *Pirula* und schließt sich auf der andern Seite der Abtheilung *Cimbiolae* der *Voluten* genau an. Die 3 Falten auf der Spindel, wovon die unterste die schwächste ist, lassen aber keinen Zweifel über die Gattung. Das Gehäuse besteht aus 4 Windungen, von denen die unterste viermal so lang ist, als die übrigen drei, welche ein niedergedrücktes Ge-

winde mit kaum sichtbaren Nähten bilden. Die Schale ist mit ganz regelmäßigen Querreifchen bedeckt, zwischen welchen sich glatte Zwischenräume befinden. Die Mundöffnung ist weit und verschmälert sich nach dem Kanale hin wie bei *Pirula*. Der Kanal selbst ist kurz, etwas rückwärts gebogen. Wir fanden das Petrefact am Lusberg und im Grünsand bei Vaels.

Murex, Linné

Die bis jetzt geltenden Diagnosen der von dem linneischen *Murex* getrennten Gattungen *Pleurotoma*, *Ranella*, *Triton* etc. paßten nicht auf unser Petrefact. Die ganze Form desselben und besonders der fistulöse Kanal neben dem Hauptkanal veranlaßten uns dasselbe vorläufig zu *Murex* zu stellen, obgleich wir an demselben keine Wulste (*varices*), welche diese Gattung characterisiren, fanden. Vielleicht erweisen sich ganz vollständig erhaltene Exemplare als zu der von *Deshayes* aufgestellten Abtheilung *Triphora* ¹⁾ gehörig, oder gar als neue Gattung. Bis jetzt ist die Gattung *Murex* in der Kreide noch nicht vertreten, denn *Murex quadratus* Sow. wird von *Sowerby* bei *Fitton*, pag. 343, Tab. 18, fig. 17 als *Fusus quadratus* berichtet. Wegen der Annäherung an *Pleurotoma* nennen wir unsere Species

1. *Murex pleurotomoides*, Müller Tab. 3, fig. 31.

Das Petrefact besteht aus 6—7 Windungen, von welchen die unterste bauchig, aufgetrieben und so lang ist, wie das übrige Gewinde. Dies letztere ist thurmformig, in eine Spitze auslaufend. Alle Windungen tragen sehr stark hervortretende Längsrippen, welche einzeln in ihrer Mitte verdickt sind, und sich nach oben und unten verschmälern. Diese Rippen sind auf allen Windungen so lang, wie die Windungen selbst, auf der untersten gehen sie nur bis zum obersten Mundwinkel. Zwischen den Rippen und über dieselben laufen ziemlich breite Querlinien, welche von sehr zarten wellenförmigen Längslinien, die in der Nähe des Mundrandes faltenartig werden, durchkreuzt sind. Die Rippen aller Windungen stehen senkrecht übereinander. Ungefähr in der Mitte des untersten Umganges zeigt sich eine Querrinne, wie bei *Pleurotoma*, den Einschnitt am Mundrande konnten wir aber nicht erkennen, indem grade an der Stelle das Petrefact etwas beschädigt ist. Die Mundöffnung ist länglich rund und endet in einen kurzen und schmalen Kanal, neben welchem ein zweiter, ziemlich breiter, fistulöser Kanal liegt. Beide sind rückwärts gebogen. Die sonst glatte Spindel ist der ganzen Länge nach mit einer häutigen, dünnen Schwiele versehen, welche oben mit dem rechten Mundsäume und unten mit dem fistulösen Kanal zusammen fließt. Der Mundsäum selbst ist ohne allen Wulst. Wir fanden bis jetzt nur das abgebildete Exemplar im Grünsand bei Vaels. Die Rückseite desselben ist mit einer Species *Anthophyllum* (wahrscheinlich *conicum* Roemer) bedeckt.

¹⁾ Ausführliches über die Gattung *Murex* und die verwandten Familien findet sich in Polens Paläontologie bei *Pusch*, pag. 130 ssq. — Ferner in der neuen Ausgabe von *Lamarck*. Tom. IX, pag. 557 ssq.



Turritella, ¹⁾ *Lamarck*.

Unter den vielen Gattungen der Gasteropoden gibt es nur wenige, welche so zahlreich an Species sind, wie diejenige der Turritellen. In dem *Enumerator paleontologicus* der weitverbreiteten Naturgeschichte der drei Reiche (Geschichte der Natur von Dr. H. G. Bronn, III. Band, 2. Theil, pag. 391—397) sind nicht weniger als 266 Arten Turritellen namhaft gemacht, welche sich geologisch also vertheilen:

auf die Kohlenperiode kommen.....	36 Arten,
„ „ Salzperiode.....	60 „
„ „ Oolithperiode.....	16 „
„ „ Kreide.....	46 „
„ „ Molasse ²⁾	108 „
	266 „

Davon kommen 14 Arten aus dem oberen Tertiären und dem Diluvium noch lebend vor, bei einigen anderen ist dies noch zweifelhaft.

Es erhellet aus dieser Aufstellung, dafs die Gattung *Turritella* von der ältesten Periode bis in die jüngsten Bildungen hinaufragt. Mit Unrecht behauptet daher *Alc. d'Orbigny* im zweiten Bande seiner *Paléontologie française terrains crétacés*, pag. 33, dafs die Turritellen im Uebergangskalk und der Juraformation nicht vorkämen, sondern dafs sie zuerst in der Kreide aufträten. Die weitere Behauptung *d'Orbigny's*, dafs je jünger die Kreidebildung, desto zahlreicher die Turritellen-Species würden, widerspricht offenbar den bisherigen Forschungen; dafs aber die Zahl derselben, wie er ferner bemerkt, sich im Tertiären unglaublich vermehre, ist eine unbestrittene Thatsache. Was die noch lebenden Turritellen betrifft, so berichtet uns derselbe Schriftsteller, dafs sie sich sehr zahlreich in bedeutender Tiefe am Littorale aller Meere aufhielten und zahlreicher seien in den heifsen, als in den kalten Regionen.

Nehmen wir diese Aufenthaltweise der lebenden Arten als genau und bestimmt an und schliessen davon auf eine analoge Aufenthaltweise der ausgestorbenen, so sind die Turritellen für das Gebiet sehr bezeichnend und tragen zur Erhärtung der Ansicht meines Freundes, Herrn Dr. *Debey*, nicht wenig bei, dafs unsere Gegend einst eine Meeresbucht gewesen sei. Keine

¹⁾ Diese Abhandlung über die Gattung *Turritella* wurde bereits am 23. September 1847 in der dritten Sitzung der geologischen Section bei der Versammlung der deutschen Naturforscher in Aachen vortragen und findet sich in dem amtlichen Berichte derselben, pag. 234—244, abgedruckt. Da aber aus Mangel an Geld die lithographische Tafel jenem Berichte nicht beigegeben werden konnte und weil der Vollständigkeit wegen sie in der Monographie nicht wegbleiben durfte, so ist dieselbe hier mit unerheblichen Veränderungen abgedruckt.

²⁾ Wie bedeutend die Anzahl der Arten in der neueren Zeit sich gemehrt hat, mag man daraus ersehen, dafs *Lamarck* in seiner *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres* (1822), tom. VII, pag. 59 und pag. 561—564 aus dem Tertiären nur erst 12 Species aufführt. In der neuen Ausgabe *Lamarck's* (1843) von *Deshayes* und *Milne Edwards*, tom. IX, pag. 247—275, ist die Zahl erst auf 25 gebracht.



Gattung ist nämlich in unserem Grünsande so zahlreich an Arten, als eben die der Turrifellen. Auf einem Raume von nur wenigen Quadratfufs findet man hier der Anzahl nach fast die Hälfte der Turrifellen der Kreide von ganz Europa und in unserem Gebiete allein so viele, als in dem übrigen Deutschland, soweit literarischer Nachweis uns darüber vorliegt, zusammen genommen. Nach der obigen Zusammenstellung sind 46¹⁾ Species aus der Kreide beschrieben, das Aachener Gebiet zählt deren uns bis heute zur Kenntniß gekommenen 23, worunter wir 12 für noch nicht beschriebene Arten zu erkennen glauben.

Fast alle lebten, nach den Bruchstücken und Steinkernen zu urtheilen, in großer Anzahl zusammen. Wir sagen, nach den Bruchstücken und Steinkernen zu urtheilen, denn vollständig erhaltene Exemplare werden immer zu den Seltenheiten gehören. Die Schale fast aller Arten ist dünn wie Papier und springt daher beim Heraus klopfen leicht ab, ebenso zerbrechen sie leicht in den einzelnen Windungen und namentlich werden die sich häufig verjüngenden Windungen der Spitze nur höchst selten mit dem unteren Theile zusammen gefunden.

Nach den Ländern vertheilen sich die Turrifellen der Kreide in folgender Weise :

Nach <i>Reufs</i> enthält die böhmische Kreide.....	5 Species, eigenthümlich	1
Nach <i>Geinitz</i> die sächsische.....	5 " "	3
Nach <i>Roemer</i> die norddeutsche.....	5 " "	5
	<u>15</u> " "	<u>9</u>
Bei <i>Goldfufs</i> und von <i>Münster</i> sind aus der deutschen Kreide noch angeführt.....		9
also wirklich verschiedene Species.....		18
Dazu aus der französischen Kreide nach <i>d'Orbigny</i>		14
Auf England und Belgien kommen noch.....		11
und aus der amerikanischen Kreide.....		3

Die Zahl der bekannten Kreidespecies ist also..... 46

Was die Kreideformation in Schweden und auf der Insel Rügen betrifft, so scheint die Gattung darin gar nicht vertreten zu sein, denn wir finden keine einzige Art angeführt, weder bei *Nilsson*, noch bei *von Hagenow*. Eben so finden wir bei *Pusch* (Polens Palæontologie, Stuttgart 1837) keine Species *Turrifella* der Kreide Polens, Volhyniens und der Karpathen erwähnt.

Der Reichthum und die große Mannichfaltigkeit an Turrifellen, welche uns das hiesige Gebiet lieferte und der Vergleich einer nicht unbedeutenden Anzahl Arten aus anderen Formationen, den wir anstellen konnten, veranlaßten uns, eine Eintheilung oder vielmehr Gruppierung aller

¹⁾ Die Zahlenverhältnisse sind durch die neuesten Forschungen nur wenig verändert worden und namentlich für die Kreideformation. In der tüchtigen Arbeit von *Pictet und Roux*, *description des molusques fossiles qui se trouvent dans les Grès verts des environs de Genève*, 1849, finden wir pag. 166, Tab. 16, fig. 1, a—b, eine neue Species, *Tur. taucignyana*, und eine andere in den Versteinerungen des Kreidemergels von Lemberg und seiner Umgebung von *Rudolph Kner*, Wien 1848, pag. 14, Tab. III, fig. 2, a—b, *Tur. bigemina* beschrieben und abgebildet. Demnach würde die Zahl sich dann auf 48 stellen.



Turritellen zu versuchen. Von Klipstein ¹⁾ fühlte, so viel uns bekannt, zuerst das Bedürfnis, bei dem großen Reichthum der Cassianer Turritellen, dieselben in Gruppen zu theilen und faßte dieselben in fünf Abtheilungen, nach der Bedeckung der Schalen mit Knoten oder Stacheln (*armatæ*), mit Rippen (*costatæ*), mit Spirallinien oder Leisten allein (*cinctæ*), mit Zuwachsstreifen allein (*striatæ*) und ganz glatte (*nudæ*).

Nachstehende Eintheilung, welche wir nach dem ganzen Habitus der Turritellen aufgefaßt haben, zerfällt nur in drei Gruppen, *Globiformes*, *Scalares*, *Turritæ*, und glauben wir, daß die verschiedenen Arten aller Formationen in dieselben eingereiht werden können. Die einzelnen Gruppen würden wir dann folgendermaßen charakterisiren :

I. Globiformes.

Singuli anfractus globulos efficiunt, sutura inter singulos anfractus profunda, lata.

Die einzelnen Windungen bilden Kugeln, die Naht zwischen den Windungen ist tief und breit.

II. Scalares.

Singuli anfractus teguliformes, sutura profunda, angusta.

Die einzelnen Windungen sind dachförmig, die Naht ist tief und eng.

III. Turritæ.

Singuli anfractus appropinquati, ut quasi coherentes videantur, sutura angusta, pæne distinguenda.

Die einzelnen Windungen schliefsen sich aneinander und scheinen gleichsam zusammen zu hängen, die Naht ist eng, kaum zu unterscheiden.

I. Globiformes.

1. *Turritella multistriata*, Reufs. Tab. 10, fig. 17 und Tab. 11, fig. 16, pag. 51, I und pag. 114, II.

T. quadricincta, Goldf. Tab. 196, fig. 16, a—b.

T. quinque-cincta, Goldf. Tab. 196, fig. 17, a, b und c, pag. 106, III, welche Goldfufs selbst schon nur für eine Varietät der *Quadricincta* hält. Wohl auch

T. Dupiniana, d'Orbigny. Tab. 151, fig. 1—3, pag. 34. II.

Unsere Tab. 3, fig. 1.

Die Figuren bei Reufs sind völlig mißlungen, die auf Tab. 11 läßt gar keine Vorstellung von dem Petrefacte zu, Reufs selbst nennt sie schlecht. Die erstgenannte Figur bei Goldfufs gibt ein richtigeres Bild der Versteinerung. Das Charakteristische dieser Species besteht in den kah-

¹⁾ Mittheilungen aus dem Gebiete der Geologie und Paleontologie, I. Band, pag. 172. Giefsen bei G Fr. Heyers. 1845.

len, scharf hervortretenden, gleich weit von einander abstehenden 4 Querreifen jeder Windung, zwischen welche noch viele feine Querlinien liegen. Die einzelnen Umgänge sind stark gewölbt und durch eine breite und tiefe Naht bedeutend eingeschnürt.

2. *T. quinquelineata*, Müller. Tab. 3, fig. 3.

Diese Species ist schlanker als die vorhergehende. Die einzelnen Windungen sind weniger gewölbt und weit schmaler, die Naht ist bei weitem nicht so tief und breit, daher nur eine schwache Einschnürung. Jede der 10—11 Umgänge ist mit 5 scharf hervortretenden Querlinien umgeben, zwischen welchen jedesmal noch eine feinere Linie zu erkennen ist. Außerdem zeigen sich über und unter der Naht auf jeder Windung noch 2 feine Querlinien von der Mittelstärke der bereits angegebenen Linien.

3. *T. Hagenowiana*, Goldf. Tab. 197, fig. 5, a—b, pag. 108, III.

Wir glauben, diese Species, welche Goldfufs aus der grünen Kreide von Haldem anführt, in unseren Exemplaren aus dem Grünsand vor dem Königsthor zu erkennen. Sie unterscheidet sich ganz wesentlich von der vorigen Art durch stärker gewölbte und breitere Windungen, breitere und tiefere Nähte und weit gröfsere Einschnürungen. Jede Windung ist mit 5 scharf hervortretenden Linien oder vielmehr Gürteln umzogen, zwischen welchen sich eine Concavität bildet. Die Zwischenräume der Gürtel sind erheblich breiter, als bei *Quinquelineata*. Ferner liegen über dem fünften Gürtel nach der oberen Naht noch drei schwächere Querlinien, von welchen die mittlere jedoch immer etwas stärker ist, als die beiden anderen. Unter dem ersten Gürtel nach der unteren Naht zeigt sich ebenfalls noch eine zarte Querlinie. Diese Art ist bei gleicher Zahl der Umgänge um die Hälfte länger als die vorige.

4. *T. sexlineata*, Roemer. Tab. 11, fig. 22, pag. 80.

T. sexcincta, Goldf. Tab. 197, fig. 2, a—b, pag. 107, III.

T. difficilis, d'Orbigny. Tab. 151, fig. 19—20, pag. 39—40, II.

Unsere Tab. 3, fig. 2.

Die Zeichnung bei Roemer ist so mangelhaft, dafs Goldfufs seine besseren Exemplare für eine neue Species halten konnte. Die angeführte Figur bei Goldfufs ist naturgetreuer. Diese Art gehört zu den gröfseren der Gattung, bei einigen Exemplaren erreicht die Windung an der Mundöffnung die Dicke eines Zolles und die Höhe $3\frac{1}{2}$ Zoll. Die Windungen sind mäfsig gewölbt, von 6 starken Gürteln umzogen, welche zuweilen etwas knotig erscheinen. Dieselben stehen gleich weit von einander entfernt, nur der sechste ist unbedeutend entfernter vom fünften, als die übrigen unter sich es sind. Zwischen je zwei Gürteln liegen 3—5 feinere Querlinien, von denen die mittlere auffallend stärker ist und die dem unbewaffneten Auge sich deutlich zeigt. Doch nur bei höchst vollständiger Erhaltung sind die feineren Querlinien zu erkennen, bei minder guten Exemplaren etwa noch die Mittellinie, bei den meisten erscheinen die Zwischenräume glatt. Die Naht ist sehr breit und tief.

5. *T. Reufsiana*, Müller. Tab. 3, fig. 5.

Diese Art übertrifft die vorige noch an Gröfse und misst bis 4 Zoll. Sie unterscheidet sich von derselben ganz wesentlich dadurch, dafs alle sechs Gürtel knotig sind, dafs der sechste



vom fünften bedeutend entfernter steht, als die übrigen; dann durch die glatten Zwischenräume zwischen den Gürteln, ferner durch wellenförmige Längslinien, welche besonders auf dem untersten Umgange stark hervortreten und endlich noch dadurch, daß von dem sechsten Gürtel bis zur Naht sich eine dachförmige Fläche bildet, welche allmählig in jene übergeht, während bei *T. sexlineata* ein plötzlicher Uebergang zur Naht Statt findet. Die Windungen 10—12 sind etwas mehr gewölbt, als bei der vorigen Art. Vor dem Königsthore in Bruchstücken und Steinkernen nicht selten.

6. *T. multilineata*, Müller. Tab. 3, fig. 4 und fig. 6.

Wir glaubten anfangs, diese Species mit *T. sexlineata* vereinigen zu können, indessen haben wir uns durch charakteristische Exemplare aus dem Grünsande von Vaels die völlige Ueberzeugung verschafft, daß sie durchaus eine eigene Art ausmacht. Sie hat statt Gürtel ganz und gar nur scharfe Linien, zwischen welchen bald nur eine, bald zwei, bald drei nur etwas schwächere, jedoch scharf markirte Linien hervortreten, dergestalt, daß man sie mit den sechs stärkeren hin und wieder fast für gleich stark ansehen kann. Besonders bezeichnend für diese Species sind dann noch die beiden Querlinien über der sechsten Querlinie, wo die Windung sich sanft wölbend in die obere Naht übergeht. Die Umgänge 9—10 sind weit bauchiger und gerundeter als bei *T. sexlineata*. Auch am Königsthor.

7. *T. Carnalliana*, Müller. Tab. 3, fig. 14.

Es erinnert diese Species an *T. nodosa*, Roemer, allein der ganze Habitus unterscheidet sie auf den ersten Blick von derselben. Sie hat 10—12 gerundete, in der Mitte etwas bauchige Windungen, welche ganz allmählig nach der Spitze hin abnehmen und durch sehr breite Nahtfurchen von einander getrennt sind. Jede Windung hat 4 Reifen, von welchen die drei unteren in gleichen Abständen von einander liegen, von diesem ist der mittlere bedeutend dünner. Vom dritten bis zum vierten etwas tiefer liegenden Reifen ist der Abstand größer, als bei den übrigen dreien unter sich. Alle sind mit runden, von einander ziemlich entfernt stehenden Knoten versehen, welche bei dem erwähnten dünneren Reifen verhältnißmäßig zarter sind. Nur zwischen den Nahtfurchen laufen dicht stehende Querlinien. Längsstreifen, wie bei *T. nodosa*, sind nicht vorhanden. Kommt vor dem Königsthore und am Lusberg nicht selten vor.

8. *T. gothica*, Müller. Tab. 3, fig. 8.

Es gehört diese Species zu den niedlichsten und zierlichsten Turritellen. Sie ist kaum 6''' lang und die stärkste Windung 1''' breit. Sie zählt 19—20 Umgänge, welche sich nach der Spitze hin rasch verjüngen. Die Windungen sind mäfsig gewölbt und trägt jede derselben 4 Reifchen in gleichen Abständen von einander. Die Zwischenräume sind glatt, nur zwischen dem dritten und vierten Reifchen ist eine zarte Linie sichtbar. Die Nähte zwischen den 6 ersten Umgängen sind tief und breit, verschwinden aber gänzlich bei den oberen Umgängen. Fundort im Grünsand bei Vaelsbrug und selten vor dem Königsthore und am Lusberg.

9. *T. microscopica*, Müller.

Diese Turritelle ist die kleinste aller uns bekannten Species. Sie ist nur etwas länger als 1''' und nur $\frac{1}{4}$ ''' dick. Die 8—9 Umgänge sind stark gewölbt, erscheinen glatt und nur bei starker Vergrößerung schwach wellenförmig längsgestreift. Charakteristisch ist bei dieser Species noch,



dafs fast alle Windungen von gleicher Dicke sind, nur die drei obersten nehmen sichtlich an Stärke ab. Die tiefen Nähte sind daher zwischen allen Umgänge deutlich zu unterscheiden. Wir besitzen diese Species nur in einem vollständigen Exemplare aus dem Grünsande von Vaels.

10. *T. socialis*, Müller. Tab. 3, fig. 9.

Als man vor einem Jahre auf der Höhe des Lusbergs eine Strecke desselben zur Gewinnung von Mergelsteine für den inneren Ausbau des hiesigen Rathhauses abbaute, fand sich unter der Quader-Mergel-Schichte ein lockerer grüner Sand und unter diesem ein festes Conglomerat von Conchilien und gelbem Sand, bei welchem uns sogleich die Menge einer kleinen Turritellen-Species auffiel, welche mit *Fungia coronula* fast das ganze Gestein bildet. Man wird beim Anblick desselben unwillkürlich an den Paludien-Kalk erinnert und könnte dasselbe füglich Turritellen-Kreide nennen.

Diesem Vorkommen gemäfs wählten wir die Benennung *Turritella socialis*. Das Petrefact hat 7—8 stark gewölbte Windungen, welche alle durch tiefe, jedoch weniger breite Nähte von einander getrennt sind. Die Bedeckung dieser Species mufs äusserst zart gewesen sein. Bis jetzt kommt die Art nur als Steinkern vor, nach den Hohlalldrücken zu urtheilen war dieselbe fast glatt, nur höchst schwach quergestreift. Sie kann mit der vorhergehenden Art durchaus nicht verwechselt werden, indem sie kegelförmig zugespitzt und jeder einzelne Umgang von unten auf verhältnismäfsig dünner und kleiner wird.

II. Scales.

11. *T. scalaris*, Müller. Tab. 3, fig. 13.

In dieser Species zeigt sich der Charakter der Abtheilung recht deutlich ¹⁾. Sie hat 8—9 Umgänge, welche sich mit tiefen und engen Nahtfurchen aneinander reihen. Die Umgänge sind concav, gleichsam ausgehöhlt und mit 4—5 Reifchen umzogen, zwischen welchen noch feine Gürtelchen laufen. Von dem fünften Reifchen bis zur Naht erhebt sich dachförmig ein breiter, starker Wulst, welcher mit feinen Querlinien bedeckt ist. Die Windungen nehmen in schönem Verhältniss nach der Spitze hin allmählig ab. Fundort in der Wolfsgracht bei Gimmnich. Selten.

12. *T. Eichwaldiana*, Goldf. T. 197, pag. 108. III. — Unsere Tab. 3, fig. 10.

Das Gehäuse ist kegelförmig und besteht aus 10—12 Umgängen. Jede derselben zeigt zwei stark hervortretende, gerundete, wulstige Kiele, von denen der nach der oberen Nahtfurchen immer breiter und stärker ist, als der nach der unteren, zugleich geht der erstere in flach-concaver Abdachung zur Naht, während der schwächere Kiel völlig gerundet ist. Unter dem stärkeren Kiele laufen zwei Gürtel, von denen der untere etwas stärker ist, unter dem schwächeren Kiele befindet sich ebenfalls ein Gürtel, welcher noch deutlicher hervortritt, als die beiden anderen. Auf der Abdachung des stärkeren Kieles und ebenso zwischen den Kielen und

¹⁾ Während wir diese Abhandlung schrieben, ging uns die dritte Lieferung der *Paläontographica* (Cassel bei Theodor Fischer, 1847) zu, worin Dunker pag. 133, Tab. 18, fig. 10, eine neue Species *Turritella acuticarinata* aus dem Tertiären von Java beschreibt, welche ebenfalls den Typus der *Scales* recht deutlich zeigt.



Gürtelchen zeigen sich unter der Loupe noch zarte Querlinien. Findet sich im Grünsand bei Vaels und bei Aachen.

13. *T. affinis*, Müller. Tab. 3, fig. 11.

Der ganze Habitus dieser Species nähert sich der vorhergehenden, wir haben aber keinen Anstand nehmen können, sie als neue Art hinzustellen. Sie charakterisirt sich wesentlich durch folgende Merkmale. Die beiden Kiele jedes Umganges sind fast gleich stark, der obere dacht sich flacher und schärfer ab, als bei der vorhergehenden Art, unter demselben liegen 5 Gürtel, wovon der mittlere der stärkste ist; unter dem Kiele nach der unteren Nahtfurche liegen endlich stets 2 Gürtel. Die Anzahl der Umgänge ist 10—12. Vorkommen wie die vorhergehende Art, nur seltener.

14. *T. Omaliusi*, Müller. Tab. 3, fig. 12, a—b.

Sie ist kegelförmig, besteht aus 12—14 Windungen, welche sich nach der Spitze hin rasch und stark verjüngen. Jeder Umgang hat drei schwach gekörnte Kiele, in gleichen Abständen von einander, wovon der mittlere etwas zarter als die beiden anderen erscheint. Die Zwischenräume zwischen den Kielen sind concav. Unter dem Kiele über der Nahtfurche ist ein zartes Gürtelchen und unter dem Kiele unter der Nahtfurche zwei desgleichen, wovon das obere das stärkere ist. Zwischen den Kielen und Gürtelchen zeigen sich unter starker Loupe noch feine concentrische Linien. Bis jetzt nur am Lusberg.

15. *T. acutissima*, Müller. Tab. 3, fig. 19, a—b.

Diese Turritelle bildet den Uebergang von den Scalaren zu den Turriten. Sie hat 17 Umgänge, welche sich wie in- und übereinander geschobene Becher darstellen. In Bezug auf die Anzahl der Umgänge oder Windungen bei den Turritellen scheint es, daß dieselbe desto größer, je zarter die Bildung des Gehäuses. Jeder Umgang unserer Species trägt 3 Kiele in gleich weiten Abständen von einander. Zwischen den Kielen bemerkt man unter der Loupe eine zarte concentrische Linie. Die Windungen nehmen nach der Spitze hin unter sich ganz allmähig ab, so daß die letzte eine scharfe Spitze bildet. Die Nahtfurchen erscheinen als glatte Bänder. Kommt bis jetzt nur im Grünsand bei Vaels vor.

III. Turritæ.

16. *T. Næggerathiana*, Goldf. Tab. 197, fig. 1, a—b, pag. 107.

Die Gestalt dieser Species ist kegelförmig, das Gehäuse ist der Länge nach wellenförmig gestreift. Die 10—12 Windungen schliessen sich mit sehr enger Naht aneinander und nehmen nach der Spitze hin ganz allmähig ab. Jeder Umgang hat 5 schwach gekörnte Gürtel, wovon die drei mittleren in gleich weiten Abständen von einander, die beiden äußeren aber von diesen etwas entfernter stehen. Die Zwischenräume sind concav mit feinen concentrischen Linien durchzogen, welche sich zwischen dem unteren Gürtel und der unteren Naht sehr häufen, bei anderen Exemplaren erscheinen die Zwischenräume fast glatt. Kommt vor im Aachener Wald, am Lusberg und vor dem Königsthore.

17. *T. nodosa*, Roemer. Tab. XI, fig. 20, stellt bloß die drei unteren Windungen dar.

Unsere Tab. 3, fig. 18.

Sie hat mit der vorstehenden Art fast gleichen Habitus; die 10—12 Windungen sind nur noch enger aneinander gerückt und ist daher das ganze Gehäuse mehr thurmformig. Der Länge nach ist dasselbe wellenförmig gestreift, der Quere nach mit feinen Linien bedeckt. Jeder Umgang hat vier Reifchen, wovon die beiden oberen breit, wulstig und mit starken, dicht gereihten, etwas länglich gezogenen Erhabenheiten versehen sind. Von diesen beiden Reifchen ist das untere das stärkere. Der Reifen über der Nahtfurche ist schmaler, tritt aber schärfer gekielt hervor und ist mit denselben Erhabenheiten versehen, wie die beiden anderen. Das darauf folgende Reifchen ist das zarteste, liegt etwas vertieft und ist nur schwach gekörnt, so daß es bei nicht völlig gut erhaltenen Exemplaren nur als eine Linie erscheint, die nicht selten sogar ganz verwischt ist. Vorkommen wie die vorhergehende Art.

18. *T. Althausi*, Müller. Tab. 3, fig. 16.

Eine sehr schlanke kegelförmige Turritelle mit scharf markirter Bereifung. Die Anzahl der Umgänge vermögen wir nicht anzugeben, indem wir bis jetzt noch kein vollständiges Exemplar besitzen. Jede Windung trägt 5 Reifchen, von denen die beiden unter der Naht wulstig und stark geknotet sind, von den dreien über der Naht ist das mittlere wie die beiden vorgenannten beschaffen, tritt nur noch etwas mehr hervor, die beiden dasselbe umfassenden Reifchen sind schmaler und glatt. Ueber der Naht zeigen sich noch einzelne schwach angedeutete concentrische Linien. Bis jetzt nur vor dem Königsthore gefunden.

19. *T. Humboldti*, Müller. Tab. 3, fig. 17.

Eine der schlankesten uns bekannten Species. Die Nähte sind an derselben kaum zu unterscheiden, so daß das ganze Gehäuse wie aus einem Stück gemeißelt sich darstellt. Die unteren Windungen mit der Mundöffnung haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Die 10—11 Windungen, welche uns vorliegen, verjüngen sich rasch nach der Spitze hin. Jede derselben hat 4 Reifchen in fast gleichen Abständen von einander und ebenso von fast gleicher Stärke. Das erste Reifchen über der Naht und das zweite unter der Naht sind nur um etwas dicker. Drei der Reifchen erscheinen dem unbewaffneten Auge völlig glatt und nur das zweite unter der Naht ist stark gekörnt. Bei mäßiger Vergrößerung zeigen aber auch die drei übrigen eine schwache Körnung. Zwischen den Reifchen laufen dann noch höchst zarte Querlinien. Findet sich am Lusberg und vor dem Königsthore.

20. *T. acanthophora*, Müller. Tab. 3, fig. 15.

Die Behauptung, daß die Turritellen auf den Reifchen, Gürteln oder Kielen, womit fast alle bekannte Arten überzogen sind, weder Wulste, noch Knoten, noch Stacheln tragen¹⁾, hat sich

¹⁾ Lamarck in seiner *histoire naturelle des animaux sans vertèbres* (Paris 1822) Tom. VII, pag. 55, sagt ausdrücklich: „Ces coquilles sont la plupart munies de stries ou de carènes transverses, mais aucune d'elles, parmi les espèces connues, n'offre ni côtes verticales, ni bourrelets, ni tubercules épineux.“ In der zweiten Ausgabe von 1843, tom. IX, pag. 248 unverändert abgedruckt.

Fr. Adolph Roemer in den Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges (Hannover 1836) pag. 154, hält es für eines der Unterscheidungs-Merkmale von *Cerithium*, „daß die einzelnen Win-

als völlig unhaltbar erwiesen, was schon von *Klipstein* in seinen geologischen und paläontologischen Mittheilungen (1845), pag. 172 ssq., (nachweist. Die vorliegende Species ist so weit uns bekannt aus der Kreide die erste, welche auf den Reifen vielmehr Stacheln als Knoten trägt. Die einzelnen Windungen sind in der Mitte etwas bauchig, jede derselben hat fünf Reifen, von welchen die vier oberen in gleich weiten Abständen stark hervortreten; der fünfte über der Naht ist schwächer und der Abstand zum folgenden nicht so weit, als bei den übrigen; alle sind mit Stacheln besetzt. In den Zwischenräumen der Reifen und selbst über diese letztere laufen sehr zahlreiche wellenförmige Querlinien, welche mit feinen, ebenfalls wellenförmigen Längslinien durchbrochen sind und dadurch ein zartes Netz bilden. Wir besitzen von dieser Species, welche wir vor dem Königsthore fanden, nur die vier unteren Windungen.

21. *T. alternans*, *Roemer*. Tab. XI, fig. 23, pag. 80.

Bis jetzt fanden wir vor dem Königsthore und am Lusberg nur Bruchstücke, welche wir zu dieser Species rechnen. Wie *Roemer* nach dem abgebildeten schwachen Bruchstücke die Windungen der Species zahlreich nennen kann, ist uns nicht klar geworden, vielmehr scheint sie uns nach dem uns vorliegenden oberen Theile zu schliessen, zu den Arten zu gehören, welche weniger zahlreiche Windungen haben, man müßte denn eine plötzliche und starke Verjüngung der Spitze annehmen, wozu kein Grund vorhanden ist. Jede Windung hat 3 Reifchen, wovon das über der Naht belegene am stärksten hervortritt. Zwischen den Reifchen zeigen sich viele feine Querlinien.

22. *T. cingulato-lineata*, *Müller*. Tab. VI, fig. 5.

Von dieser Species besitzen wir bis jetzt nur 8 Windungen der Spitze und glauben darnach sie zu *Turritella* stellen zu müssen. Sie scheint zu den kleineren Arten zu gehören. Jede Windung hat über der Naht einen stark hervortretenden, gerundeten, wulstigen Gürtel, über welchem fünf zarte, unter der Loupe mit schwachen Längsrippchen verbundene Reifchen liegen; von diesen sind die drei mittleren etwas stärker, als die sie umfassenden. Die Windungen selbst sind etwas gewölbt, in der Mitte aufgetrieben. Kommt vor dem Königsthore vor.

23. *T. Buchiana*, *Goldf.* Tab. 197, fig. 7, pag. 108, III.

Wir verdanken das einzige in unserem Besitz befindliche Exemplar der Güte des hier lebenden eifrigen Naturfreundes Herrn *Winckler*, welcher dasselbe im Eisensande des Aachener Waldes auffand. Wir sind nicht völlig überzeugt, ob diese Species zu *Turritella* zu zählen sei, die Zeichnung bei *Goldfufs* gibt uns, weil sie die Mundöffnung nicht darstellt, wenig Anhalt, vielmehr deutet sie, wie auch unser sehr mangelhaft erhaltenes Exemplar, eher auf *Buccinum*,

dungen der Turritellen nie mit Knoten, Wulste oder Stacheln, vielmehr nur mit einfachen Querlinien und gebogenen Anwachsstreifen versehen sind.“ Derselbe Verfasser führt in der norddeutschen Kreide (Hannover 1841), pag. 80, Tab. II, fig. 20, *Turritella nodosa* auf mit knotigen Querrippen und widerlegt dadurch faktisch seine frühere Ansicht. Man vergleiche noch unsere *T. Carnaliana*, *T. Althausii*, *T. Humboldtii*, welche alle knotige Reifen haben; ferner bei *d'Orbigny* pag. 35, Tab. 151, fig. 4—6, *Turritella angulata*, welche auf den Windungen Wulste trägt und einem *Cerithium* ganz ähnlich sieht, und endlich die obenstehende *T. acanthophora* mit Stacheln wie bei *Cerithium serratum Brug.* aus dem Tertiären.



als auf *Turritella*. Wir lassen die Sache bis zum Auffinden eines besser erhaltenen Exemplares unentschieden. Die Anzahl der Umgänge beträgt nur 5—6 mit scharf markirter Nahtfurche. Jede Windung hat drei Kiele, von welchen der unter der Naht doppelt so breit ist und mehr als einmal so weit entfernt liegt. Unter dem stärkeren wulstigen Kiele läuft eine etwas erhabene Linie. Das ganze Gehäuse ist mit stark rückwärts gebogenen, wellenförmigen Längslinien bedeckt. Sollte sich das Petrefact als *Turritella* erweisen, so würde diese Art die dickste und zugleich die am wenigst zahlreiche an Windungen sein.

Außer den angeführten Species besitzen wir noch eine Anzahl Steinkerne und Bruchstücke mit mehr oder weniger ausgeprägter Bereifung, welche wir zu *Turritella* zählen, allein wir tragen Bedenken, dieselben schon jetzt als neue Species aufzuführen, was namentlich bei Steinkernen stets misslich ist und selbst die tüchtigsten Paläontologen zu Irrthümern verleitet hat. So ist beispielweise in *Bronn's Lethæa geognostica*, Tab. XI, fig. 14, *Turritites scalatus* und auf derselben Tafel, fig. 15, (Steinkern), *Turbinites dubius* ein und dieselbe Species. Eben so wenig können wir uns der Ergänzungs- und Restaurationsweise *d'Orbigny's* anschließen, welcher nur gar zu häufig nach mangelhaften und schwachen Exemplaren schöne Zeichnungen liefert.

Fusus, Lamarck.

Die Gattung *Fusus* war im Vergleich zu anderen verwandten Gattungen in der deutschen Kreide lange Zeit sehr arm an Species. Bei *Lamarck* vol. 9, pag. 442, wird das Vorkommen der Gattung in der Kreideformation noch bezweifelt (1843). *Roemer* führte für Norddeutschland eine einzige Species an, *von Münster* und *Goldfuss* fügten aus der westphälischen Kreide fünf Species hinzu und *Reufs* beschrieb deren vier aus der böhmischen Kreide. Bei *Nilsson*, *Pusch*, *Geinitz* und *von Hagenow* finden wir nicht eine Art aus den von ihnen beschriebenen Kreidebildungen. *D'Orbigny* dagegen beschreibt 16 Arten aus der französischen Kreide. Im Aachener Gebiete war bis jetzt noch keine Species der Gattung aufgefunden, obgleich dieselbe hier sehr stark vertreten ist, wie aus Nächstehendem erhellen wird.

1. *F. Renauxianus, d'Orbigny.* Tab. 223, fig. 10, pag. 339. II.

Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 6—7 Windungen, welche von der zweiten Windung aufwärts sich rasch verschmälernd in eine Spitze auslaufen. Der Länge nach laufen in regelmäßigen Abständen wulstige Erhabenheiten. Der Quere nach laufen über diese und durch die Zwischenräume scharf gezeichnete Linien oder vielmehr Reifchen. Der Kanal ist lang, eng, scharf zugespitzt. Die Kolumelle ist ohne Wulst. Unsere Exemplare, die im Uebrigen mit der Zeichnung bei *d'Orbigny* übereinstimmen, haben aber kaum ein Drittel der Länge und Breite von jener. Fundort Vaelsbrug und Lusberg.

2. *F. Clementinus, d'Orbigny.* Tab. 223, fig. 8—9, pag. 339. II.

F. Marrotianus, d'Orb. Tab. 225, fig. 2, pag. 342. II.

F. nodosus, Reufs. Tab. 10, fig. 1, pag. 43, I.

Wir tragen kein Bedenken, diese als drei verschiedene Species aufgeführte Versteinerung unter einen Namen zu fassen. *Reufs* selbst hält l. c. *F. nodosus* für sehr nahestehend dem *F.*

Clementinus. *D'Orbigny* hat, wie uns scheint, aus einer Species deren zwei gemacht, wie nicht selten auch in anderen Fällen, weil die erstgenannte im Gault, die andere in der chloritischen Kreide gefunden wurde.

Das Gehäuse ist spindelförmig, es besteht aus 4 bauchigen Windungen, von denen die unterste in einen langen Kanal ausläuft, dieselbe ist mehr als doppelt so breit als die darauf folgende Windung und bis zur Spitze des Kanales fast viermal so lang, als das ganze übrige Gewinde, welches nur wenig hervortritt. Auf allen Windungen zeigen sich fern von einander stehende Knoten, die nach der Spitze hin immer schwächer werden. Nach den Hohlabdrücken zu urtheilen war das Gehäuse mit Querlinien geziert. Kommt bis jetzt nur als Steinkern in der Masse am Königsthor vor.

3. *F. Buchi*, Müller. Tab. V, fig. 15.

Diese Species hat einige Aehnlichkeit mit *F. Requienianus*, *d'Orb.*, Tab. 225, fig. 3, unterscheidet sich aber beim Vergleiche von demselben in allen Stücken. Das Gehäuse besteht aus 6 Windungen, ist ziemlich breit, etwas abwärts gebogen, kurz, in eine Spitze endigend. Alle Windungen sind mit ziemlich dicht gereihten, länglichen Wulsten versehen, die in der Mitte am dicksten sind und sich nach oben und unten verdünnen. Ueber das ganze Gehäuse laufen starke wellenförmige Querlinien, von welchen einzelne auf der untersten Windung stark hervortreten und auf den Wulsten derselben scharfe Knötchen bilden, welche die Zeichnung nicht scharf genug hervorgehoben hat. Auf den drei obersten Windungen verschwinden die Querlinien ganz allmähig. Die Kolumelle ist glatt. Bis jetzt nur bei Vaelsbrug im Grünsand in vortrefflicher Erhaltung.

4. *F. Decheni*, Müller. Tab. V, fig. 16.

Das Gehäuse besteht aus 7 Windungen, es trägt so ganz den Typus der Gattung, fast genau in der Mitte ist es etwas aufgetrieben und verläuft dann allmähig nach beiden Enden hin in eine Spitze, indem sich die Windungen nach oben in dem schönsten Ebenmaafs verjüngen und nach unten hin ein langer Kanal sich allmähig zuspitzt. Ueber die ganze Schnecke laufen der Länge nach dicht gereichte, sanft erhabene Wulste, welche sich auf der untersten Windung unvermerkt nach der Spitze hin verlieren. Der Quere nach ist das Petrefact mit zarten, jedoch sehr deutlichen zahlreichen Linien versehen. Die Kolumelle ist glatt. Bestimmbare Exemplare fanden wir bis jetzt nur bei Vaelsbrug.

5. *F. Noeggerathi*, Müller. Tab. V, fig. 20.

Das Gehäuse besteht aus 5—6 Windungen, die unterste mit dem ziemlich langen, graden Kanal ist fast doppelt so lang, wie das übrige Gewinde. Das Ganze ist mit glatten, scharf hervortretenden Längsrippen versehen, ohne alle Querlinien. Ein ganz auffallendes Merkmal dieser Species sind die gekörnten Ringe oder Gürtel vor der Naht, welche bei den 3 unteren Windungen deutlich heraustreten, bei den beiden oberen indessen verschwinden. Die Anzahl der Körner stimmt genau mit der Anzahl der Längsrippen überein. Jede Windung hat deren 14 bis 15 und reihen sich die Körner an diese gleichsam an. Kommt vortrefflich erhalten bei Vaelsbrug im Grünsand vor, am Lusberg und am Königsthor nur Bruchstücke.

6. *F. Salm-Dykianus*, Müller. Tab. V, fig. 19.

Diese Form von *Fusus* nähert sich schon der Gattung *Pyrula*. Die unterste Windung mit dem Kanal ist mehr als dreimal so lang, als das übrige Gewinde, welches noch aus 4 Umgängen besteht, wovon die 3 obersten sich sehr rasch verjüngen. Die Windungen tragen scharf markirte Längsrippen, welche am Rande der größten Windung Knoten bilden. Vom Rande bis zur Naht ist eine Rinne. Ueber das ganze Gehäuse laufen Querlinien, die fast vertieft erscheinen. Der Kanal ist sehr schmal und lang und etwas auswärts gebogen. Fundort wie bei der vorhergehenden Art.

7. *F. Burkhardi*, Müller. Tab. V, fig. 17.

Das Gehäuse besteht aus 5—6 Windungen, wovon die unterste mehr als doppelt so lang ist, als die übrigen zusammen. Die Gestalt ist spindelförmig, in der Mitte stark aufgetrieben, nach oben und unten spitz zulaufend. Die Windungen sind mit dicken Knoten oder Wulsten versehen, die auf den oberen Windungen allmählig verschwinden. Diese Knoten stehen auf den Kanten der Windungen, von den Kanten aus bilden sich dann schräge Flächen und von diesen aus erhebt sich bis zur wirklichen Naht ein Fortsatz der Windung, welcher die folgende Windung aufnimmt, wir sagen bis zur wirklichen Naht, denn die Stelle, wo jener Fortsatz beginnt, erscheint dem ersten Blicke ebenfalls wie eine Naht. Der Quere nach laufen über das ganze Gehäuse ziemlich breite, erhabene Linien. Der Kanal an dem vor uns liegenden Exemplar ist theilweise abgebrochen, muß aber, nach dem ganzen Habitus des Petrefactes zu urtheilen, lang und schmal sein. Fundort Vaelsbrug.

8. *F. Nysti*, Müller. Tab. V, fig. 13.

Wir trugen anfangs Bedenken, ob wir dies Petrefact zu *Fusus* stellen sollten, weil uns ein Theil der untersten Windung fehlte und es uns zweifelhaft schien, ob es nicht eine *Rostellaria* sei, indessen haben wir uns durch neu aufgefundene, zwar jüngere Exemplare, als die Zeichnung darstellt, überzeugt dafs wir einen *Fusus* vor uns haben. Das Gehäuse ist spindelförmig, es besteht aus 7 Windungen, die sich nach der Spitze hin ganz allmählig verschmälern. Alle Windungen sind mit scharf hervortretenden zahlreichen Längsrippen versehen, im Uebrigen erscheint das Ganze glatt und nur unter der Loupe unterscheidet man noch äußerst zarte Querlinien. Der Kanal ist lang und schmal. Fundort Vaelsbrug.

9. *F. Dunkeri*, Müller. Tab. V, fig. 18.

So ungern wir auch nur Bruchstücke zeichnen und daraus eine neue Art bilden, so haben wir uns doch diesmal dazu verleiten lassen, weil die Gattung uns nicht zweifelhaft schien und das Stück als solches die Schale mit vollständiger Bedeckung und Ausprägung derselben erhalten hat. Die Windungen sind mit einwärts gebogenen, sich nach unten verdickenden Rippen versehen und mit feinen Querlinien bedeckt. Vor dem Kanal treten 5 scharf markirte Linien hervor und unter der ersten Naht 3 schwächere, welche die dort sich sanft verlaufenden Rippen durchkreuzen und in den Durchschnittspunkten Knötchen bilden. Vorkommen bei Vaelsbrug.

10. *F. glaberrimus*, Müller. Tab. 5, fig. 24.

Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 8 gewölbten Windungen, die sich ganz allmählig verjüngen. Die unterste Windung bis zur Spitze des Kanals ist genau so lang, als das

übrige Gewinde. Der Kanal ist schmal, mäfsig lang. Das Petrefact erscheint völlig glatt und zeigen die Hohlabdrücke nur einige wenige zarte Linien unter den Nähten. Kam bis jetzt nur am Königsthore vor.

11. *F. Budgei*, Müller. Tab. V, fig. 14.

Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 8 Windungen, welche in schönem Verhältnifs sich allmählig nach der Spitze verjüngen. Die Umgänge sind mit Längsrippen versehen, welche sich von den Nähten aus nach unten verdicken. Von diesen Rippen treten auf jedem Umgange zwei als förmliche Wulste hervor nach Art vieler Cerithien. Die Wulste liegen in schräger Richtung auf den verschiedenen Windungen übereinander. Ueber das Ganze laufen feine Querlinien, welche unter den Rippen der letzten Windung stärker hervortreten und durch eine zarte Quersfurche von denselben getrennt sind. Die Nähte sind wenig vertieft, vor denselben befindet sich ein schmales Bändchen, was den Schlufs jeder Windung bildet. Der Kanal ist kurz und schmal. Die Mundöffnung war an den bis jetzt gefundenen Exemplaren nicht vollständig erhalten. Bei Vaelsbrug.

12. *F. Göpperti*, Müller. Tab. VI, fig. 6.

Diese Species steht auf der Gränze zwischen *Pyrella* ¹⁾ und *Fusus*, der ganze Habitus mit dem hervortretendem Gewinde veranlafste uns indessen sie hieher zu stellen. Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 4 Windungen, von welchen die unterste sehr bauchig und $1\frac{1}{2}$ Mal so lang ist, wie das übrige Gewinde. Die beiden unteren Windungen tragen stark hervortretende, entfernt stehende Längsrippen, die sich auf den oberen allmählig verlieren. Die unterste Windung dacht sich nach der Naht und ebenso nach dem Kanale hin ab und bilden sich auf den Längsrippen da, wo die Abdachungen anfangen, Knoten. Ueber das ganze Gehäuse laufen scharf marquirte Querlinien. Der Kanal scheint mäfsig lang zu sein, bis jetzt fanden wir nur Exemplare mit theilweise erhaltenem Kanal am Königsthor.

13. *F. Hüpschianus* ²⁾, Müller.

Rostellaria elongata, Roemer. Tab. 11, fig. 5, pag. 78.

Die Abbildungen bei Reufs, Tab. 9, fig. 10, a, b, c, d, pag. 43, die er für identisch mit *Rostellaria elongata* hielt und *Pleurotoma Roemeri* nannte, später aber zu *Fasciolaria* zählen möchte, gehören nicht hierher. *Rostellaria elongata* bei d'Archiac, Tab. 25, fig. 5, pag. 345, hat noch weniger damit gemein. Ueber die Gattungsbestimmung des Petrefacts aus der Tourtia und über dessen Identität mit *Rost. elongata*, Roemer, äufsert aber auch d'Archiac selbst l. c. die größte Bedenklichkeit. Dafs Geinitz im Quadersandstein-Gebirge, pag. 138, auch *Pyruca fenestrata*, Roemer, Tab. 11, fig. 14, pag. 79, hieher ziehen will, ist uns unerklärlich, indem

¹⁾ Siehe unten bei der Gattung *Pyruca*.

²⁾ Wir haben diese Species nach dem Freiherrn von Hüpsch genannt, welcher zu denjenigen gehört, die zuerst über rheinische und westphälische Petrefacten schrieben und zwar in seinem Werke: Naturgeschichte des Niederdeutschlands etc., mit sieben ausgemahlten Kupfertafeln. Nürnberg bei Gabriel Nikolaus Raspe, 1781. Er gehört also zu den Vätern der Versteinerungskunde am Rheine und halten wir es für unsere Pflicht, dessen Andenken zu ehren und sein rühmliches Streben anzuerkennen, wenn auch seine Schrift für den jetzigen Standpunkt der Wissenschaft von geringer Bedeutung ist.



letztere nicht die mindeste Spur von Aehnlichkeit mit *Rostellaria elongata* hat. *Pleurotoma remote-lineata*, Geinitz, in den Versteinerungen von Kieslingswalda, Tab. 5, fig. 6, nähert sich in etwa der *Pyrula fenestrata*, Roemer, ist aber keineswegs identisch damit, eben so wenig wie mit *Rost. elongata*. Das Petrefact, wie Reufs meint, zu *Fasciolaria*, Lam. zu stellen, schien uns unthunlich, denn diese Gattung bietet zu wenig charakteristische Merkmale, als dafs sie selbstständig bestehen könnte. Quoy und Gaimard haben nachgewiesen, dafs die Thiere bei *Fusus* und *Fasciolaria* keine Gattungsverschiedenheiten zeigen und vereinigen demnach *Fasciolaria* wieder mit *Fusus*, Lamarck, Tom. 9, pag. 431, Ausgabe 1843. Dazu kommt nun auch noch der Mangel der Falten auf der Spindel bei dem in Rede stehenden Petrefact.

Das Gehäuse des *F. Hüpschianus* ist lang gestreckt, schlank und spindelförmig, es besteht aus 5 gewölbten Windungen mit stark hervortretenden Längsfalten oder vielmehr Längsrippen in weiten Abständen, ausserdem ist dasselbe fein querlinirt. Vollwachsene Exemplare sind 2 Zoll 8 Linien lang. Die unterste Windung ist 2 Linien länger, als das übrige Gewinde. Die grösste Breite hat das Petrefact an der Naht des untersten Umganges, wo sie 10 Linien beträgt. An den Nähten zeigen sich dicht gereihte schmale Längsfalten. Die unterste Windung verlängert sich in einen ziemlich breiten, langen Kanal. Die Spindel ist glatt, der Mundsäum scharf, etwas nach Aufsen gebogen, so dafs Roemer das Petrefact leicht für *Rostellaria* halten konnte. Ueberall im hiesigen Grünsande als Steinkern häufig.

***Pyrula*, Lamarck.**

Beim Anblick der vielen lebenden Species, welche zur Gattung *Pyrula* gezählt werden, konnte es keinem Beobachter entgehen, dafs sich hier eine so grofse Mannigfaltigkeit der äufseren Form der Species findet, wie es sonst bei keiner Gattung der Fall ist. Dasselbe gilt auch von den urweltlichen Species. Viele Autoren haben dies lange vor uns eingesehen und mancherlei Vorschläge gemacht, ohne sie zur Ausführung zu bringen. Sowerby in den *Gen. of Schells* will die Gattung auf die Form von *Pyrula ficus* Linné beschränken, Pusch trennt dieselbe in zwei Gattungen, *Pyrula* und *Melongena*, andere wollen sie ganz wegfallen lassen und theils mit *Fusus*, theils mit *Murex* und anderen verwandten Gattungen wieder vereinigen. Nach näherer Betrachtung der lebenden Arten fanden wir, dafs alle bekannten Species sich auf vier Hauptformen zurückführen lassen und fanden beim Studium der Literatur, dafs diese Ansicht schon ausgesprochen war ¹⁾, der wir uns nun auch für die urweltlichen Species anschliessen. 1. *Pyrula*, wobei als Typus *Pyrula ficus*, Lam. (*Murex ficus*, Lin.) gilt; 2. *Melongena*, Schumacher, mit dem Typus von *Pyrula melongena*, Lam. (*Murex melongena*, Lin.), 3. *Pyrella*, Swains, mit dem Typus von *Pyrula spirillus*, Lam. (*Murex spirillus*, Lin.) und 4. *Rapa*, Klein, wobei *Murex rapa*, später *Bulla rapa*, Lin. als Typus dient.

¹⁾ A. N. Herrmannsen indicis generum malacozoorum. Vol. II, pag. 380. „*Pyrula* e muricibus quibusdam et bullis auctorum constitutum genus, absque dubio reformandum. Disjungendæ videntur: *Ficula*, *Melongena*, *Pyrella* et *Rapa*; quæ restant species sive *Fusis*, sive *Purpuris* inserendæ.“



1. *Pyrula*, Lamarck.

Testa ficoidea, ventricosa, depressissima; spira brevissima, vix exerta; suturis vix distinguendis.

1. *P. minima*, Hæninghaus, bei Goldfufs Tab. 172, fig. 10, pag. 27, III.

Unsere Tab. VI, fig. 1, ein Steinkern.

Das Gehäuse ist birnförmig mit einem sehr kurzen, kaum aus dem untersten Umgange hervorragenden Gewinde. Das Ganze ist mit Querlinien versehen, welche von etwas faltigen Längslinien durchkreuzt werden, der Kanal ist kurz, etwas auswärts gebogen. Wir fanden Exemplare mit der dünnen Bedeckung, meist aber Steinkerne, am Lusberg und beim Königsthor.

2. *Melongena*, Schumacher.

Testa pyriformi, ventricosa, spira brevi, valde exerta, acuminata; sutura profundissima, lata.

1. *M. fenestrata*, Roemer.

Pyrula fenestrata, Roemer, Tab. XI, fig. 14, pag. 78.

Wir besitzen zwar nur die unterste Windung dieser Species, dieselbe ist aber so vollkommen erhalten, daß wir nicht den mindesten Zweifel an der Identität mit der von Roemer l. c. beschriebenen Art hegen können. Nach Roemer beträgt das Gewinde nur drei Sechszehntel der ganzen Länge. Diese Kürze des Gewindes und die weite Ausbuchtung des untersten Umganges der ganzen Länge nach ist charakteristisch für die Abtheilung *Melongena*. Die knotigen Querrippen, die breiten, flach concaven Zwischenräume und die starken Längsfalten, welche mit den Querrippen Gitter bilden, machen die Species leicht kenntlich. Kommt bis jetzt nur bei Vaelsbrug vor.

3. *Pyrella*, Swains.

Testa anterieus ventricosa, inflata, longe caudata; spira brevi, mamillifera (?); sutura lata.

1. *P. planulata*, Nilsson. Tab. III, fig. 5, pag. 13. (*Pyrula planulata*). Roemer. Tab. XI, fig. 11, pag. 78.

Trägt ganz den Charakter der Abtheilung und gleicht der *Pyrula spirillus*, Lam. im ganzen Habitus. Wir fanden bis jetzt nur Steinkerne, die mit der Zeichnung bei Roemer übereinstimmen, wo die drei bis vier Querkiele, die auch bei unseren Exemplaren scharf hervortreten, herausgehoben sind, die wir aber bei Nilsson vermissen. Ueber die Bedeckung müssen wir auf die angeführten Schriftsteller verweisen, weil unsere Exemplare keine Spur davon tragen.

2. *P. Beuthiana* ¹⁾, Müller. Tab. VI, fig. 7. Steinkern.

Diese Species erinnert der Form nach etwas an *Murex haustellum*, Linn. Das ganze Gehäuse ist birnförmig, sehr bauchig und besteht aus 4 sehr convexen Windungen, von welchen die

¹⁾ Diese Species haben wir dem Pater *Franciscus Beuth* zu Ehren benannt; er gehört, wie Hüpsch, zu den ehrenwerthen Männern, die mit äußerst schwachen Hilfsmitteln die Petrefactenkunde des Rheinlandes aufzuhellen bemüht waren, die der Zeit für ein Studium schon begeistert waren, dessen Bedeutsamkeit in der Zukunft sie nicht ahnen konnten. Wenn wir auch aus *Francisci Beuth* „*Julia et*

unterste fast doppelt so lang ist, als das übrige Gewinde. Die beiden unteren Umgänge tragen breite, gerundete, der Länge nach laufende Erhabenheiten mit flachen Zwischenräumen. Die Nähte sind breit und tief. Nach der Analogie mit lebenden Species zu urtheilen muß der Kanal lang sein. Kommt vor am Königsthor.

4. Rapa, Klein.

Testa rapiformi, antcrius ventricosissima; cauda brevi, lata; spira brevi, retusa; sutura impressa.

1. *R. coronata*, Roemer. Unsere Tab. VI, fig. 2.

Pyrula coronata, Roemer. Tab. 11, fig. 13.

Wir glauben in dem vor uns liegenden Petrefact die *Pyrula coronata* Roemer zu erkennen, obgleich einige unwesentliche Einzelheiten davon abweichen. Das Gehäuse besteht aus 3 Windungen, von welchen die unterste sehr bauchig und dreimal so lang ist, als das übrige, wenig vorstehende Gewinde. Die unterste Windung ist oben stumpf gekantet, mit breiten, dicken Längsrippen versehen, welche von stark aufliegenden, faltigen Querlinien durchkreuzt werden. In den Durchschnittspunkten bilden diese Querlinien auf den Rippen Knoten, die an den Kanten als Höcker hervortreten. Zwischen den Höckern und der Naht ist eine Einbiegung, hinter dieser letzteren erhebt sich aber die Windung wieder ¹⁾ und überwächst gleichsam die Naht dergestalt, daß dasjenige, was die zweite Windung zu sein scheint, nur ein Fortsatz der untersten Windung ist. Unter den oben angegebenen Längsrippen laufen über den breiten und kurzen Kanal stark hervortretende Querfalten. Am Lusberg und am Königsthor.

2. *R. Monheimi*, Müller. Tab. V, fig. 22 und 23.

Das Gehäuse ist birnförmig, es besteht aus 4 Windungen, wovon die eine die andere wie mit einem Bande umfaßt. Die unterste Windung ist mit sehr stark hervorragenden, plötzlich abbrechenden Längswulsten versehen, zwischen welchen sich sehr tiefe Furchen bilden. Diese Wulste sind der Quere nach durch feine Rinnen in vier Knoten getheilt. Die obersten Knoten bilden die Kante, von welcher bis zum nächsten Umgang nur feine Querlinien laufen. Die übrigen Windungen tragen keine Wulste, sondern nur gerundete Knoten. Der Kanal ist ziemlich kurz und beginnt gleich unter den Wulsten, über dieselben laufen in schräger Richtung hochaufliegende Querlinien. Fig. 22 ist nach einem mit der Bedeckung erhaltenen Exemplar von Vaelsbrug gezeichnet, fig. 23 ist ein Steinkern vom Königsthor.

Voluta, Linné.

1. *V. d'Orbigniana*, Müller. Tab. V, fig. 27, a—b.

Diese Species hat eine sehr auffallende Aehnlichkeit mit *Voluta Gasparini*, *d'Orbigny*, Tab. 220, fig. 5, pag. 325, Tom. II, so daß wir geneigt waren, sie dahin zu ziehen. Bei näherem

Montium subterranea etc.“ *Düsseldorpii* 1776, für die Wissenschaft wenig gelernt haben, so sind wir doch dadurch auf manche Fundorte aufmerksam gemacht worden. Was aus dem Museum des Herrn *Beuth* zu Düsseldorf geworden ist?

¹⁾ Zum genaueren Verständniß des hier Gesagten vergleiche man die lebende *Voluta vespertilio*, Linné.

Vergleich unterscheiden sich die beiden Species im Wesentlichen dadurch, daß die Umgänge bei *Vol. Gasp.* Kanten, dagegen bei unserer Species dieselben sanft gerundete Convexitäten bilden, ohne Spur einer Kante. Das spindelartige Gehäuse hat 6 Umgänge, von welchen der unterste um $\frac{1}{3}$ länger ist, als das übrige Gewinde. Der ganzen Länge der Windungen nach laufen scharf hervortretende, in ihrer ganzen Ausdehnung gleich starke Längsrippen, zwischen welchen sich tiefe Zwischenräume bilden. Die unterste Windung zählt 16 solcher Rippen. In den Zwischenräumen zeigen sich feine Querlinien. Die Spindel trägt zwei Falten. Der Mundsaum ist glatt. Vollständig erhalten bei Vaelsbrug.

2. *V. cingulata*, Müller. Tab. V, fig. 24, a—b.

Das Gehäuse ist spindelförmig und besteht aus 5—6 Windungen, welche mit dicken, ziemlich entfernt stehenden Längsrippen versehen sind, die in ihrer Mitte etwas stärker sind. Der unterste Umgang zählt deren neun. Ueber das Ganze laufen noch höchst feine, dicht gereichte Querlinien, die nur unter der Loupe deutlich sind. Vor der Naht einer jeden Windung befindet sich als Fortsatz der Umgänge ein schmaler Gürtel oder schwaches Band, auf welchem sich schwache Längsfalten zeigen, die sich in den Vertiefungen zwischen den Rippen fortsetzen. Die Spindel zeigt zwei deutlich hervortretende Falten und unter der Loupe noch zwei schwächere. Vollständig erhalten bei Vaelsbrug.

3. *V. nitidula*, Müller. Tab. V, fig. 25, a—b.

Das Gehäuse ist länglich eiförmig und besteht aus vier Windungen, von welchen die unterste doppelt so lang ist, als das übrige Gewinde. Alle Windungen sind stark convex und reihen sich mit wenig vertieften Nähten eng aneinander. Der Länge nach ist das ganze Gehäuse mit dicht gereichten erhabenen Linien bedeckt, welche durch Querlinien in gleichen Abständen durchkreuzt werden und dadurch dem Ganzen ein ganz regelmäßig gekörntes Ansehen geben. Die Spindel trägt zwei starke Falten. Kommt beim Königsthor, am Lusberg und bei Vaelsbrug vor.

4. *V. Benedeni*, Müller. Tab. VI, fig. 5, a—b.

Das Gehäuse hat ganz die Form eines *Fusus*, wozu ich es bereits gezählt hatte, ehe es mir möglich war, bei einem Exemplar die Spindel völlig frei zu machen. Es besteht aus vier Windungen, von welchen die unterste mehr als doppelt so lang ist, als das übrige Gewinde. Das Ganze zeigt wulstige Längsrippen mit vertieften Zwischenräumen, über beide laufen erhabene Querlinien oder vielmehr Reifchen. Die Spindel hat zwei starke Falten. Bei Vaelsbrug.

5. *V. laticostata*, Müller. Tab. V, fig. 26, a—b.

Pleurotoma suturalis, Goldf. Tab. 170, fig. 12, pag. 19, III.

Pleurotoma semiplicata, v. Münster bei Goldfufs, Tab. 170, fig. 11, pag. 19, III, ist wohl auch hieher zu ziehen.

Nachdem die Tafel V vollendet war, gelangten wir erst in Besitz von vollständigeren Exemplaren, welche sich ganz unzweideutig als *Voluta* ausweisen. Auf der Spindel sind drei Falten, wovon die untere sehr stark hervortritt, die zweite schwächer und die dritte wenig bemerkbar ist. Die Zeichnung ist darnach zu berichtigen.



Der ganze Habitus der Schnecke hat viel Aehnlichkeit mit der lebenden Species *Mitra vulpecula*, Lam. Das Gehäuse besteht aus 5—6 Windungen, die schlank aufeinander gehürmt sind. Alle Windungen tragen äußerst scharf hervortretende breite Längsrippen in verhältnißmäßigen Abständen; in den dadurch entstehenden tiefen Zwischenräumen und selbst auf den Rippen der untersten Windung laufen Längsfalten, welche sich auf den etwas rückwärts gebogenen untersten Theil derselben zusammen schürzen. Die Windungen stoßen mit einem ziemlich breiten, faltigen Bande aneinander. Auf der dritten Windung machen sich noch ganz feine Querlinien bemerkbar. Wir besitzen bis jetzt nur Exemplare mit 4 Windungen von Vaelsbrug.

Außer den vorstehenden Arten führt Roemer noch pag. 80 *Voluta ambigua*, Mantell, von Aachen an, welche wir indessen bis jetzt noch nicht aufgefunden haben.

Conus, Linné.

1. *C. cylindraceus*, Geinitz. Tab. 18, fig. 18, pag. 72. — Reufs. Tab. 11, fig. 11 und 19, pag. 47, I. Dagegen scheint uns fig. 15, auf Tab. 44 nicht hierher zu gehören.

Das äußerst kleine, aus drei Windungen bestehende Gehäuse ist cylindrisch, nach unten sich allmählig verschmälernd; das Gewinde erscheint fast flach und nur in der Mitte schwach erhaben, die unterste Windung bildet daher oben eine Kante. Die Bedeckung haben wir nicht gesehen, nach Geinitz und Reufs ist dieselbe mit feinen Querlinien bedeckt, welche von entfernteren, feinen Längslinien durchkreuzt werden. Bis jetzt nur selten am Königsthor.

Turbo, Linné.

Die Gattungen *Turbo* und *Trochus* haben, wie schon Deshayes in seiner *description de coquilles caractéristiques des terrains*, pag. 186, bemerkt, so viele feine, fast unmerkliche Uebergänge zu einander, daß es schwer wird mit scharfen Gränzen zu bezeichnen, wo *Turbo* aufhört und wo *Trochus* anfängt¹⁾. Dies gilt schon von den lebenden Gattungen, um so mehr aber von den urweltlichen, wo es sehr häufig schwer hält, die Mundöffnungen bloß zu legen. Wir haben die Gattungen *Turbo* und *Trochus* getrennt und uns dabei von der äußeren Form leiten lassen. Die Individuen mit mehr oder weniger scharfen, kantigen Rändern an der Basis oder auch an den übrigen Windungen, so wie die mit Längsrippen auf den Windungen zählen wir zu *Trochus*, die übrigen zu *Turbo*.

¹⁾ Deshayes und Milne Edwards bemerken in ihrer Ausgabe von Lamarck, Tom. 9, pag. 121, nachdem sie die neuesten Forschungen über *Trochus*, *Turbo*, *Delphinula* und *Monodonta* besprochen haben „Il est résulté pour nous de tout ce qui précède que tous ces genres doivent être fondus en un seul dans lequel il sera nécessaire, indispensable même de faire un grand nombre de groupes etc.“ Es wäre gewiß eine verdienstliche Arbeit, wenn Jemand, dem ein reiches Material zu Gebote steht, in einer Monographie die vier Gattungen unter *Trochus* vereinigte und eine Gruppierung derselben vornähme.



1. *T. laevis*, Nilsson. (*Trochus laevis*, Nilsson). Tab. III, fig. 2, pag. 12.

Wir fanden bis jetzt nur Steinkerne am Lusberg, genau so, wie die angeführte Abbildung sie darstellt. Das Gehäuse besteht aus 4 convex gerundeten Umgängen. Das Gewinde tritt ziemlich stark hervor. Die Nähte sind tief.

2. *T. concinnus*, Roemer. (*Trochus concinnus*, Roemer.) Tab. 12, fig. 9, pag. 81.

Das Gehäuse ist schlank, kegelförmig, es hat 6 gewölbte Umgänge, wovon jeder mit zahlreichen, etwa 10—12 Querlinien und glatten, etwas breiteren Zwischenräumen versehen ist. Die Nähte sind tief. Am Lusberg und am Königsthor, selten mit erhaltener Bedeckung.

3. *T. cyclostomoides*, Müller. Tab. V, fig. 28.

Diese Species steht der vorstehenden am nächsten, die Steinkerne unterscheiden sich leicht durch die Anzahl der Windungen, deren sie nur 4 zählen. Die Umgänge sind gewölbt und mit mehr als doppelt so zahlreichen, etwa 20—24 feinen Querlinien bedeckt, wie bei *T. concinnus*. Die Nähte sind weniger tief. Die Mundöffnung ist kreisrund. Die ganze Form und Bedeckung ähnelt gar sehr der lebenden *Cyclostoma elegans*. Vorkommen wie bei der vorstehenden Art.

4. *T. quinquecinctus*, Müller. Tab. V, fig. 8.

Das Gehäuse ist schlank, kegelförmig, mit stark hervortretendem Gewinde. Es hat 5—6 Windungen, wovon jede 5 gerundete, etwas gekörnte Gürtelchen trägt. Die Nähte sind sehr breit und trennen dadurch die einzelnen Windungen auffallend von einander. Die Mundöffnung ist länglich rund. Kommt bei Vaelsbrug und am Königsthor vor.

5. *T. quadricinctus*, Müller. Tab. V, fig. 7, a—b.

Das Gehäuse ist niedrig, kreiselförmig und besteht aus 5 Windungen. Jede derselben trägt 4 stark gekörnte Gürtelchen, zwischen diesen finden sich vor und über der Naht ganz feine gekörnte Linien, welche auf den beiden untersten Windungen selbst mit dem unbewaffneten Auge sichtbar sind. Die Nähte der beiden untersten Umgänge sind breit und trennen dieselben sehr auffallend, die übrigen Windungen verlaufen in einander ohne bemerkbare Naht. Die Mundöffnung ist eirund. Bis jetzt nur am Lusberg.

6. *T. Walfredini*, d'Archiac¹⁾. Tab. 24, fig. 6, a—b, pag. 341.

Von dieser Species sind uns bis jetzt nur Steinkerne vorgekommen, welche 4—5 Windungen haben, die alle stark gerundet sind und rückwärts gebogene, feine Längsfalten zeigen. Die Einschnürungen an den Nähten sind tief, die Mundöffnung kreisrund, der Mundrand von der Windung getrennt. Der Nabel tief. Am Lusberg und vor dem Königsthor.

7. *T. glaber*, Müller. Tab. V, fig. 6, a—b.

Hat einige Aehnlichkeit mit der vorstehenden Species. Das Gehäuse ist mehr niedergedrückt als erhaben. Die Windungen 4—5 sind gerundet, bilden aber vor den Nähten schmale Flächen. Die Nähte sind kaum bemerkbar. Die Mundöffnung ist schief, mehr viereckig als rund, der Mundsaum ist glatt und mit der Windung zusammen gewachsen. Der Nabel ist tief. Um den Nabelrand stehen deutlich hervortretende Rippchen, die sich nach Innen und Außen ganz allmähig

¹⁾ Rapport sur les fossiles du Tourtia, par M. le vicomte d'Archiac; dans les memoires de la société géologique de France. Deuxième série. Tome deuxième. — Deuxième partie. Paris 1847.

verlaufen. Dem unbewaffneten Auge erscheint das Gehäuse völlig glatt, bei genauer Betrachtung ist dasselbe aber mit äußerst feinen, ganz regelmäßigen Querlinien bedeckt, welche von etwas faltigen Längslinien durchschnitten werden. Vollständig erhalten bei Vaelsbrug, als Steinkern auch am Lusberg und vor dem Königsthor.

7. *T. paludiniformis*, *d'Archiac*. l. c. Tab. 23, fig. 10, a, b.
Unsere Tab. V., fig. 10¹⁾.

Das Gehäuse besteht aus 5 Windungen, die sich in schwach convexen Windungen thurmformig erheben. Die Nähte sind ziemlich tief. Die Umgänge sind mit gedrängt stehenden, feinkörnigen Reifchen versehen. Die Körnchen stehen schräge übereinander und sind durch feine Längslinien verbunden, dadurch bilden je 4 und 4 Körnchen in dem Zwischenraum ein Viereck. Die Mundöffnung ist groß, fast rund. Bei Vaelsbrug, am Lusberg und vor dem Königsthor.

Trochus, Linné.

1. *T. onustus*²⁾, *Nilsson*. Tab. III., fig. 4, A B, pag. 12.

Das Gehäuse besteht aus 4—5 schmalen, flachen Windungen, so daß dasselbe viel breiter, als hoch ist. Die beiden obersten Windungen liegen fast in einer Ebene, oder stehen nur schwach hervor. Der unterste Umgang hat einen scharfen, hin und wieder überhängenden, gebogenen Rand. Die beiden untern Windungen sind grubig und runzlich mit aufsitzenden fremden Körpern, im Uebrigen sind dieselben ohne alle Zeichnung. Die Basis ist völlig glatt, der Nabel eng, ziemlich tief; die Mundöffnung länglichrund. Die Nähte sind kaum bemerkbar. Was die natürliche Bedeckung und Größe betrifft, so stimmen dieselben mit *Trochus cumulans Brongn.* überein, der ganze Habitus aber mehr mit *Trochus agglutinans Lamarck*. Wir fanden bis jetzt vier Exemplare vor dem Königsthor, die aber alle um mehr als ein Drittel kleiner sind, als die Figuren bei *Nilsson* sie darstellen. Das Petrefact bei *Goldfuss* Tab. 181, fig. 10., pag. 50 III. gehört nach Zeichnung und Beschreibung nicht hieher³⁾.

2. *T. Konincki Müller*. Tab. V., fig. 11.

Nach unsern oben bei der Gattung *Turbo* ausgesprochenen Ansichten stellen wir dies Petrefact zu *Trochus*, was sonst zu *Delphinula Lam.* gehören würde, womit dasselbe in den meisten, wenn auch nicht in allen Stücken übereinstimmt. Aus guten Gründen verwerfen *Deshayes* und

¹⁾ Es gibt leider die Figur nur ein schwaches Bild des Petrefacts, die Windungen sind zu convex und namentlich die letzte derselben zu bauchig gehalten, auch die Körnung ist mangelhaft gezeichnet.
²⁾ *D'Orbigny* in dem mehrerwähnten Werk trennt *Phorus Montfort*, vielleicht nicht mit Unrecht, von *Trochus*. Diese Species würde dann offenbar zu *Phorus* gehören. Ueber die Ansicht *d'Orbigny's* in Betreff des Vorkommens von *Phorus* vergl. Seite 3 unserer Einleitung.
³⁾ Wir haben das von Aachen herstammende Exemplar des ausgezeichneten Bonner Museums mit den unsrigen verglichen und die vollständigste Übereinstimmung damit gefunden. Die Zeichnung bei *Goldfuss* muß daher nach einem Exemplar aus der Sammlung des Herrn Grafen von Münster genommen sein. Bei *Dr. Aug. Kranz* in Bonn sahen wir Exemplare aus der Kreide von *Haldem* in Westphalen, die an Größe und Form der Abbildung bei *Goldfuss* ganz gleich kommen.



Milne Edwards bei *Lamarck*. Tom. 9, pag. 84—86 die Gattung *Delphinula*. Was *d'Orbigny* darüber l. c. Tom. II., pag. 208 beibringt, vermag unsere Ansicht nicht zu ändern und paßt seine Diagnose der Gattung weder auf unser Petrefact noch überhaupt auf die bis jetzt bekannten Species, die zu *Delphinula* gerechnet werden. Das auffallendste Unterscheidungs-Merkmal der Abtheilung von *Trochus*, wozu *Delphinula* dann zu zählen sei, ist der sehr vertiefte Nabel, welcher sich mit einer tiefen, breiten Rinne dem ganzen innern Mundrand entlang fortsetzt. Man vergleiche die lebende Species *Delphinula laciniata Lamarck (Turbo delphinus Linné)*. Auf diese eigenthümliche Rinne ist soviel uns bekannt noch nicht gehörig aufmerksam gemacht worden.

Das Gehäuse besteht aus vier Windungen, die mit kaum bemerkbaren Nähten zusammenhängen. Jeder der drei untern Umgänge ist durch einen scharfen und dabei faltigen Kiel in zwei Hälften getheilt. Die unterste Windung hat unter diesem Hauptkiel, der scharfe Spitzen trägt, einen zweiten etwas schwächern, zwischen diesen bildet sich eine tiefe concave Rinne, in welcher sich rückwärts gebogene Linien und Falten befinden. Diese Windung ist mit übereinander liegenden Falten bedeckt, die auf der folgenden Windung immer schwächer werden und von unregelmäßigen Querlinien durchsetzt werden. Die Schale ist dünn; die Mundöffnung groß, länglich rund. Der Mundsaum ist glatt, scharf, nach Außen an der Windung angewachsen, nach Innen erhebt er sich und bildet mit einer Franzigen Fortsetzung des Nabelrandes eine tiefe, im Innern faltige Rinne bis zum untersten Mundwinkel. Der Nabel selbst ist tief. Wir fanden bis jetzt nur ein Exemplar dieses Petrefactes in ausgezeichnete Erhaltung bei Vaelsbrug.

Pleurotoma, Lamarck.

Es fällt oft sehr schwer Versteinerungen aus der Kreide und den ältern Formationen mit Sicherheit zu dieser Gattung zu zählen. Viele Arten, welche wir in Sammlungen sehen, und andere, welche wir nur nach den Zeichnungen kennen, möchten sich bei Auffindung besser erhaltener Exemplare wohl theils als *Fusus*, theils als *Voluta* und *Phasianella* ausweisen. Wo der die Gattung charakterisirende Ausschnitt (*fissura vel sinus*) gar nicht oder nur schwach und undeutlich zu erkennen ist, mag die meist ziemlich stark vertiefte Rinne auf der Windung noch einen Anhalt zur Bestimmung geben, wo auch diese fehlt, sollte man stets die Gattung unentschieden lassen. Wie aber *Kner* ¹⁾ bei der Beschreibung eines vermeinten *Fusus procerus* pag. 21 überhaupt bemerken kann, er müsse bekennen, daß er in Hinsicht der beiden Gattungen *Fusus* und *Pleurotoma* eine Trennung nicht für nothwendig und naturgemäß halten könne, ist uns auffallend. Er bezieht sich dabei auf die Ansicht von *Pusch*, der freilich in seiner Schrift (1837) über *Polens Paläontologie* pag. 142 die Gattung *Pleurotoma* angreift, übersieht aber dabei die Forschungen der spätern Zeit, die auch den verschiedenen Organismus der Thiere der beiden Gattungen nachgewiesen haben. In denselben Fehler ist auch *d'Orbigny* verfallen, der

¹⁾ Versteinerungen des Kreidemergels von Lemberg und seiner Umgebung von Professor Dr. Rudolph Kner mit 5 Tafeln, abgedruckt aus den naturhistorischen Abhandlungen von W. Haidinger. Band III, Abtheilung 2, Wien 1848.

aufser *Pleurotoma* auch noch *Pyrula*, *Fasciolaria* und *Cancellaria* mit *Fusus* vereint. Nur bei *Fasciolaria* finden wir die Vereinigung mit *Fusus* begründet.

1. *P. Heisiana*, Müller. Tab. V, fig. 12.

Das Gehäuse ist kurz, gedrängt, spindelförmig in der Mitte stark aufgetrieben, so daß die ganze Gestalt sich der Form von *Trochus* sehr nähert und diese Species zu der früher von *Lamarck* aufgestellten, später eingezogenen Abtheilung (*Clavatula*) mit kurzem Kanale gehören würde. Das Petrefact besteht aus 4 Windungen, von welchen die unterste mehr als doppelt so lang ist, wie die drei übrigen, dieselbe hat der Quere nach eine tiefe Rinne, welche nach Aufsen von zwei scharfen etwas lappigen Kielen begränzt werden. Zwischen der Rinne laufen der Länge nach feine Falten, welche durch eine Querlinie in der Mitte getrennt werden. Der Ausschnitt ist kurz, von gleicher Breite mit der Rinne. Die folgenden Windungen tragen in der Mitte einen scharf hervortretenden Kiel. Ueber das ganze Gehäuse laufen feine Querlinien, außerdem zeigen sich noch vor der Naht des untersten Umganges zarte Körnchen. Die Nähte sind kaum sichtbar. Der Kanal ist kurz und bis zu der beschriebenen Rinne mit schräglaufenden starken Linien versehen. Wir fanden bis jetzt zwei wohlerhaltene Exemplare bei Vaelsbrug.

2. *P. induta*, Goldfufs. Tab. 170, fig. 10, pag. 19, III.

Wir haben die Exemplare des Bonner Museums und noch besser erhaltene bei Herrn Dr. *August Kranz*, sämmtlich von *Haldem* in Westphalen herstammend, genau angesehen, so wie auch die *Pleurotoma semilineata Münster*, von ebendaher und glauben uns überzeugt zu haben, daß sämmtliche von *Goldfufs* aus der Kreide herstammende als *Pleurotoma* beschriebenen Arten nicht zu *Pleurotoma* gehören. *Reufs* streicht pag. 110, II, seine *Pleurotoma Roemeri*, Tab. 9, fig. 10, a, b, c, d, so wie auch *Pleurotoma remote-lineata*, *Geinitz*, Tab. 17, fig. 5, pag. 70 und dessen Nachtrag Tab. 5, fig. 6, und verweist sie zu *Fasciolaria*, wir stellten dieselbe pag. 37 zu *Fusus*. Bei *Lamarck* Tab. 9, pag. 345, bemerkt *Deshayes* über *Pleurotoma* (1845): »il y a un fait remarquable, c'est que, jusqu'à présent du moins il n'y en a pas une seule espèce au-dessous des terrains tertiaires.« Wir haben den Namen *Pl. induta* beibehalten, bis wir die Gattung zuverlässig zu bestimmen im Stande sein werden. *Geinitz* im Quadergebirge pag. 138 macht daraus, vielleicht mit Recht, *Voluta induta*. Das Petrefact kommt vor in der Wolfsgracht bei Gümlich und bei Kunraad.

Pleurotomaria, DeFrance.

Von dieser in der Kreideformation in ziemlich zahlreichen Arten vertretenen Gattung finden wir bis jetzt in unserer Umgebung nur wenig Representanten und zwar:

1. *Pl. gigantea*, Sow. bei *Fitton*, Tab. 14, fig. 16, pag. 339. — Bei *Goldfufs* Tab. 187, fig. 6, a, b, c, pag. 77, III. — *Reufs*, Tab. 7, fig. 18, pag. 47, I. — *Geinitz*, Nachtrag Tab. 5, fig. 5, pag. 10 und dessen Grundrifs Tab. 15, fig. 3, 4, pag. 356. — Mit *Reufs* auch *Trochus jurensisimilis*, *Roemer*, *Oolith* Tab. X, fig. 13, pag. 151, hieherzuziehen scheint uns bedenklich.

Diese Species verdient mit Recht ihren Namen, denn *Sowerby* sah ein Exemplar von 7 Zoll Durchmesser. Sie ist so breit wie hoch, mit 5 schwach gewölbten, ebenen, sich dachförmig



erhebenden Windungen. Wir sahen bis jetzt nur glatte Steinkerne. Nach *Sowerby* war die Schale nur mit Querlinien gestreift (concentrically striated), nach *Goldfuss* sehr fein gegittert. Die Basis ist flach-convex, fast eben, scharfkantig, weit und tief genabel. Bis jetzt nur Steinkerne vor dem Königsthor und in der Wolfsgracht, selten.

2. *Pl. linearis*, *Mantell*. Bei *Reufs* Tab. 10, fig. 8, a, b, pag. 47, I und pag. 111, II, wo derselbe eine Menge später entstandener Species auf diese eine zurück führt. Wir haben uns von der Richtigkeit der Ansicht, so weit unsere literarischen Quellen reichen, überzeugt und müssen im Uebrigen auf die angeführten Stellen bei *Reufs* verweisen. Wir halten demnach für identisch mit *Pleurotomaria linearis*, *Mantell* :

Pl. distincta, *Dujardin*. Bei *Goldfuss* Tab. 187, fig. 1, a, b, c, pag. 75 und 76, III.

Pl. velata, *Goldf.* Tab. 187, fig. 2, a, b, c, pag. 76, III. — Nicht hieher zu gehören scheint uns dagegen *Pl. velata* bei *Kner* Tab. 3, fig. 12, pag. 18, 19, welche, wenn sie nicht zu *Pl. gigantea* gehört, wohl eine neue Species bilden muss.

Pl. granulifera, v. *Münster*. Bei *Goldfuss* Tab. 187, fig. 3, a, b, pag. 76, III.

Pl. plana, v. *Münster*. Bei *Goldfuss* Tab. 187, fig. 4, a, b, pag. 76, III.

Pl. perspectiva, d'Orbigny. Tab. 196, fig. 1—5, pag. 255, II.

Pl. Mailleana, d'Orbigny. Tab. 195, fig. 1—10, pag. 253, II, ebenso die bei *Kner* unter demselben Namen Tab. 3, fig. 11 und Tab. 4, fig. 2, pag. 18, abgebildeten und beschriebenen Exemplare.

Pl. Haueri, *Kner*. Tab. 4, fig. 1 und 1 a, pag. 18.

Wie es möglich ist, dass aus einer und derselben Species so viele scheinbar verschiedene Arten aufgestellt werden können, wird dem am leichtesten klar, der Gelegenheit hat, mit eigenen Augen zu sehen, wie verschieden die Exemplare derselben Art und derselben Lokalitäten erscheinen und zwar durch Zerdrückung, durch mehr oder minder erhaltener Bedeckung, durch Verschiedenheit der Altersstufe u. s. w. Die Beschreibung bei *Reufs* l. c. stimmt mit einem unserer ganz gut erhaltenen Exemplare völlig überein. Das Gehäuse ist breit, kreisrund, niedrig kegelförmig, kaum halb so hoch als breit, mit 5 gewölbten, über der Mitte gekanteten Umgängen, die an der Oberfläche mit erhabenen, ziemlich dicht gereihten Querlinien bedeckt sind; über diese laufen bei gut erhaltenen Exemplaren noch feine Längslinien. Die Basis mit dem Nabel haben wir nicht bloß legen können. Nach *Reufs* ist derselbe weit. Kommt im Mergel bei Vaels vor. Die große Verbreitung, welche dies Petrefact hat, machen dasselbe zu einer Leitmuschel der oberen Kreide.

Triton, Lamarck.

1. *T. cretaceum*, *Müller*. Tab. V, fig. 2, a, b.

Es ergänzt dies Petrefact eine bis dahin in der Kreide noch nicht nachgewiesene Gattung. Wir würden großes Bedenken getragen haben, dasselbe dahin zu rechnen, wenn das vor uns liegende Exemplar nicht alle Zweifel beseitigte, und uns nicht volle Gewissheit über die Gattungs-Bestimmung gäbe. Wir halten uns dabei an *Lamarck's* Diagnose: testa ovata vel oblonga,

basi canaliculata; varicibus vel alternis vel raris aut subsolitariis, seriesque longitudinales nequaquam formantibus. Apertura oblonga. Es beweiset dieser glückliche Fund wieder, wie Unrecht es ist zu behaupten, daß diese und jene Gattungen in der Kreideformation nicht vorkämen, wie *d'Orbigny* pag. 330, II, bei der Familie *Muricidae* thut, wo es heißt: les genres *Ranella*, *Murex*, *Triton* manquent au sein des terrains crétacées, n'ayant paru sur le globe qu'avec les terrains tertiaires. Das Kreidegebirge ist in seinem paläontologischen Theile noch zu wenig erforscht, als daß apodictische Sätze über das Vorkommen von Klassen und Gattungen aufgestellt werden könnten.

Das Gehäuse ist länglich-eiförmig; es besteht aus 5 gewölbten Windungen, wovon die unterste bis zur Spitze des Kanales noch etwas länger ist, als das übrige Gewinde. Die Bedeckung besteht aus zarten Querlinien, welche durch etwas stärker hervorstehende, gebogene Längsrippen durchschnitten werden. Die bezeichnenden Wülste treten stark heraus und stehen schräge übereinander, jeder der drei unteren Umgänge trägt zwei solcher Wülste, auf den oberen verlieren sich dieselben. Die Mundöffnung ist wulstig, oval. Der Kanal ist kurz, etwas nach Außen gebogen. Bis jetzt nur im Grünsand bei Vaelsbrug in bester Erhaltung.

Cerithium, *Bruguère*.

1. *C. fasciatum*, *Reufs*. Tab. X, fig. 4, pag. 42, I.

Wir haben der sonst genauen Beschreibung von *Reufs* berichtigend hinzuzusetzen, daß vollständig erhaltene Exemplare, wie sie vor uns liegen, 13—14 Windungen zählen. Ferner ist das thurmformige Gehäuse nicht stumpf, sondern nadelspitz. Die drei obersten Windungen sind meistens abgebrochen und so könnte der Irrthum bei *Reufs* leicht entstehen. Die beiden Körnerreihen auf jeder Windung und das feiner gekörnte, vor der Naht etwas vertieft liegende Reifchen machen die Art leicht kenntlich. Alle Exemplare haben nur die bei *Reufs* angegebene Größe. Ob *Roemer's C. binodosum* Tab. XI, fig. 16, pag. 79, hierher zu ziehen sei, bleibt zweifelhaft, denn daß angegeben wird, es habe dies etwa 6 Windungen, kann nichts entscheiden. Wie man überhaupt aus den beiden unteren Windungen auf die Anzahl der Windungen des Ganzen, namentlich bei einem *Cerithium* schließen kann, bleibt uns unerklärlich. Die Windungen des *C. fasciatum* beweisen dies auffallend, denn die drei untersten Windungen desselben sind länger als die darüber stehenden 10—11 zusammen genommen. *C. fasciatum* fanden wir bei Vaelsbrug.

2. *C. foveolatum*, *Müller*. Tab. VI, fig. 2.

Das Gehäuse ist sehr schlank, thurmformig, spitz und besteht aus 16—17 Windungen. Jeder Umgang trägt drei Reifchen, welche in regelmäßigen Zwischenräumen von Längsrippen durchschnitten werden. Von diesen letzteren hat jede drei spitze Erhabenheiten. Zwischen je vier und vier dieser Erhabenheiten bildet sich eine länglich runde, ganz glatte Vertiefung. Der Rand der Mundöffnung war an unserem Petrefact abgebrochen. Die Verschiedenheit dieser Species von *Cerithium reticulatum*, *Sow.*, bei *Reufs* Tab. XI, fig. 22, pag. 42, I, ist augenfällig, obgleich sie demselben zunächst steht. Bis jetzt nur bei Vaelsbrug im Grünsand.



3. *C. Rhyckholti*, Müller. Tab. V, fig. 9.

Das Bild stellt nur ein junges Exemplar dar, wir besitzen davon Steinkerne mit theilweise erhaltener Bedeckung von fast dreifacher Gröfse. Das Gehäuse ist thurmförmig mit breiter Basis, es besteht aus 6 Windungen. Dieselben schliessen mit kaum sichtbarer Naht dicht aneinander. Die Windungen biegen sich vom Rande zur Naht etwas einwärts. Der Rand der Windungen ist mit wulstigen, länglichen Knoten versehen. Ueber diese Knoten, so wie auch über das ganze Gehäuse laufen deutlich hervortretende, dicht gereimte Querlinien. Die Mundöffnung ist groß, den Mundsaum haben wir nicht beobachten können. Nicht selten am Lusberg, vor dem Königsthor und zu Vaelsbrug im Grünsand.

4. *C. Sartorii* ¹⁾, Müller. Tab. VI, fig. 4, a—b.

Das Gehäuse ist thurmförmig, schlank und besteht aus 13 bis 14 Windungen, die sich nach der Spitze hin rasch verjüngen. Jede Windung trägt eine Doppelreihe Knoten. Die Knoten der oberen Reihe sind etwas schwächer, als die der unteren. Gleichsam mitten in den Nähten liegt ein mit feinen Körnchen bedecktes Reifchen, welches von zwei Linien eingefasst ist, wovon die untere unter der Loupe noch ganz zarte Körnchen zeigt. Auf den untersten Umgängen sind zwischen den Knotenreihen noch einzelne Querlinien sichtbar. Der Kanal ist kurz. Die Mundöffnung bildet einen starken Wulst mit feinen Längsfalten. Bemerkungswerth ist noch der bedeutende Wulst auf der untersten Windung der Mundöffnung gegenüber, indem auf keine der folgenden Windungen sich Wülste zeigen. Das Petrefact fanden wir bis jetzt nur im Grünsand bei Vaelsbrug, jedoch in vortrefflicher Erhaltung.

5. *C. Geinitzii*, Müller. Tab. VI, fig. 8.

Das Gehäuse ist thurmförmig und besteht aus etwa 10 Windungen, wenn wir eine nicht zu rasche Verjüngung der Spitze annehmen, die an unseren Exemplaren abgebrochen ist. Die Windungen sind stark gewölbt. Jeder Umgang zeigt fünf Reifchen mit Knoten besetzt. Die Knoten der Mittelreihe sind stärker als die der beiden darunter und darüber liegenden. Die Knoten stehen etwas schräge übereinander und sind der Länge nach schwach verbunden, so daß dadurch ein Gitter entsteht und allemal sich zwischen vier derselben eine Vertiefung zeigt. Auf den drei unteren Windungen zeigen sich keine Wülste, die folgenden haben aber solche, dieselben stehen aber nicht übereinander, sondern wechselnd. Ueber das ganze Gehäuse laufen noch äußerst feine Querlinien. Der Kanal ist kurz; vor demselben stehen drei etwas schräg laufende scharfe Kiele. Die Mundöffnung haben wir nicht bloß legen können. Am Lusberg und vor dem Königsthor selten.

6. *C. Nerei*, v. Münster. Goldf. Tab. 174, fig. 3, pag. 34, III.

Wir glauben diese Species in vielen Bruchstücken mit den 7 oberen Windungen von Vaelsbrug und von dem Königsthor erkannt zu haben, wir sind aber nicht vollkommen gewiß über die Identität der bei Goldfufs beschriebenen Art. Derselbe sagt, sie habe 12 vierseitige Win-

¹⁾ Benannt nach dem Nestor der Aachener Aerzte und Brunnen-Inspektor Herrn Dr. von Sartorius, der mit besonderer Vorliebe für Naturwissenschaften alle dahinzielende Studien mit Begeisterung und Aufopferung fördern hilft.

dungen mit etwas gebogenen Längsreihen, die keine regelmässige Längsreihen bildeten. *Geinitz* im Quadersandstein-Gebirge pag. 142 gibt auch das Vorkommen der Species bei Aachen an.

7. *C. binodosum*, *Roemer*. Tab. 11, fig. 16, pag. 79.

Wir stellen diese Species der Vollständigkeit wegen hierher, obgleich wir bei unserem mehr als zwanzigjährigen Sammeln dieselbe hier noch nicht aufgefunden haben. Dadurch soll aber die Richtigkeit der Species und das hiesige Vorkommen nicht in Frage gestellt werden.

***Capulus*, *Montfort*.**

Mit Recht haben die neueren Schriftsteller den älteren Gattungsnamen beibehalten und die Benennung *Pileopsis* von *Lamarck* fallen lassen. Unseres Wissens ist bis jetzt nur eine einzige Species aus der Kreide beschrieben und zwar *Pileopsis elongata* (*Capulus elongatus*) v. *Münster*, bei *Goldfufs* Tab. 168, fig. 12, pag. 12, III. Die Gattung reicht übrigens bis in den ältesten Silurischen Kalk hinauf, ist in einer ansehnlichen Zahl von Arten im Bergkalk vorhanden, zeigt sich in der Oolithenperiode und entwickelt sich sehr mannigfaltig im Tertiären, nach unserem früher aufgestellten Grundsatz konnte sie daher in der Kreide nicht fehlen und sind wir überzeugt, daß dieselbe noch eine Anzahl Arten birgt, die den Uebergang zu den zahlreichen Arten des Tertiären vermittelt. Wir fanden noch drei neue Species.

1. *C. militaris*, *Müller*. Tab. VI, fig. 9.

Das Gehäuse erhebt sich zuerst ganz allmähig und mit geringer Abnahme der Breite von der Basis aus. Das oberste Drittel desselben verschmälert sich aber rasch und endet in eine gebogene, etwas seitwärts gekrümmte, stumpfe Spitze, das Ganze sieht daher einer Schlafmütze ähnlich. Die Oeffnung ist sehr schräge, oval und wird dadurch der hintere Theil, im Verhältniß zum vorderen, weit kürzer. Die vordere Seite ist glatt, die hintere etwas gerunzelt, besonders gegen den Mundsaum hin. Kommt vor beim Königsthor.

2. *C. carinifer*, *Müller*. Tab. VI, fig. 10.

Dieser *Capulus* zeichnet sich durch den Rand aus, der den hinteren Theil des Gehäuses umgibt, es scheint uns, als wenn derselbe das Ganze umgeben hätte. Das Gehäuse ist niedergedrückt, gewölbt, sich ganz allmähig in eine Spitze verschmälern und mit dem oberen Theile etwas seitwärts gebogen. Die Spitze an unserem Exemplar ist abgebrochen, scheint aber stumpf gewesen zu sein. Von der Spitze aus laufen nach dem Rande hin divergirende gekielte Rippen mit flachen Zwischenräumen. Vom Rande bis zur Hälfte der Schale hinauf zeigen sich faltige Querlinien, die sich nach der Spitze hin mehr und mehr verlieren. Fundort wie bei der vorstehenden Species.

3. *C. Troscheli*, *Müller*. Tab. VI, pag. 11.

Pileopsis compressa ¹⁾, *Müller*.

Das Gehäuse bildet von der Vorderseite gesehen ein Dreieck. Dasselbe erhebt sich nur wenig, doch fast senkrecht. Die Vorderseite ist schwach convex, mit Querfalten versehen, die nach

¹⁾ In den Verhandlungen der Naturforscher zu Aachen pag. 302. *Goldfufs* beschrieb aber schon eine *Pileopsis compressa* aus dem devonischen Kalk.

der Spitze hin allmählig schmaler werden. Die Hinterseite erscheint concav und die Falten kaum sichtbar. Durch die Einbiegung der Hinterseite erscheint das Petrefact wie aus zwei Schalen zu bestehen, die beim Zusammentreffen eine Kante bilden. Die Spitze ist stumpf, die Basis elliptisch. Kommt ebenfalls am Königsthor vor.

Aus derselben Lokalität liegen noch zwei andere Species vor uns, die wir aber wegen Mangelhaftigkeit der Exemplare vorläufig bei Seite legen.

Fissurella, Brugière.

F. laevigata, Goldfufs. Tab. 167, fig. 14, pag. 8, III.

Wir müssen bekennen, daß wir dies Petrefact bis heute noch nicht aufgefunden haben, da wir dasselbe aber auch anderwärts, als aus dem Grünsand von Aachen stammend angeführt finden, so nehmen wir keinen Anstand, die Beschreibung von Goldfufs hierher zu setzen, ohne Gewährleistung für das hiesige Vorkommen geben zu können. Das Gehäuse ist kreiselförmig, glänzend, mit unregelmäßigen, sehr feinen concentrischen Streifen. Der Scheitel liegt außer dem Mittelpunkte, seine Oeffnung scheint oval zu sein. Der Umfang ist eiförmig.

Crepidula, Lamarck.

Bis jetzt war uns diese Gattung nur aus dem Tertiären bekannt und selbst darin ist die Zahl der dahin gehörenden Arten verhältnißmäßig gering.

1. *C. cretacea*, Müller. Tab. VI, fig. 12.

Das Gehäuse ist sehr gewölbt, nach beiden Seiten gleichmäßig abfallend. Die Gestalt ist länglich rund, nach der Spitze hin schmaler und nach dem unteren Rande sich erweiternd. Die Spitze ist stark seitwärts gedreht, mit einem kurzen, fast flachen Gewinde, wie bei einer *Haliotis*. Das Ganze ist mit zarten Querfalten bedeckt, welche von der Spitze bis zur Hälfte des Gehäuses von feinen, etwas gebogenen Längslinien durchschnitten werden. Im Innern ragt die Platte, welche die Gattung characterisirt, ziemlich stark hervor und setzt sich nach dem rechten Rande etwas fort. Zu *Exogyra* konnten wir das Petrefact nicht zählen. Wir besitzen bis jetzt nur ein wohl erhaltenes Exemplar aus dem Grünsande bei Vaels.

Es erscheint uns nicht unangemessen, zum Schlusse dieser Abtheilung eine tabellarische Zusammenstellung der Gattungen aus der hiesigen Kreide mit numerischer Angabe der Species derselben beizufügen. Wir stellen dabei des Vergleiches wegen vier Rubriken auf, von welchen die erste die Namen der Gattungen, die zweite die Anzahl der Species, welche nach Geinitz im Quadergebirge pag. 124—144 bis jetzt in ganz Deutschland aufgefunden wurden, die dritte die Anzahl der im Aachener Gebiete vorkommenden und endlich die vierte die Zahl derjenigen, welche wir für neue Species halten, nachweist. Es wird daraus dann leicht erhellen, welche Gattungen für die Kreideformation neu sind und wie sich die Zahlenverhältnisse ihrer Species zu einander herausstellen. Die mit einem Asteriskus bezeichneten Gattungen waren auch in



den übrigen Kreidebildungen auferhalb Deutschlands noch nicht nachgewiesen. Eine fünfte Rubrik mit der Angabe der Fundorte haben wir nicht für nöthig erachtet, weil mit Ausnahme der einzigen Species *Pleurotomaria linearis* alle übrigen Gattungen und Species aus dem Grünsande herkommen.

Tabellarische Uebersicht

der Gattungen der Gasteropoden der deutschen Kreideformation und der numerischen Verhältnisse der Arten.

Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
1. Turritella, Lamarck.....	10	24	16	Ad 1. Die große Differenz der Zahlen erklärt sich theilweise dadurch, daß bei <i>Geinitz</i> mehrere Species von <i>Goldfuss</i> als synonym aufgeführt sind, die wir als besondere Species behandelt haben.
2. *Bulla, Linné.....	—	1	1	
3. Scalaria, Lamarck.....	1	4	2	
4. Rissoa, Fréminville.....	—	2	2	
5. Eulima, Risso.....	3	2	2	Ad 3. Wir vermischen bei <i>Geinitz</i> <i>Scalaria Philippi</i> , <i>Reufs</i> .
6. Chemnitzia, d'Orbigny.....	—	1	1	
7. Pyramidella, Lamarck.....	1	1	1	
8. Nerinea, Defrance.....	3	—	—	
9. Actæon, Montfort.....	2	7	5	
10. Actæonella, d'Orbigny.....	2	—	—	Ad 10. Die Gattung <i>Actæonella</i> haben wir von <i>Actæon</i> nicht getrennt.
11. Volvaria, Lamarck.....	1	1	—	
12. Avellana, d'Orbigny.....	—	4	3	Ad 12. <i>Geinitz</i> hat <i>Avellana</i> mit <i>Ringicula</i> verbunden.
13. Ringicula, Deshayes.....	4	—	—	
14. Globiconcha, d'Orbigny.....	—	1	1	
15. Natica, Lamarck.....	7	8	3	
16. Nerita, Linné.....	3	—	—	
17. Litorina, Sowerby.....	—	1	—	Ad 17. <i>Litorina rotundata</i> führt <i>Geinitz</i> als <i>Natica vulgaris</i> auf.
18. Pleurotoma, Lamarck.....	—	2	1	
Zu übertragen.....	37	59	38	



Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
Uebertrag.....	37	59	38	
19. Trochus, Linné	32	9	5	Ad 19 & 20. <i>Geinitz</i> hat <i>Turbo</i> mit <i>Trochus</i> vereint, dem wir hier gefolgt sind.
20. Turbo, Linné				
21. Solarium, Lamarck.....	2	—	—	
22. *Cassidaria, Lamarck.....	—	1	1	
23. Pleurotomaria, Defrance.....	8	2	—	
24. Rostellaria, Lamarck.....	13	13	6	
25. Strombus, Linné.....	8	2	2	
26. Conus, Linné.....	2	1	—	
27. Voluta, Lamarck.....	6	5	5	
28. *Ancillaria, Lamarck.....	—	1	1	
29. Mitra, Lamarck.....	1	3	3	
30. *Murex, Linné.....	—	1	1	
31. *Triton, Lamarck.....	—	1	1	
32. Fusus, Lamarck	15	20	14	Ad 32 & 33 wie oben bei 19 & 20, sind hier <i>Fusus</i> und <i>Py-</i> <i>rula</i> verbunden.
33. Pyrula, Lamarck				
34. Buccinum, Lamarck.....	3	1	1	
35. Cerithium, Bruguière.....	11	7	4	
36. Capulus, Montfort.....	1	3	3	
37. *Crepidula, Lamarck.....	—	1	1	
38. Fissurella, Bruguière.....	3	1	—	
39. Emarginula, Lamarck.....	2	—	—	
40. Acmæa, Escholz.....	9	—	—	
41. Dentalium, Linné.....	6	5	2	
42. *Vermetus, Adanson.....	—	1	1	
	159	136	89	



Das Erscheinen der zweiten Abtheilung unserer Monographie ist durch manche unausweichbare Hemmnisse länger hinausgeschoben worden, als wir bei der Veröffentlichung der ersten Abtheilung voraussetzen durften, zumal da dieselbe schon derzeit im Wesentlichen vollendet war. Uebrigens erschienen die drei ersten Bogen der vorliegenden Abtheilung nebst Tab. III bereits im September 1849 im Programm des Aachener Gymnasiums, dem wir damals durch Separatabdrücke der Abhandlung eine möglichst große Verbreitung im geologischen Publikum verschafften. Diese Verzögerung des Erscheinens hat aber der Arbeit nur nützen können, denn wir benutzten dazu noch manche interessante Belehrung, welche uns während der Zwischenzeit durch Männer der Wissenschaft in persönlichem Verkehr mit denselben zu Theil wurde. Wir zählen dazu die Herren *Alexander von Humboldt*, *Leopold von Buch*, *von Dechen*, *Næggerath*, *Göppert*, *Koch*, *Geinitz*, *F. Roemer*, *Murchison*, *Pradt*, *De Koninck*, *Dumont* u. A. Nicht wenig verdanken wir auch den brieflichen Mittheilungen der für die Wissenschaft zu früh dahingeschiedenen Herren *Goldfufs* und *Becks*, so wie auch vorzüglich denen des Herrn *von Hagenow* und der Herren *de Rhyckholt* und *Bosquet*. Was die literarischen Hülfsmittel betrifft, so waren wir meistens auf unsere eigene Bibliothek angewiesen, in manchen Fällen unterstützten uns auf das bereitwilligste die Herren *von Dechen*, *Næggerath* und *F. Roemer* mit einzelnen Schriften, die uns fehlen. Wir führen dies deshalb an, damit uns der Vorwurf nicht treffe, als hätten wir manche Schriftsteller oder die Citate Anderer nicht gehörig berücksichtigt. Alle Stellen, welche wir anführten, sind gewissenhaft von uns verglichen worden, sollten dennoch im Drucke Irrthümer eingeschlichen sein, so bedarf es wohl kaum der Entschuldigung bei solchen, welche mit derartigen Arbeiten vertraut sind.

Was die Lokalitäten betrifft ¹⁾; so sind dieselben überall genau angegeben, was wir mit um so größerer Zuverlässigkeit thun konnten, weil wir alle von uns beschriebenen Petrefacten an Ort und Stelle selbst gesammelt haben oder unter unseren Augen von wissbegierigen Schülern herausgefördert wurden. Wenn wir bei vielen Petrefacten als Fundort bloß Vaelbrug angeben, so soll damit nicht bezeichnet werden, daß sich das Vorkommen auf diese kleine Strecke beschränkt, sondern damit meinen wir auch das naheliegende Bauerfeld, den Escherberg, kurz, den Vaelser Grünsand, auf den wir in unserer ersten Abtheilung zuerst aufmerksam machten. Zugleich müssen wir noch bemerken, daß dieser Sand in paläontologischer Beziehung den Muschelconglomeraten vor dem Königsthor, am Lusberg, am Grundhaus und im Aachener Walde fast gleich steht. Denn im Verlaufe der Zeit haben wir an genannten Stellen die meisten Gattungen und Species des Vaelser Grünsandes aufgefunden. Dieser Grünsand ist aber das vollständigste Aequivalent des Blackdowner Grünsandes, wie uns die englischen Geologen und ganz neulich noch *J. T. Bowerbank* versicherten, der hinzusetzte, daß er sowohl die Vaelser

¹⁾ Wie unzuverlässig, namentlich in manchen älteren Schriften, Fundorte angegeben werden, ist unglücklich und erfordert daher das wissenschaftliche Interesse die größte Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit. Um hier ein Beispiel anzuführen, so gibt *von Schlotheim* in seiner Petrefactenkunde, pag. 310, 311 und an anderen Stellen, als Fundort von Kreidepetrefacten Cosfeld bei Aachen an; wohl nur eine Verwechslung mit Coesfeld in Westphalen.

Masse, als auch die daraus geförderten Petrefacten von den Blackdowner nicht zu unterscheiden vermöchte. Terebrateln und Echinodermen fehlen indessen unserem Grünsand ganz und gar. Der über dem Grünsande liegende Mergel enthält die Petrefacten der oberen weissen Kreide von Rügen, Meudon, Dover, Chatam und anderer Lokalitäten, er ist reich an Terebrateln und Echinodermen, enthält aber fast gar keine Gasteropoden, woran der Grünsand so überaus reich ist. Das Gestein in der Wolfgracht und noch mehr das bei Hoselt stimmt petrographisch und paläontologisch mit den Schichten von Haldem in Westphalen überein und scheint uns unzweifelhaft dem Grünsande anzugehören. Wir erwarten darüber die Bearbeitung der westphälischen Kreide von *F. Roemer*, wie wir mit Vergnügen aus einem Briefe desselben an Herrn *L. von Buch* in der deutschen geologischen Gesellschaft, Band II, Heft I, pag. 12—14, ersehen. Wir haben die Ueberzeugung, daß derselbe, wenn er die Petrefacten von Haldem dabei einer näheren Untersuchung unterwirft, viele von uns aufgestellte Species des Grünsandes darin bestätigen und gewiß noch manche neue auffinden wird. Die Kreidebildung bei Aachen ist aber nach ihren organischen Einschlüssen offenbar eine zweifache, eine jüngere und eine ältere, welche durch ihre Petrefacten sehr scharf geschieden sind. Nehmen wir an, daß die Mastrichter Schichten noch über der weissen ¹⁾ Kreide liegen, so hätten wir dann selbst eine dritte Bildung bei Vetschau, wo die Fischzähne, die kleinen Korallen, die Echinodermen und die meisten Petrefacten von Maastricht vorkommen, die bei Vaels theilweise, und im Grünsand fast gänzlich fehlen. Die Mastrichter und Vetschauer Schichten sind daher leichter mit den Vaelser Mergeln zu verbinden, als diese letztere mit dem Grünsande. Die Petrefacten des Grünsandes gehören daher in dem Verzeichniss bei *Geinitz* jedenfalls nicht zu dem oberen, sondern müssen zu dem mittleren, mit Uebergängen in den unteren Quadermergel gezählt werden. Das Verzeichniss des Herrn *Geinitz* halten wir, abgesehen von der Eintheilung des Quadergebirges, für eine sehr mühevollen, verdienstliche und gewiß tüchtige Arbeit, wenn wir auch in manchen Punkten der dort geübten Kritik, besonders was die Species betrifft, entgegengesetzter Ueberzeugung sind, die wir an anderer Stelle auszusprechen und darzulegen beabsichtigen.

Der Grund, weshalb in diese Abtheilung die Cephalopoden, wie ursprünglich unser Plan war, nicht mit aufgenommen worden sind, ist einzig der, weil diese Abtheilung im Verhältniss zu der ersten und noch folgenden dritten zu umfangreich geworden wäre.

Geinitz zählt in seiner Tabelle bereits 1500 Bewohner der Quadermeere auf, allein die Zahl derselben, so bedeutend sie auch schon erscheinen mag, wird sich in nicht gar ferner Zeit verdoppeln. Wir glauben dies mit um so größerer Zuversicht aussprechen zu dürfen, wenn wir die außerordentliche Verbreitung der Kreidebildungen, wie *L. von Buch* ²⁾ sie zuerst in so genialer Weise darlegt, in's Augen fassen und dabei berücksichtigen, wie wenig Lokalitäten

¹⁾ Nach *L. von Buch* ist die obere Kreide nur weifs im nördlichen Europa, dagegen in der Schweiz schwarz, in Italien roth.

²⁾ Betrachtungen über die Verbreitung und die Grenzen der Kreidebildungen. Mit einem Theile der Weltkarte in Merkator's Projektion. In den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Sechster Jahrgang, 1849, pag. 211—242.



bis heute noch einer näheren und genügenden paläontologischen Untersuchung unterzogen worden sind. Nach brieflichen Mittheilungen des Herrn *von Hagenow* ist derselbe mit einer ausführlichen Bearbeitung der Korallen aus der Kreide beschäftigt und wird dabei nicht unterlassen, die Menge Novitäten anderer Familien und Gattungen aus Rügen selbst, und was er in reicher Ausbeute in Schweden sammelte, zu veröffentlichen. Ebenso versprechen wir uns viel von der Bearbeitung der Belgischen Kreide, womit die Herren *de Koninck* und *Nyst* die Literatur bereichern werden.

Mögen unsere Beiträge zur Paläontologie einen neuen Beweis liefern, wie unermesslich die Lebewelt jener Meere war, und welche unendliche Schätze der Schoofs der Erde noch birgt! Sie warten nur auf die fördernde Hand und den forschenden Geist, um an das Licht zu treten und Gottes Größe und Allmacht mit zu verherrlichen.



Nachträge und Berichtigungen

zur ersten und zweiten Abtheilung.

Seit dem Erscheinen der ersten Abtheilung unserer Monographie (1847) ist uns manches Neue, was wir damals noch nicht kannten, in die Hände gekommen, Anderes, was wir zurücklegten, durch bessere Exemplare bestimmbar geworden. Nur was zuverlässig und sicher erschien, theilen wir in diesen Nachträgen mit. Mehr als 50 Petrefacten aus unserer Kreide mußten wir daher auch jetzt noch zurücklegen und würden wir sie gern einem kühneren Enträthseler, als wir sind, überweisen, wenn der Wissenschaft damit ein Dienst geleistet würde. Wir unseres Theils, wir wollen die Zeit abharren, die bedächtig und ruhig uns die Schleier lüften hilft, die aber ein gewaltsames Zerreißen und Eindringen nur mit Irrthum straft.

Zur ersten Abtheilung.

Seite 5, hinter *Ast. Dunkeri* :

3. *Asterias punctata*, v. Hagenow in literis.

Wir hatten bei *Ast. quinqueloba* bereits darauf aufmerksam gemacht, daß wir Täfelchen gefunden hätten, bei welchen die ganze Oberfläche siebförmig durchlöchert sei. Unser verehrter Freund, Herr von Hagenow, dem wir solche Exemplare zuschickten, sandte uns ganz dasselbe Petrefact von Rügen, wo dasselbe, wie er bemerkt, häufig vorkommt. Er bestimmte die Species als *Ast. (Goniaster) punctata*. Sie unterscheidet sich von *Ast. quinqueloba* dadurch, daß ihre ganze Oberfläche siebförmig durchlöchert ist, während bei *Ast. quinqueloba* nur die Mittelfläche so durchbohrt ist, um welche aber ein kahles, glattes Bändchen als Einfassung sich herumzieht. Exemplare aus der Kreide bei Chatham von *Ast. quinqueloba* mit vielen zusammenhängenden Täfelchen stimmen darin überein. Von Hagenow fand noch 5 neue Species in der Rügener Kreide und scheint dieselbe demnach reich an Species dieser Gattung. Leider sind die Täfelchen nicht leicht aufzufinden und zusammenhängende Stücke höchst selten. *Ast. punctata* kommt vor im Mergel bei Vaels.

Seite 6 vor *Cidarites* einzuschalten :

***Bourguetocrinus*, d'Orbigny.**

B. ellipticus.

Encrinus ellipticus, Schlotheim, Nachtr. z. Petr., Tab. 25, fig. 1.

Apiocrinus ellipt., Miller, bei Goldfufs Tab. 57, fig. 3, pag. 186, I. — Reufs, Tab. 20, fig. 28—33, pag. 59, II. — Bronn, Leth. geog., Tab. 29, fig. 12, pag. 603.

Wenn wir auch nie gezweifelt hatten, daß nach den übrigen Petrefacten zu urtheilen die Vaelser Mergel nicht ohne Crinoiden seien, so wollte es uns früher doch nicht gelingen, Theile



davon aufzufinden. Die neuere Zeit liefs uns aber einzelne dahin gehörige Säulenglieder in die Hände kommen. Stellenweise finden sich dieselben in dem Hornstein des Aachener Waldes sehr häufig.

Seite 8 bei *Galerites* zuzusetzen :

3. *Galerites vulgaris*, Lamarck. Bei Goldfufs Tab. 40, fig. 20, a, b, pag. 128, I.

Galerites abbreviatus, Lamarck. Bei Goldfufs Tab. 40, fig. 21, pag. 128, I.

Galerites pyramidalis, Desmoul. Nach Roemer pag. 32.

Bronn, Lethæa geog. Tab. 29, fig. 17, a, b, pag. 616.

Das Petrefact ist halbkugelig, kegelförmig, stark gewölbt. Die Mundöffnung liegt genau in der Mitte, der After dicht vor dem Rande, beide sind kreisrund. Bis jetzt nur selten im Feuerstein des Aachener Waldes.

Seite 10 zu *Micraster* :

1. *Micraster Bufo*, Cuv. In der Description géologique des environs de Paris, par G. Cuvier et Alex. Brongniart, Paris 1822, nouvelle édition, von Alex. Brongniart als *Spatangus Bufo*, aufgeführt Tab. V, fig. 4, A, B, C, pag. 84. — Bei Goldfufs Tab. 47, fig. 6.

Wohl zu unterscheiden von *Schizaster Prunella*, Lamarck, mit dem er sonst große Aehnlichkeit hat. Abgesehen von der bedeutenderen Gröfse des *M. Bufo* liegen bei demselben auch die Fühlergänge bedeutend eingedrückt. Kommt vor im Hornstein des Aachener Waldes.

Seite 10 zu *Holaster* :

Holaster suborbicularis, Defr. Bei Cuvier und Brongn. Tab. 5, fig. 5, A, B, C, pag. 84. — Bei Goldfufs Tab. 45, fig. 6.

Wir fanden Exemplare im Hornstein des Aachener Waldes und in dem Mergel bei Vaels.

Seite 12 vor *Serpula gordialis*, Schloth.

Serp. tuba, Sow. Bei Fitton Tab. 16, fig. 3, pag. 340.

Wir können uns mit der Kritik von Geinitz Quadergebirge, pag. 104—106, durchaus nicht einverstanden erklären, denn er führt dort eine Menge von Species auf *Serp. plexus*, Sow. zurück, die nach unserer Ansicht ganz verschieden sind, manche davon haben nicht einmal Aehnlichkeit mit einander. Wir würden hier zu weitläufig werden müssen, wenn wir eine Kritik der dort aufgezählten Species schreiben wollten. Die oben angeführte Art halten wir für eine selbständige, die z. B. mit *implicata*, v. Hag. nichts gemein hat. Wir besitzen viele hundert Exemplare von der Gröfse eines bis drei Zoll, die alle mit *Serp. tuba* übereinstimmen. Es sind einfache runde Röhren, meist grad gestreckt, einzelne nur wenig gebogen, von ganz gleichem Durchmesser der ganzen Länge nach. Die Bedeckung zeigt schwache Querfalten, die Schale ist mittelmäßig dick, Sowerby gibt sie dünn an, was aber nur bei verwitterten Exemplaren richtig ist. Kommt von allen Serpuliten hier am häufigsten vor im Grünsand bei Vaels und am Königsthor und Lusberg. Da die ersten hundert Exemplare, die wir fanden, alle fast gestreckt waren, so glaubten wir es mit einem *Dentalium* zu thun zu haben und schickten sie daher unseren Freunden unter diesem Gattungsnamen. Von Hugenow in lit. machte uns zuerst darauf aufmerksam, daß es eine *Serpula* sei.



Zu *Serpula quadrangularis*, Roemer ziehen wir mit Geinitz l. c. *Serpula conteriata*, v. Hagenow, Jahrb. 1840, Tab. 9, fig. 18, pag. 668. Roemer hatte wohl nur mangelhafte Exemplare vor Augen und nennt das Petrefact glatt, v. Hagenow machte darauf aufmerksam, das die abgerundeten Kanten sparrenförmig quergekerbt sind, was wir bestätigen können.

Seite 12, hinter *Serpula quadrangularis* vor c. Röhren vierseitig :

Serpula prolifera, Goldfufs. Tab. 68, fig. 11, a—g, pag. 231, I.

Wir besitzen aus dem Mergel bei Vaels ein Exemplar, welches mit den angeführten Abbildungen und der Beschreibung so genau übereinstimmt, das wir dieselbe Species darin erkennen müssen. Es ist uns dabei nicht entgangen, das die Bonner Exemplare aus dem Jura bei Streitberg herkommen.

Seite 12, vor der Abtheilung C :

d. Röhren siebenseitig.

Serpula heptagona, v. Hagenow. Bronn's Jahrbuch 1840, pag. 669. — Bei Roemer pag. 101.

Wir haben der ausführlichen Beschreibung von v. Hagenow nichts zuzusetzen. Die Species ist leicht kenntlich an den 7 Kielen, welche der Länge nach über dieselbe laufen. Sie erreicht die Dicke eines Federkieses. Die Röhre scheint sich unter einem rechten Winkel erhoben zu haben, drehte sich aber etwas während des Wachstums auf der eigenen Achse, und stehen daher die Kiele nicht senkrecht. Nicht selten bei Vaels und Vetschau.

Seite 12 vor der Abtheilung D :

Serpula arcuata, v. Münster, bei Goldfufs Tab. 70, fig. 10, a, b, pag. 237, I.

Geinitz im Quadergebirge, pag. 102, hält diese Species für identisch mit *Serpula fluctuata*, Sow., wozu er auch *Serpula undulata*, v. Hagenow zieht. Da uns keine Exemplare der letztgenannten Species vorliegen, so müssen wir uns des Urtheils darüber enthalten. Unsere Exemplare stimmen mit Zeichnung und Beschreibung bei Goldfufs überein. Selten auf Belemniten bei Vaels.

Seite 2 am Ende :

Serpula umbilicata, v. Hagenow. Bronn's Jahrbuch 1840, pag. 666.

Serpula pygmæa, v. Hagenow, ib. 667, halten wir für nur ganz junge Individuen von *Serpula umbilicata*. Letztere unterscheidet sich von *Serpula subrugosa*, v. Münster wesentlich dadurch, das sie glatt ist, während letztere Querfalten zeigt. Auf Belemniten und Terebrateln im Mergel bei Vaels.

Talpina? von Hagenow.

Von Hagenow stellt in der oft erwähnten Abhandlung über die Rügen'schen Kreidepetrefacten, pag. 670 und 671, die Gattung *Talpina* auf und zählt dieselbe den bohrenden Molusken zu. Eine genau wissenschaftliche Diagnose gab er davon noch nicht und sind wir bis jetzt noch aufser Stand, mehr darüber zu sagen, als l. c. angeführt ist, wir können indessen das Vorkommen der noch räthselhaften Wesen bestätigen, denn auch auf den Belemniten von Vaels kommen die von v. Hagenow angeführten Arten *T. solitaria* und *T. ramosa* und ebenso *T. foliacea* und *T. sentiformis* vor, welche wir durch die Güte des Herrn von Hagenow aus der Kreide



von Rügen besitzen und mit unseren Exemplaren vergleichen konnten. Ausser diesen glauben wir noch andere Species der fraglichen Gattung auf Belemniten gefunden zu haben, wir führen davon nur an *T. rotunda*, welche sich durch ihre kreisförmige Gestalt von den genannten wesentlich unterscheidet.

Was die Gattung selbst nun aber betrifft, so glauben wir, daß ein älterer Namen für dieselbe schon vorhanden ist. In der ausgezeichneten Monographie der Gattung *Productus* von L. de Koninck (Liège 1847), pag. 254, finden wir eine Gattung Parasiten angeführt, welche in den Schalen von Molusken lebte und von Nardo mit dem Namen *Vioa* in der Revue zoologique de la société cuvérienne, Février 1846, bezeichnet wird. Leider stand uns diese Schrift nicht zu Gebote und können wir daher über die Identität von *Talpina* und *Vioa* kein Urtheil fällen. Bronn im Index palaeontologicus, pag. 1215, bemerkt, *Talpina* ab *Entobia* vix satis diversa und verweist dabei auf seine Lethæa geognostica, pag. 691, Tab. 34, fig. 12. Wir halten uns aber völlig überzeugt, daß *Talpina* mit *Entobia* nichts gemein hat, denn bei *Talpina* ist von Aushöhungen, wie *Entobia* machen soll, nicht die Rede. Daß *Talpina* ein Parasit ist, unterliegt wohl keinem Zweifel.

Seite 14. Zu *Rhyncholithes* sollte heißen *Rhyncholithus* :

Rhyncholithus ¹⁾ ist offenbar die einzig richtige Bildung aus den Worten ῥύγχος (Schnabel, Schnautze) und λίθος (Stein), also ein Steinschnabel oder Schnabelstein. Die Schreibweisen *Ryncolites*, *Rhyncholites*, *Rhyncholithes*, *Rhyncheolithus* müssen demnach wegfallen. Bei Herrmannsen Indicus gen. Malacoz. Primordia, vol. II, pag. 394 und 395, wird indessen auch diese Benennung auf eine ältere *Hamellus*, Luid (teste Buch) zurückgeführt. Vol. I, pag. 499, wird bei *Hamellus* angegeben Lwyd 1698. Lith. Brit. num. 609. t. Scheuchz. Sciagr. lithol. Wir haben diese Citate nicht vergleichen können, glaubten aber den älteren Gattungsnamen *Hamellus*, Diminutiv von *Hamus* (Fischangel) jetzt noch nicht aufnehmen zu dürfen, weil wir uns die Ueberzeugung nicht verschaffen konnten, ob wirklich bei den älteren Schriftstellern unter *Hamellus* dieselben Petrefacten zu verstehen sind, welche die neueren unter *Rhyncholithus* verstehen.

2. *Rhyncholithus Buchi*, Müller. Tab. VI, fig. 13, A, B, C.

Das vor uns liegende Petrefact hätte uns wohl veranlassen können, eine neue Gattung daraus aufzustellen, wozu der berühmte Gelehrte, dem wir dies Wesen widmeten, uns eher ermunterte als entgegenrieth. Da wir indessen bis jetzt nur ein einziges Exemplar des Petrefactes besitzen, so haben wir es vorläufig zu *Rhyncholithus* gestellt, obgleich dasselbe von den sechs uns bekannten Arten aus dem Muschelkalk und den beiden aus der Kreide in vielen Stücken wesentlich abweicht.

¹⁾ Herrmannsen nimmt die Schreibweise *Rhyncheolithus* für richtig an und setzt hinzu *correctam scripturam proposuit Menke*. Wir halten dagegen diese Bildung für ungriechisch; sagt man doch τευχόφυλαξ, τευχόπυργος, ὄροπέδιον, ὄροσπίλης und nicht τευχόφυλαξ, ὄροπέδιον u. s. w. Demnach sind richtig gebildet *Rhynchocoris* Westwood, *Rhynchosaurus* Owen, *Rhynchostoma* Latreille, *Rhynchocephala* Goldfufs u. v. a. mit ῥύγχος gebildete Zusammensetzungen. Die Wörter aus os verlieren in der Zusammensetzung ohne Rücksicht auf die Deklination einfach das s.



Die Gestalt dieses Rhyncholithen ist fast vierseitig, niedergedrückt. Die Schnabelspitze, fig. A, a, ist stark gerundet, fast halbkreisförmig, glatt und erhebt sich mit einer kahlen Fläche nur sehr wenig. Seitwärts bilden sich, fig. A, b—b, gleichsam zwei Flügel, die über die glatte Schnabelfläche etwas erhaben liegen und deren oberer Theil ebenfalls ohne alle Zeichnung ist. Zwischen diesen Flügeln ist eine Vertiefung und in dieser laufen wellenförmige Querlinien, welche sich bis auf den unteren Theil der Flügel fortsetzen. Die Vertiefung ist nach hinten von einer etwas vorstehenden Linie begrenzt, von dieser Linie fällt der Fortsatz, fig. A, c, der sehr kurz und völlig glatt ist, nach allen Richtungen sanft ab und bildet in der Mitte der Länge nach eine kahle Rinne. Die untere Seite, fig. B, ist ganz glatt. Dieselbe ist aber bis zur Hälfte, d—d, von der oberen Seite getrennt und bildet daher mit jener eine Art Tasche. Diese untere Seite ist in der Mitte etwas eingebogen, liegt an der oberen Seite an und ist nur an den beiden Seiten, d—d, geöffnet. Der Fortsatz, c, ist concav und hat in der Mitte eine Erhabenheit, welcher die auf der entgegengesetzten oberen Seite befindliche Rinne entspricht. Wir fanden das Petrefact in guter Erhaltung bei Vetschau zusammen mit einer Menge kleiner Korallen im Sand.

3. *Rhyncholithus Debeyi*, Müller. Tab. VI, fig. 14, A, B, C.

Herr Dr. *Debey* fand im Gyrolithen-Grünsand des Aachener Waldes diesen gut erhaltenen Rhyncholithen, der nun bereits die dritte Species aus der hiesigen Kreideformation ist. Mit dem von *v. Hagenow* beschriebenen *Rhyn. cretaceus* von Rügen hat derselbe nichts gemein, was wir um so zuverlässiger behaupten können, als Herr *v. Hagenow* die Freundlichkeit hatte, uns eine Zeichnung seines Rhyncholithen anzufertigen und zuzuschicken, womit wir die obige Species vergleichen konnten. Der ganzen Form nach nähert sich derselbe den Rhyncholithen des Muschelkalks. Man vergleiche in dieser Beziehung Graf *Münster's* Beiträge zur Petrefactenkunde, erstes Heft (1843), Tab. V; pag. 68 bis 71. Der vordere Theil, der den Schnabel bildet, besteht aus zwei Dreiecken, A, a—a, welche mit ihrer längsten Seite in einen ziemlich scharfen Kiel zusammen stoßen. Die der Schnabelspitze entgegengesetzte Seite des Dreiecks ist gerade, scharf abgeschnitten, die dritte Seite, die mit dem Kiele die Schnabelspitze, bildet, macht eine schwache Einbiegung. Die von den bezeichneten Dreiecken gebildeten Flächen fallen jäh ab. Der Fortsatz ist gleich hinter dem beschriebenen Schnabel stark zusammengedrückt. Der breite Rücken des Fortsatzes fällt sanft ab, ist oben am Schnabel schmal und erbreitet sich allmähig nach unten, wo er stumpf gerundet, fig. A, e, endet. Ueber den eigentlichen Schnabel laufen feine, wellenförmige, faltenartige Querlinien, die auf dem Fortsatz nur wenig bemerkbar sind. Die untere Seite des Petrefactes, fig. B, ist ganz eigenthümlich. Der dem Schnabel entsprechende Theil, fig. B, b—b, ist glatt, etwas vertieft, zeigt in der Mitte eine flache Wölbung in Form eines Züngleins, das von der Schnabelspitze, sich bis zum Fortsatz ganz allmähig erbreitet. Der Theil zwischen dieser Erhabenheit und dem Schnabelrande bildet daher Vertiefungen. Der Schnabelfortsatz ist vom eigentlichen Schnabel durch eine schwache Furche, b—b; getrennt und liegt etwas erhöht als dieser. Der ganzen Länge nach laufen auf dem Fortsatz unregelmäßige, erhabene Falten.



Seite 14. *Terebratula* zur Abtheilung *A. Plicosa* v. Buch.

Terebratula Hagenowi, Müller. Tab. VI, fig. 16, a—b.

Wir konnten diese Species mit *T. granulata* von Hagenow, Bronn's Jahrb. 1840, pag. 540 bis 541 nicht vereinigen, ebenso wenig mit *Terebratulina Dutempleana* d'Orbigny. Tab. 504, fig. 1 bis 8, womit sie einige Aehnlichkeit hat.

Die Gestalt der Terabratel ist länglich rund. Die Ventralschale ist nur ganz flach gewölbt, hat neun bis zehn starke, perlschnurartige, gekörnte Falten, die von der Schnabelspitze aus nach Stirn und Randkanten hin stark divergiren. Die Falten selbst sind am Stirnrand am breitesten und verschmälern sich allmähig nach dem Schnabel hin. Die Furchen zwischen den Rippen sind glatt. Oberhalb der Stirn zeigen sich einige schwache Anwachsringe. Die Schlofskanten bilden einen spitzen Winkel, sie sind scharf und verlieren sich unvermerkt in die Seitenkanten. Die Area ist glatt und wird von der umgebogenen Dorsalschale gebildet. Der Schnabel biegt sich nur wenig herüber. Die Schnabel-Oeffnung ist rund. Die Dorsalschale ist etwas mehr gewölbt als die Ventralschale, ihre Falten sind sowohl an Zahl, als auch was Körnung und Richtung betrifft gleich mit letzterer. Die Länge übertrifft die Breite nur wenig, die größte Höhe erreicht sie vor der Mitte der Länge unter dem Schnabel und fällt dann gegen Stirn- und Randkanten stark ab, so dafs dieselben scharf erscheinen. Kommt vor im Mergel bei Vaels.

Terebratula Bosqueti, Müller. Tab. VI, fig. 17, a, b, c.

Die Gestalt dieser Species ist kurz gedrängt, fast vierseitig. Die Ventralschale nur mäfsig gewölbt, hat 12 glatte Falten, welche vom Schnabel aus sich nur wenig erbreiten, nach Rand- und Stirnkanten schwach divergiren. Diese Falten sind durch concentrische Ringe durchschnitten und bewirken diese Ringe auf der Schale treppenartige Absätze. Die Schlofs-, Seiten- und Stirnkanten sind stumpf. Die Area ist glatt und wird von der umgewandten Dorsalschale gebildet. Der Schnabel ragt ziemlich stark herüber. Die Schnabelöffnung ist verhältnismäfsig groß, ganz rund. Die Dorsalschale ist sehr stark gewölbt, sie hat dieselben Falten der Ventralschale. Die concentrischen Ringe sind aber auf derselben zahlreicher und vermehren sich bedeutend gegen den Stirnrand, wo beide Schalen wie mit einem feinen Zahnwerk im Zickzack zusammengreifen. Länge und Breite sind fast gleich. Die Dicke ist im Verhältnifs zu letzterer außerordentlich, die Höhe der vorderen Hälfte bedeutender, als in der Gegend des Schlofses. Es gehört diese Species ganz vollkommen zu der Abtheilung *Pugnacea* v. Buch, pag. 33, in dessen Schrift über Terebraten, diese eigenthümliche Bildung der Form ebenso geistreich als klar erläutert ist. Die Species fanden wir im Mergel bei Vaels.

Terebratula compressa, Lamarck.

Davon die Form *Ter. ala*, Marklin, nach Geinitz Quadergebirge, pag. 208. *Ter. alata*, Geinitz Kiesel., Tab. 3., fig. 17, a, b, pag. 18. — *Ter. alata*, bei Nilsson, Tab. 4, fig. 8, pag. 35. — Selten im Mergel bei Vaels.

Seite 15 vor *Trigonia* einzuschalten :

Gastrochaena, Spengler.

1. *G. Amphibæna*, Geinitz, Quadergebirge, pag. 144.
Serpula Amphibæna, Goldfufs, Tab. 70, fig. 16, a, b, pag. 239, I.
Fistulana Amphibæna, Geinitz, Kiesel., Tab. 4, fig. 11—14, pag. 11.
Serpula Amphibæna, Reufs, Tab. 5, fig. 29 bis 32, pag. 19.
Cerambycites, Geinitz, Char., Tab. 3, 4 und 5, pag. 13.

Schon Goldfufs bemerkt l. c., dafs das als *Serpula* beschriebene Petrefact wohl eine Bohrmuschel sein dürfte. Unsere Exemplare beweisen auf die unzweideutigste Weise, dafs Geinitz mit Recht dasselbe zu *Gastrochaena* (*Fistulana*, *Teredo Lamarck*) verweist. Ein Exemplar aus dem Grünsand von Vaels vermögen wir kaum von den zugleich vor uns liegenden lebenden Exemplaren der *Fistulana clava Lamarck*, zu unterscheiden. Die Exemplare, welche wir im Grünsand bei Vaels und Aachen fanden, sind gerade, diejenigen dagegen, die sich im versteinerten Holze finden, sind meist hin und hergebogen. Die Röhre ist dünn, lang, walzenförmig, verdickt sich allmählich und schließt mit einem gerundeten in der Mitte abgeplatteten Ende. Der Durchschnitt ist kreisrund. Die Oberfläche zeigt ringförmige, bald kleinere, bald gröfsere Anwachslinien. Dafs die hiesigen versteinerten Hölzer verschiedene Species enthalten, ist wohl kaum zu bezweifeln, allein sie zu unterscheiden hält schwer. Einzelne Holzstücke, welche wir besitzen, enthalten mehrere hundert Individuen, oder deren verlassene Bohrlöcher. Wir setzen nur noch hierher :

2. *G. voracissima*, Müller.

Cerambycites, Geinitz, Char., Tab. 6, fig. 2, 3

Teredo Argonnensis, Buvigner bei d'Orbigny, Tab. 348, fig. 1—2, pag. 302, III, ziehen wir hierher, nicht aber zu *G. Amphibæna*.

Dieselbe erreicht kaum die Gröfse eines Zolles, verschmälert sich vom dickern Ende aus nur wenig und ist dies letztere gewölbt und völlig rund. Diese Thiere scheinen in außerordentlicher Anzahl zusammengelebt zu haben, denn wir besitzen ein Stück versteinerten Holzes, worin mehrere hundert dicht nebeneinander gereiht sitzen. Im versteinerten Holze und in Conglomeraten des Aachener Waldes.

Seite 16.

Bei *Trigonia aliformis* glauben wir auf die höchst interessanten Bemerkungen des Herrn L. v. Buch in der mehrfach erwähnten Abhandlung über die Verbreitung der Kreidebildungen pag. 230—234 hinweisen zu müssen. Wir haben dadurch erst recht aufmerksam gemacht, uns überzeugt, dafs *Trig. scabra*, *aliformis* und *carinata* nur eine und dieselbe Species ist. Bei einer großen Menge von Exemplaren der verschiedenen Altersstufen und von den verschiedensten Fundorten wurde es uns nicht schwer, die Uebergänge derselben in einander zu beobachten. Nach v. Buch bezeichnen die Trigonien die mittlere Kreide. Bei Geinitz finden wir Seite 158 auch *T. aliformis* (die Synonymen *scabra* etc. sind nicht angeführt) in den obern Quadermergel verzeichnet.



Seite 17 zu *Nucula* vor *Pectunculus*,

Nucula siliqua, Goldfufs. Tab. 125, fig. 13, pag. 156, II. — Geinitz, Char., Tab. 20, fig. 28 und 29, pag. 77. — Reufs, Tab. 34, fig. 11, pag. 7, II.

Das Vorkommen dieser Species, welche Goldfufs aus dem Grünsand von Aachen l. c. schon angab, können wir jetzt auch bestätigen, wir fanden Exemplare vor dem Königsthor und am Lusberg, jedoch äußerst selten.

Seite 19.

Isocardia trigona, Roemer. Tab. 9, fig. 7, pag. 70.

Ist quer, eirund, dreiseitig, stark aufgeblasen mit hohen gegeneinander, stark seitwärts gebogenen Buckeln. Die Muschel ist breiter als lang, sich nach den Buckeln hin bedeutend verschmälernd. Die Steinkerne zeigen Spuren von concentrischen Linien und Falten. Bis jetzt nur vor dem Königsthor.

Seite 20 hinter *Cardita* einzuschalten :

Cyprina, Lamarck.

1. *Cyprina rostrata* ¹⁾, Sow. bei Fitton. Tab. 17, fig. 1, pag. 341. — Bei d'Orbigny. Tab. 271, fig. 1 bis 5, pag. 98, III.

Soviel uns bekannt, ist diese Species in der deutschen Kreide noch nicht nachgewiesen, denn Geinitz zieht mit Recht die Species von *Kieslingswalda* zu *Cyp. Ligeriensis* d'Orbigny. Beide Species sind in der That ganz wesentlich verschieden. *Cyp. rost.* ist viel länger als breit und verschmälert sich bedeutend gegen die Buckel. Die Schale ist sehr stark gewölbt, fällt vor den Buckeln etwas ein, hinter denselben bildet sie aber einen stark hervortretenden, der ganzen Länge nach laufenden Kiel, von welchem dann die Seite sich mit einer schwachen Einbiegung ziemlich steil senkt. Concentrische Linien bilden die Bedeckung. Nach unsern Exemplaren sind die Zeichnungen bei Fitton und d'Orbigny zu breit gehalten. Kommt vor am Lusberg und vor dem Königsthor.

2. *Cyprina Ligeriensis*, d'Orbigny. Tab. 275, fig. 1—4, pag. 103, III. — *Cyp. rostrata*, Geinitz, Kiesel. Tab. 2, fig. 12, 13, pag. 13.

Die Gestalt ist länglich rund, noch etwas breiter als lang, flach gewölbt, nach allen Richtungen gleichmäfsig abfallend. Die Buckel sind abgestutzt, stumpf. Hinter den Buckeln bildet sich, wie bei der vorstehenden Art, der Länge nach eine Kante, die aber nur höchst flach zu nennen ist im Vergleich zu der bei *Cyp. rost.* Von der Kante bis zum Rande fällt die Schale ganz sanft ab. Die Bedeckung zeigt concentrische Falten und Linien. Kommt vor im Grünsand bei Vaels.

Die wenigen in den Meeren noch lebenden Arten von *Cyprina* halten sich nur in der Nähe des Festlandes auf.

¹⁾ Ob die Species mit Brönn's *Cyprina angulata* identisch ist, haben wir nicht beurtheilen können, da uns das Jahrbuch 1827 nicht zu Gebote stand; sollte dies der Fall sein, so würde dieselbe die Priorität für sich haben und *C. rostrata* Synonym sein.



Seite 21.

Cardium gibbosum, Müller.

Wir müssen diese Species von *C. Becksii* trennen. Sie ist mit dieser verwandt, unterscheidet sich aber wesentlich von derselben dadurch, daß sie länglich und weit schmaler ist, hinter dem Buckel plötzlich der ganzen Länge nach einfällt und dadurch einen Längskiel bildet. Endlich dadurch, daß die Schalen an den Seiten bis zum Rande gerippt sind, während bei *C. Becksii* dort nur feine Längslinien sich zeigen.

Unser *Cardium Becksii*, so ähnlich es auch dem *C. Ottoi*, Geinitz Kiesel., Tab. 1, fig. 31 und 32, pag. 14 und Grundriß Tab. 19, fig. 6 und 7, pag. 424 ist, so können wir dasselbe doch nicht damit zusammen bringen, denn von den concentrischen Streifen und Linien, die Geinitz bei *C. Ottoi* beschreibt, finden wir keine Spur bei hunderten Exemplaren in bester Erhaltung. Auch sind bei *C. Becksii* die Rippen nicht rund, sondern vielmehr scharf. Wir glaubten uns zu dieser Bemerkung veranlaßt, weil wir bei Geinitz im Quadergebirge, pag. 154, *C. Ottoi*, von Aachen angeführt finden und eine Identifizierung mit unserer Species vermuthen. Das Citat daselbst *C. bimarginatum*, d'Orbigny, Tab. 250, fig. 4—8, pag. 39, III, veranlaßt uns noch mehr, *C. Ottoi* und *Becksii* für zwei verschiedene Species zu halten und wahrlich, es würde eine starke Phantasie dazu gehören, in unserem *C. Becksii* die sillons étroits, bordés de chaque côté des crénelures assez profondes, fig. 6, herauszufinden.

Zu Seite 22.

Cardium Næggerathi, Müller.

Dieses *Cardium* gehört zu den größten bekannten Kreidespecies. Es erreicht die Größe von *Cardium tubuliferum*, Goldfufs, mit dem es in der Form selbst große Aehnlichkeit hat. Zunächst unterscheidet es sich aber von demselben dadurch, daß es noch weit stärker gewölbt ist und nach allen Seiten vom Rücken aus sehr steil abfällt. Die Buckel sind stärker herübergebogen als bei *C. tubuliferum*, etwas seitwärts gedreht, gerundet und berühren sich nicht. Die Schalen sind mit sehr breiten, erhabenen Längslinien bedeckt, zwischen diesen laufen derselben Richtung nach sehr schmale, glatte Rinnen. Außerdem zeigen sich auf der Oberfläche in sehr verschiedenen Abständen noch starke Anwachsringe. Die Schale selbst ist sehr dick und besteht aus mehreren übereinander liegenden Schichten, die sich leicht ablösen. Der Rand ist von der Schale durch eine vertiefte, in der Mitte gezahnte Rinne gleichsam getrennt, sehr verdickt und stark gezahnt. Kommt vor bei dem Königsthor und im Grünsand bei Vaels. Als Steinkern nicht selten und sowohl an der Form als auch dadurch leicht zu erkennen, daß die Steinkerne fast glatt, mit schwachen Längsstreifen erscheinen, während bei *C. tubuliferum* nie alle *Tubuli* oder deren Spuren verwischt sind.

Seite 23 vor *Crassatella* :

Astarte F. Roemeri, Müller. Tab. VI, fig. 18.

Die Schale ist länglich rund, etwas fünfseitig, in der Quere breiter als vom Buckel bis zum unteren Rande. Hinter dem Buckel ist sie etwas eingedrückt. Die Schalen sind sehr schwach gewölbt, fast flach, sehr dick. Auf derselben zeigen sich sehr stark hervortretende, breite, kahle

Wulste, die sich nach dem Buckel hin allmähig verlieren. Zwischen den Wulsten liegen tiefe, breite, glatte Rinnen. Aus dem Sande des Aachener Waldes.

Seite 23 zu *Crassatella* :

2. *Crassatella rugosa*, Müller.

Wir haben lange Anstand genommen, diese Species von Roemer's *Crassatella arcacea* zu trennen, vollständig erhaltene Exemplare zeigen aber so große Verschiedenheiten, daß sie eine neue Art vollkommen begründen. Die Gestalt ist quer-oval dreiseitig, viel breiter als lang. Wir besitzen ein Exemplar von 3'' 3''' breit und 2'' 1''' lang, hinten stark gekantet und zusammengedrückt. Die Oberfläche ist bis zur Kante mit ganz unregelmäßigen, sehr dicken und breiten Falten und Furchen versehen, die von der Kante bis zum Rande verschwinden. (Bei *Crassatella arcacea* sind die Querrippen und Furchen ganz regelmäÙig.) Das Mündchen ist sehr vertieft und herzförmig; so weit dasselbe reicht ist die Schale etwas eingebogen, läuft dann aber sanft gerundet abwärts. Das Schildchen ist elliptisch, sehr lang, stark vertieft, fast kahl und mit höchst zarten Längsfalten versehen. Die Buckel sind stark gebogen, berühren sich aber nicht. Mit der Schale erhalten aus dem Muschelkonglomerate des Aachener Waldes, ohne Bedeckung nicht selten in der Wolfsgracht und bei Hoselt.

Seite 23 zu *Lucina*.

3. *Lucina tenuis*, Müller. Tab. II, fig. 5, a—b.

Die von uns Seite 25 der ersten Abtheilung beschriebene *Venus numismalis* hat sich bei später aufgefundenen Exemplaren als *Lucina* herausgestellt, da nun aber bereits eine *Lucina numismalis* aus der Kreide vorhanden ist, so legen wir ihr den Namen *tenuis* bei. Der früheren Beschreibung haben wir nichts zuzusetzen.

4. *L. Geinitzii*, Müller.

Erst in den jüngsten Zeiten ist es uns möglich geworden, die Gattung der sonst sehr häufig hier vorkommenden Steinkerne zu bestimmen. Die Species gehört zu den größten der Gattung, denn sie hat einen Durchmesser von fast 3 Zoll rhein. Sie ist oval, fast kreisrund, nur etwas breiter als lang, ganz flach gewölbt, die größte Dicke von etwa 6 Linien liegt in der oberen Hälfte, an den Rändern laufen die Schalen in eine förmliche Schärfe zusammen. Die ganze Oberfläche ist mit feinen concentrischen Linien bedeckt, die nach dem unteren Rande faltenartig werden. Die Schale ist dünn. Die Buckel sind spitz, liegen etwas seitlich und berühren sich nicht. Gar nicht selten vor dem Königsthor, am Lusberg, in dem Hohlweg bei Hoselt, doch meist als Steinkern, wobei die Buckel ganz gerundet erscheinen.

Seite 29 vor *Mya* :

***Mactra*, Linné.**

1. *M. angulata*, Sow. Bei Fitton Tab. 16, fig. 9, pag. 341. — Geinitz, Quaderg. Tab. 10, fig. 5 und 6, pag. 148.

Sowerby sagt, er habe das Schloß des Petrefactes nicht gesehen und stellt es daher mit einem Fragezeichen zu *Mactra*, Geinitz bildet ebenfalls das Schloß nicht ab, auch wir konnten bei unseren Exemplaren dasselbe nicht bloß legen. Unsere Exemplare sind mit den angeführten

Abbildungen völlig übereinstimmend, die Gattung bleibt aber zweifelhaft. *Maetra? angulata* bei Geinitz l. c. Tab. 10, fig. 13, scheint uns eine neue Species zu sein.

Das Petrefact ist dreiseitig, anscheinend fast glatt, zeigt aber bei näherer Betrachtung feine concentrische Linien und nach dem unteren Rande hin einige stärkere Anwachsstreifen. Die Seite hinter den Buckeln hat eine deutliche Kante. Die Schalen sind wenig gewölbt, die Buckel spitz. Kommt selten vor am Königsthor und im Grünsand bei Vaels.

Seite 33 zu *Pecten* bei der Abtheilung *C. Radiati*, Reufs :

Pecten cretosus, DeFrance. Brongn. env. de Paris, Tab. 3, fig. 7. — Bei d'Orbigny Tab. 440, fig. 1—7, pag. 617, III.

Pecten nitidus, Mantell, bei Reufs pag. 28, II. — D'Orbigny zählt mit Unrecht auch *Pecten curvatus*, Geinitz Kiesl. Tab. 3, fig. 13, pag. 16, hierher, uns scheint diese Species, die auch hier im Grünsand nicht selten ist, mit *Pecten arcuatus*, Sow. vereinbar zu sein.

Die Form von *P. cretosus* ist länglich oval, viel länger als breit, sehr schwach gewölbt, mit sehr zahlreichen, schwachen Längsrippen versehen, welche hin und wieder mit concentrischen Anwachslineien durchkreuzt werden. Die Ohren sind ungleich. In der ganzen Gestalt kommt es von den lebenden Arten dem *Pecten varians*, Lam. noch am nächsten. Bis jetzt nur selten im Mergel bei Vaels.

Seite 34 hinter *Lima sulcata* :

3. *L. Sowerbyi*, Geinitz.

L. Hoperi, Geinitz, Grundrifs Tab. 20, fig. 14, pag. 473.

L. Hoperi, Bronn, Leth. Tab. 32, fig. 8.

Die Schale ist fast halb kreisförmig, etwas schief, die kürzere Seite völlig gerundet, die längere mehr gerade, etwas abgeschnitten. Auf der Oberfläche laufen ganz zarte, nach dem unteren Rande wenig divergirende Längslineien, welche von concentrischen Linien durchschnitten werden. Diese letzteren treten gegen den unteren Rand als starke Anwachsringe sehr hervor und bilden förmliche Absätze. Die Ohren sind im Verhältniß zum Ganzen klein, mit höchst feinen Längslineien versehen. Selten im Mergel bei Vaels. Die Abbildungen bei Geinitz und Bronn geben kein vollständiges Bild des Petrefactes.

4. *L. rectangularis*, d'Archiac. Tab. 15, fig. 7, pag. 308.

Die Gestalt ist schief-eirund, wenig gewölbt, vor den Buckeln fast geradlinig abgeschnitten, hinter denselben mit dem unteren Rande bogig, fast einen Halbkreis bildend. Die Ohren sind klein. Die Oberfläche ist mit zarten concentrischen, unregelmäßigen Linien und Anwachsstreifen versehen, welche gegen die Buckel hin zahlreicher und deutlicher sind und dort von einigen zarten Längslineien durchkreuzt werden. Wir fanden bis jetzt nur zwei Exemplare bei Vetschau.

5. *L. pseudocardium*, Reufs. Tab. 38, fig. 2, 3, pag. 33, II. — Geinitz, Grundrifs Tab. 19, fig. 5, pag. 424.

Wir hatten dies Petrefact als neue Species bei Seite gelegt, Herr Geinitz, dem wir dasselbe zeigten, erklärte dasselbe für *pseudocardium* und in der That können wir keine andere Species daraus machen. Bis jetzt nur im Mergel bei Vaels.



6. *L. inflata*, Müller.

Die Gestalt dieser Species ist etwas schief-eirund, sie ist von den uns bekannten Arten die am meisten gewölbte. Die Buckel sind spitz. Die Oberfläche der Schalen sind mit 30—32 stark hervortretenden Rippen versehen, die von dem Buckel aus gleichmäÙig nach allen Seiten breiter werden und stark divergiren. Die breiten Furchen zwischen den Rippen erscheinen kahl, unter der Loupe laufen über das Ganze höchst feine concentrische Linien. Kommt vor im Mergel bei Vaels.

7. *L. dentata*, Müller.

Die Form ist mehr gerundet als bei der vorstehenden Art. Die Rippen, ungefähr gleich an Zahl, sind aber viel feiner, weniger stark hervortretend. Sie vereinigen sich ebenfalls in die Buckelspitze und divergiren nach den Rändern. Diese Rippen sind durch Anwachsstreifen durchkreuzt und bilden diese letztere in den sonst kahlen Zwischenfurchen einen dreieckigen Zahn. Die Ohren und die Spitze des Buckels waren abgebrochen. Vielleicht weiset sich das Petrefact in besser erhaltenen Exemplaren als ein *Cardium* aus. Im Mergel bei Vaels.

Seite 34 hinter *Spondylus lineatus* :

3. *Spondylus undulatus*, Reufs. Tab. 40, fig. 6, pag. 37, II.

Die Gestalt dieses *Spondylus* ist breit-eiförmig. Die obere Schale mäÙig stark gewölbt. Die Oberfläche ist mit sehr zahlreichen feinen, schwach gekörnten, wellenförmig gebogenen, erhabenen Linien bedeckt, welche durch sehr zahlreiche Anwachsringe unterbrochen werden. Wir konnten nur die obere Schale beschreiben, mit der ganzen unteren Seite sitzt das Petrefact auf einer *Ostrea vesicularis* und muß daher, wie Reufs richtig bemerkt, flach sein, er nennt sie flach-convex oder auch selbst etwas vertieft. Dies Petrefact fanden wir bis jetzt nur einmal im Mergel bei Vaels.

Seite 35, Zeile 4 :

2. *Mytilus gryphoides*, Müller. Tab. I, fig. 11, a—b.

Da von Klipstein in seiner mehr erwähnten Schrift pag. 257, Tab. XVII, fig. 14, a—b, bereits den Namen *Mytilus scalaris* gebraucht, so haben wir die von uns beschriebene Species *Mytilus gryphoides* genannt. Vgl. die Verhandlungen des naturhist. Vereins der preussischen Rheinlande, 1848, pag. 154—155.

Seite 36 bei *Mytilus* zur Abtheilung *B. Modiola* :

8. *Mytilus reversus* (*Modiola reversa*), Sow. bei Fitton Tab. 17, fig. 13, pag. 342. — Bei d'Orbigny Tab. 337, fig. 1—2, pag. 264, III. — Geinitz Kiesl. Tab. 3, fig. 11, pag. 15 und Tab. V, fig. 8, sind fast unkenntlich. — Reufs Tab. 33, fig. 9, pag. 15.

Wir besitzen ein vollständig erhaltenes Exemplar von fast 2 Zoll rhein. Länge, doppelschalig. Die Gestalt der Muschel ist länglich oval, sehr kurz gewölbt, bauchig. Das vordere Ende ist kurz, abgerundet, das hintere ist verschmälert, ebenfalls stumpf gerundet. Von der Spitze der Buckel läuft der ganzen Länge nach eine gerundete Kante schräge herab, so daß die Schale dadurch gleichsam in zwei gleiche Hälften getheilt ist. Ueber das Ganze laufen rückwärts gebogene concentrische Linien und Streifen, die nach den Buckeln hin feiner und regelmäÙig stehen, nach den Rändern hin in starke Falten mit breiten, kahlen Zwischenräumen übergehen.



Die feinen, radialen Linien, deren *Reufs* und *d'Orbigny* erwähnt, haben wir nicht bemerken können. Kommt vor im Hornstein des Aachener Waldes.

9. *Mytilus? oviformis*, Müller. Tab. VI, fig. 19.

Wir sind nicht völlig überzeugt, ob wir diese Species mit Recht zu *Mytilus* gestellt haben, konnten es aber eben so wenig mit Sicherheit zu *Lima* stellen. Die Gestalt desselben ist länglich-eiförmig, sie hat Aehnlichkeit mit *Lima decussata*, v. Münster. Das Petrefact ist sehr stark gewölbt, auf der ganzen Oberfläche mit scharfen Längsrippchen versehen, von denen die vier in der Mitte sich durch grössere Dicke von den übrigen auszeichnen. Der Quere nach laufen über dasselbe zahlreiche feine Linien und viele Anwachsringe, welche schwache Vertiefungen bilden. Die Zeichnung hat uns nicht befriedigt. Kommt vor am Königsthor.

Seite 36 bei *Lithodomus* :

Das l. c. von uns als *Lithodomus discrepans* beschriebene Petrefact erkannten wir, durch Herrn *Bosquet* aufmerksam gemacht, als weder dahin, noch zu *Mytilus* oder *Modiola* gehörig und stellten daher schon während der Naturforscher-Versammlung in Aachen (1847) daraus eine neue Gattung auf. Besonders sind es die Muskular-Eindrücke, welche die Gattung wesentlich von ihren Formverwandten unterscheiden. Wir nennen die Gattung *Modiolina* und geben davon diese Diagnose :

Modiolina.

Testa longitudinalis, siliquiformis, aequivalvis. Nates rotundatae, terminales, parum hiantes.

Cardo edentulus; impressiones musculares quatuor, ocales, profundae, quarum duae superiores sublaterales, minores, inferiores, majores.

Die Schale ist länglich, schotenförmig, gleichschalig. Die Buckel sind gerundet, die Spitze bildend, etwas klaffend. Das Schloß ist zahnlos. Vier länglich-runde, vertiefte Muskular-Eindrücke, von welchen die beiden oberen kleiner, die beiden unteren, welche diesen ganz nahe liegen, grösser sind.

Wir fanden bis jetzt nur die eine Species, welche wir nunmehr

1. *Modiolina Bosqueti* nennen. Tab. II, fig. 15, a, b, c.

Der l. c. gegebenen Beschreibung der Species haben wir nichts zuzufügen. Die Figuren genügen, um die Diagnose deutlich zu machen.

Seite 39 zu *Ostrea armata*, Goldfufs :

Wir theilten nach unseren wohl erhaltenen Exemplaren von dieser Species neue Abbildungen mit in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereines für Rheinland und Westphalen, Jahrgang 1848, Tab. I, fig. 2 und 3, pag. 14. Irrig vermuthet *Geinitz* im Quadergebirge, pag. 198, daß diese Species mit *Ostrea semiplana*, Sow. und *Ostrea flabelliformis*, Nilsson zu verbinden sei.

6. *Ostrea Bronni*, Müller. Tab. 6, fig. 20.

Wir hätten es nicht gewagt, eine neue Species in diesem Petrefact aufzustellen, wenn die Form in vier von uns aufgefundenen Exemplaren nicht so constant wäre, denn wir kennen die

Schwierigkeiten ganz und gar, die sich durch die unglaublich manchfache Gestaltung einer und derselben Austerart bei dem Bestimmen einer neuen Art darbieten. Das Charakteristische dieser Species ist die runde, sehr vertiefte Rinne, welche der Länge nach über die ganze Schale läuft, dann die Ausweitung nach der einen Seite hin, die bald etwas breiter, bald etwas schmaler ist; allein bei allen Exemplaren sich constant findet. Wollten wir die Mittelrinne uns als eine Dachrinne denken, so bildet der Auswuchs gleichsam die Abgufsrinne. Die Mittelrinne ist kahl und offenbar war die Auster damit an länglich-runde Körper angeheftet. Diese Eigenthümlichkeit, sich nur an derartige Körper anzulegen, macht die Species auffallend. Im Ganzen ist die Schale schmal, oben spitz zulaufend, nach beiden Seiten ziemlich steil abfallend. Von den Rändern der Rinne bis zu den unteren Rändern bilden sich starke Falten, welche durch zartere, wellenförmige, dicht stehende Längsfalten bedeckt werden. Im Innern ist die Spitze etwas eingefallen, unter derselben zeigen sich an beiden Seiten zahnähnliche Rippchen. Der Muskular-Eindruck ist länglich-eiförmig und liegt seitlich etwas über dem Auswuchs. Die Schale, welche wir für die Oberschale halten, ist in der Mitte eben so hoch aufgetrieben, wie die entsprechende untere Schale vertieft ist. Der erhabene Rücken ist dann mit sehr runzeligen Falten der Quere nach bedeckt. Am meisten Aehnlichkeit hat diese Species mit *Ostrea sulcata*, Blumenbach bei Goldfuss Tab. 176, fig. 2, a, b, pag. 13, II, die bei Geinitz auf *Ostrea semiplana* zurückgeführt wird. Quadergebirge pag. 198. Kommt vor am Lusberg und vor dem Königsthor.

Zur Seite 39 bei der Abtheilung *b. Læves* :

7. *Ostrea Nilssoni*, von Hagenow, Leonh. Jahrbuch 1842, pag. 546—547.

Wir äufserten in der ersten Abtheilung unserer Monographie, pag. 40, Bedenken, ob *Ostrea Nilssoni*, von Hagenow und *Ostrea hippopodium*, Nilsson zu trennen seien; durch die Güte des Herrn von Hagenow haben wir in der Zwischenzeit Exemplare beider Species aus Rügen erhalten und uns nun augenscheinlich von dem Unterschiede überzeugen können. *Ostrea Nilssoni* findet sich nicht selten auf Belemniten im Mergel bei Vaels. Der ausführlichen Nebeneinanderstellung beider Arten l. c. bei von Hagenow ist nichts zuzusetzen.

Seite 42 hinter *Exogyra* :

7. *Exogyra Münsteri*, von Hagenow, Jahrbuch 1842, pag. 549.

Auch bei dieser Art haben wir uns durch vorliegenden Exemplaren von Rügen von dem Vorkommen derselben bei Vaels überzeugt. Nicht selten auf Belemniten. Nach von Hagenow ist *Exogyra auricularis* bei Roemer, pag. 38, hieher zu ziehen.

Hinter *Exogyra*, Seite 42, einzuschalten :

Orbicula, Cuvier ¹⁾,

1. *Orbicula ciliata*, Müller.

Wir besitzen davon nur zwei Exemplare der unteren Schale. Dieselbe ist kreisrund, ganz flach, dünner als Papier. Das Innere läßt die äußere Zeichnung durchscheinen und ist demnach

¹⁾ Nicht Lamarck, Conf. Hermannsen Index Malacoz. Tom. II, pag. 55, seq.

die Oberfläche mit concentrischen Linien bedeckt, welche durch äußerst feine, ausstrahlende Linien durchkreuzt sind. Der ganze Rand des Kreises ist fein gekerbt oder vielmehr gewimpert. Nahe am oberen Rande liegen mehrere Muskular-Eindrücke und über dem Rande eine senkrechte, längliche, schmale Falte. Diese Falte erregt bei uns den Gedanken, ob wir nicht eine *Anomia* vor uns haben sollten und ob diese Falte nicht das Ligament bilden könnte. Bis jetzt haben wir von den aus der Kreide beschriebenen Species *Anomia* nur obere Schalen kennen gelernt, so bei *d'Orbigny*, *Reufs*, *Roemer*, *Geinitz* und *Sowerby* bei *Fitton*, wir werden daher Sorge tragen, eine genaue Zeichnung unseres Petrefactes zu geben, was uns um so leichter werden wird, als das eine Exemplar auf einem Scaphiten aus dem Vaelser Mergel nichts zu wünschen übrig läßt; das weniger gut erhaltene Exemplar ist im Hornstein des Aachener Waldes.

Seite 43 zu *Crania* :

4. *Crania Ignabergensis*, *Retzius*.

C. striata, *Defrance* bei *Goldfufs* Tab. 162, fig. 10, pag. 294, II. — Die bessere Abbildung bei *d'Orbigny* Tab. 525, fig. 1—6, pag. 141—142, IV.

Die Schale ist rundlich, niedergedrückt, der Scheitel derselben etwas erhaben, excentrisch, stark nach dem oberen Rande liegend. Das Ganze ist mit erhabenen, ausstrahlenden Linien versehen, welche den Rand etwas überragen. Diese Linien sind, wie *d'Orbigny* schon richtig bemerkt, nicht dichotom, sondern zwischen den ausstrahlenden Linien befinden sich einzelne selbständige Linien, welche vom Rande nur bis zur Mitte der Schale hinaufragen. Kommt wohl erhalten im Hornstein des Aachener Waldes vor.

Thecidea, *Defrance*.

Sowohl bei Vetschau als in dem Gerölle ¹⁾ über der obersten Mergelschichte auf dem Lusberg finden sich die drei nahstehenden Species nicht selten, doch nie in so großer Menge, wie an einzelnen uns bekannten Lokalitäten bei Falkenberg (Fauquemont), wo sie zu Hunderten zusammen liegen.

1. *Thecidea papillata*, *Bronn*, Leth. geogn. Tab. 30, fig. 3, pag. 663.

Thecidea radiata, *Goldfufs*. Tab. 161, fig. 2, pag. 289, II. — Bei *d'Orbigny* Tab. 523, fig. 1—8, pag. 154, IV.

Einzelne Exemplare fanden wir auch im Mergel bei Vaels.

2. *Thecidea digitata*, *Sow.* — Bei *Bronn*, Leth. geogn. Tab. 30, fig. 3, pag. 664. — Bei *Goldfufs* Tab. 161, fig. 6, a, b, c, d, pag. 290, II.

3. *Thecidea hieroglyphica*, *Defrance*. — Bei *Goldfufs* Tab. 161, fig. 5, a, b, c.

Ganz irrthümlich verbindet *Bronn* diese Species, pag. 664, mit *Thecidea digitata*, womit sie nur sehr geringe Aehnlichkeit hat, wozu aber die Zeichnung bei *Goldfufs* leicht verleiten konnte, die kaum ein Bild von dem Petrefact gewährt, und doch scheint uns die Beschreibung von *Goldfufs* auf *Thecidea hieroglyphica* bezogen werden zu müssen. Diese Species hat an

¹⁾ Ueber dies Gerölle verweisen wir auf pag. 6 der zweiten Abtheilung bei *Dentalium Mosæ*.



jeder Seite sechs Armfurchen, *Thecidea digitata* nur vier. Bei *Thecidea hieroglyphica* berühren fünf dieser Armfurchen die pyramidalische Scheidewand, die unterste sechste berührt den unteren Rand, außerdem läuft noch am Seitenrand eine siebente Armfurcher, worin die übrigen gleichsam münden. Die Ränder der Armfurchen sind gekörnt, die zwischen den Armfurchen etwas vertieft liegenden feinen Blättchen sind mehr fein gestachelt als gekörnt. Bei *Thecidea digitata* liegen die vier Armfurchen in der unteren Hälfte von der Scheidewand abgewendet nach dem Rande hin. Bei nur mittelmäßig gut erhaltenen Exemplaren ist eine Verwechslung der beiden Species unmöglich. *Thecidea hieroglyphica* ist übrigens seltener als die vorhergehenden Species.

Wir haben es für zweckmäßig erachtet, am Schlusse der Zusätze zur ersten Abtheilung ein Bild des hiesigen Vorkommens der dort aufgeführten Petrefacten in Zahlen aufzustellen, wie dies bei der zweiten Abtheilung geschehen ist, und haben uns dabei nach *Geinitz* Quadergebirge gerichtet ohne alle Abänderung der dort angegebenen Zahlen.

Tabellarische Uebersicht

der Gattungen der Conchiferen, Brachiopoden, Radiaten und Serpuliten der deutschen Kreideformation und der numerischen Verhältnisse der Arten.

Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
I. Conchiferen.				
1. Clavagella, Lamarck	1	—	—	
2. Gaströchæna, Spengler	4	2	1	
3. Pholas, Linné	2	—	—	
4. Solen, Linné	2	2	—	
5. Leguminaria, Schumacher	1	—	—	
6. Panopæa, Ménard	7	2	—	Unter <i>Panopæa</i> ist die Gattung <i>Mya</i> mit begriffen.
7. Pholadomya, Sowerby	7	1	—	Ad 7. Unter <i>Pholadomya</i> ist die Gattung <i>Lysianassa</i> mit ein- begriffen.
Zu übertragen	24	7	1	

Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
Uebertrag.....	24	7	1	
8. Mactra, Linné.....	2	1	—	
9. Annatina, Lamarck.....	2	—	—	
10. Lyonsia, Turton.....	3	—	—	
11. Thracia, Leach.....	2	—	—	
12. Tellina, Lamarck.....	9	4	—	
13. Donax, Linné.....	2	—	—	
14. Corbulla, Lamarck.....	6	3	2	
15. Venus, Linné.....	19	4	1	
16. Thetis, Sowerby.....	2	—	—	
17. Protocardia, Beyrich.....	1	—	—	
18. Cardium, Linné.....	10	9	7	
19. Isocardia, Lamarck.....	5	2	—	
20. Opis, Defrance.....	2	—	—	
21. Astarte, Sowerby.....	5	2	2	
22. Crassatella, Lamarck.....	4	2	1	
23. Cardita, Linné.....	5	1	—	
24. Cyprina, Lamarck.....	6	2	—	
25. Lucina, Bruguière.....	3	3	1	
26. Trigonina, Bruguière.....	5	2	—	
27. Nucula, Lamarck.....	12	4	2	
28. Pectunculus, Lamarck.....	11	2	1	
29. Arca, Linné	29	5	—	Ad 29 & 33. Obgleich wir in der Abhandlung selbst die Gattung getrennt haben, füh- ren wir sie hier vereint auf, ohne dadurch diese Vereini- gung zu billigen.
30. Cucullæa, Lamarck				
Zu übertragen.....	169	55	18	

Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten	Anmerkungen.
Uebertrag.....	169	55	18	
31. Pinna, Linné.....	6	1	—	
32. Myoconcha, Sowerby.....	2	—	—	
33. Modiolina, Müller.....	1	1	1	
34. Mytilus, Linné	15	9	5	
35. Modiolina, Lamarck				
36. Lithodomus, Cuvier.....	3	—	—	
37. Avicula, Lamarck.....	16	3	1	
38. Gervillia, Defrance.....	1	1	—	
39. Perna, Lamarck.....	3	—	—	
40. Inoceramus, Sowerby.....	15	5	—	
41. Pecten, Bruguière.....	52	12	—	
42. Lima, Dehayes.....	38	7	2	
43. Spondylus, Linné.....	14	3	—	
44. Plicatula, Lamarck.....	3	—	—	
45. Ostrea, Lamarck	34	15	1	
46. Exogyra, Sowerby				
47. Anomia, Lamarck.....	7	—	—	Ad 45 & 46. Auch hier haben die in der Abhandlung getrennten Gattungen verbunden.
48. Chama, Linné.....	4	—	—	
	383	110	28	
II. Brachiopoden.				
1. Terebratula, Lwyd.....	39	13	2	
2. Thecidea, Defrance.....	2	3	—	
Zu übertragen.....	31	16	2	



Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
Uebertrag.....	31	16	2	
3. Crania, Retzius.....	9	4	—	
4. Hippurites, d'Hombres Firmas.....	7	—	—	
5. Caprina, d'Orbigny.....	1	—	—	
6. Orbicula, Cuvier.....	1	1	1	
	59	21	3	
III. Radiaten.				
<i>A. Seeigel.</i>				
1. Cidarites, Lamarck.....	16	2	—	
2. Echinus, Linné.....	8	1	—	
3. Galerites, Lamarck.....	10	3	—	
4. Clypeaster, Lamarck.....	2	—	—	
5. Nucleolites, Goldfufs.....	7	3	1	
6. Spatangus, Lamarck.....	20	10	1	
7. Ananchytes, Lamarck.....	6	2	—	
<i>B. Seeterne.</i>				
8. Asterias, Lamarck.....	4	3	—	
9. Ophiura, Lamarck.....	5	1	1	
<i>C. Haarsterne.</i>				
10. Pentacrinus, Miller.....	8	—	—	
11. Burgetocrinus, d'Orbigny.....	1	1	—	
12. Glenotremites, Goldfufs.....	1	—	—	
Zu übertragen.....	68	26	3	



Namen der Gattungen.	Anzahl der bis jetzt in Deutschland bekannten Arten.	Anzahl der bei Aachen vorkommenden Arten.	Davon halten wir für neue Arten.	Anmerkungen.
Uebertrag.....	68	26	3	
13. Alecto, Leach.....	2	—	—	
14. Eugeniocrinus, Miller.....	2	—	—	
15. Marsupites, Mantell.....	1	—	—	
	93	26	3	
IV. Würmer.				
Serpula, Linné.....	42	15	—	

Zur zweiten Abtheilung.

Seite 5 :

Herr Baron *de Ryckholt* schreibt uns über unser *Dentalium alternans*, jedoch ohne nähere Angabe, wo er dasselbe beschrieben hat : „Votre *Dentalium alternans* a été décrit sous le même nom par moi en 1847.“

Seite 6 :

Derselbe bemerkt bei unserem *Dentalium rugosum* : „*Dentalium rugosum*, Müller non *De-france* est bien positivement le *Dentalium medium* de *James Sowerby* et non de *J. C. Sowerby* etc. Les deux espèces accompagnent partout le *Pectunculus sublævis*, c'est-à-dire se trouvent partout dans la craie chloritée moyenne.“

Seite 8 :

Aus einem Schreiben des Herrn *Bosquet* ersehen wir, daß das Beiwort *costata*, welches wir einer *Rissoa* beileigten, bereits 1832 von *Michaud* einer noch lebenden Species aus dem Mittelmeere gegeben worden ist. Außerdem entnehmen wir aus *Bronn's* Enum. palaeontologicus, pag. 398 und 399, daß dasselbe Beiwort auch noch zwei anderen Species aus dem Tertiären von *Adams* und *Demarest* beigelegt worden ist; wir ziehen daher den Namen *costata* zurück und nennen die Species

Rissoa incrassata. Tab. III, fig. 5.



Zu den beiden von uns beschriebenen Species haben wir noch eine dritte hinzuzusetzen und zwar zu der dritten Abtheilung

3. Cerithiformes, d'Orbigny.

3. *Rissoa Sandbergeri*, Müller. Tab. 6, fig. 22.

Wir stellen dies Petrefact zu *Rissoa*, obgleich der untere Theil desselben, wie die Abbildung zeigt, abgebrochen war. Das Gehäuse besteht aus fünf Windungen, von welchen die unterste wohl doppelt so lang ist, als das übrige Gewinde. Die vier oberen Windungen sind convex, ziemlich stark gerundet und stehen ziemlich steil übereinander gethürmt. Die unterste Windung ist bauchig und bildet eine starke, gekörnte Kante auf dem oberen Theile derselben. Von dieser Kante bis zur Naht erhebt sich die Windung etwas und bildet eine geneigte Ebene. Ueber das ganze Gehäuse, dessen Schale dünn ist, bildet sich ein höchst regelmässiges Gitterwerk, welches durch körnige Längsrippen gebildet wird, die der Quere nach schwach verbunden erscheinen. Zwischen je vier und vier Körnchen ist eine Vertiefung. Der Mundsäum besteht aus einem stark gekörnten Wulst, hinter diesem folgen zwei der schon bezeichneten körnigen Längsrippen und dann abermals ein Wulst, wie der Mundsäum. Kommt vor am Lusberg und im Grünsand bei Vaels.

Seite 9 zu *Chemnitzia* :

Da bereits von *Philippi*, wie wir gesehen haben, aus dem Tertiären eine *Chemnitzia Kochi* beschrieben worden ist, so sind wir genöthigt, den Namen zu ändern und nennen dieselbe wegen ihrer Aehnlichkeit mit *Turritella* nunmehr

1. *Chemnitzia turritelliformis*. Tab. 4, fig. 7, a—b.

Zugleich fügen wir noch eine neue Species hinzu :

2. *Chemnitzia bulimoides*, Müller.

Die Gestalt dieser Species ist länglich-eiförmig. Das Gehäuse ist etwa 4 Linien lang, besteht aus 4 Windungen, von welchen die untere mehr als doppelt so lang ist als das übrige Gewinde. Beim ersten Anblick erscheint das Petrefact fast glatt, bei näherer Betrachtung zeigen sich aber auf dem untersten Umgange deutliche, etwas rückwärts gebogene Längsfalten, die nach dem Mundsäume hin gedrängter stehen. Auf dem übrigen Gewinde fehlen diese Falten, dagegen zeigen sich dort zarte Querlinien. Die Mundöffnung ist länglich-oval, der Mundsäum scharf, die ganze Schale sehr dünn. Kommt vor im Grünsand bei Vaels und am Lusberg.

Die geringe Anzahl der Windungen dieser Species widerlegt die Angabe *d'Orbigny's*, pag. 68—69, wo er von der Gattung bemerkt : „Coquille composé d'un grand nombre de tours.“ Bei seiner *Chemnitzia inflata*, Tab. 156, fig. 2, pag. 71—72, II, die auch nur eine geringe Anzahl Windungen hat, fühlte er selbst, dafs die Behauptung von einer grossen Anzahl Windungen nicht stichhaltig sei und möchte deshalb ein neues Genus aufstellen. Die Anzahl der Windungen möchte aber ein schlechtes Gattungsmerkmal werden. Wie gross ist die Verschiedenheit in der Anzahl der Windungen bei den Arten von *Turritella*, *Cerithium* und anderen Gattungen?



Seite 13 :

Zu *Natica canaliculata* bemerkt uns Herr von Buch wohl mit Recht : „Diese Species, denke ich, wird zu sehr zerschnitten.“ Herr von Ryckholt glaubt, die bei Aachen und Tournai vorkommende Art unterscheide sich durch den Mund und Nabel von der wirklichen *Natica canaliculata*, die dem Gault nur angehörte. Wir werden erst ein bestimmtes Urtheil fällen können, wenn wir uns ein Exemplar aus dem Gault verschafft haben werden und durch Autopsie einen Vergleich anstellen können.

Seite 17 :

Unser dort als *Strombus fenestratus* beschriebenes Petrefact stellen wir nach näherer Betrachtung zu *Pyrula*, Seite 39, bei der Abtheilung *Melongena* und zwar mit dem Namen *Melongena rigida*. Tab. III, fig. 22.

Seite 22 :

Unsere *Rostellaria arachnoides* scheint uns mit *Strombus arachnoides* bei Geinitz, Quadergeb. Tab. 9; fig. 5, nicht identisch zu sein. Die von uns gegebene Abbildung ist genau.

Seite 26 bis 34 :

Bei den dort beschriebenen Turritellen ist ein grober Irrthum eingeschlichen, indem statt Tab. 4 überall Tab. 3 angegeben ist.

Zu der Abtheilung *Turritæ*, Seite 31, setzen wir hinzu :

24. *Turritella tenuilineata*, Müller. Tab. 6, fig. 21, a, b.

Diese Species hätten wir gern der *Sexlineata*, Roemer beigezählt, allein sie unterscheidet sich davon doch zu auffallend. Die einzelnen Umgänge sind wenig gewölbt, fast vierseitig, jeder derselben trägt sechs scharfe Ringe, die aber weit schmaler sind, als bei *Sexlineata*, zwischen je zwei dieser Ringe liegen dann sechs gleich starke, sehr zarte, feine Linien. Die Windungen schliessen sich mit engen Nähten aneinander. Kommt am Königsthore vor.

Seite 38 zu den zahlreichen *Fusus* haben wir noch hinzuzusetzen :

14. *F. nanus*, Müller.

Derselbe hat am meisten Aehnlichkeit mit dem von A. Roemer im Oolithengebirge, Tab. 11, fig. 42, beschriebenen *Fusus minutus*. Unsere Species ist winzig klein, sie beträgt constant nur höchstens zwei Linien. Sie hat nur vier gewölbte Windungen, von denen die unterste verhältnißmäÙig sehr starke Längsrippen mit kahlen Zwischenräumen hat, die übrigen erscheinen glatt. Der Kanal ist sehr lang, ganz spitz zulaufend. Kommt vor am Lusberg und bei Vaels im Grünsand.

Seite 38 hinter *Fusus* einzuschalten :

Buccinum, Lamarck.

1. *B. Steiningeri*, Müller.

Diese kleine Species, von etwa 1½ Linie lang, ist spindelförmig, schlank; sie besteht aus fünf schwach convexen Windungen, von welchen die unterste etwas mehr aufgetrieben ist. Alle Windungen tragen zarte, dicht gereifte, etwas gebogene Längsrippchen, die auf den Steinker-



nen völlig verwischt sind. Die Mundöffnung ist oval, der Rand glatt. Kommt am Lusberg und im Grünsand bei Vaels vor, doch wegen der Kleinheit selten wohl erhalten.

Seite 41 :

Auch bei *Voluta cingulata* sind wir genöthigt den Speciesnamen zu ändern, da derselbe für eine *Voluta* aus dem Tertiären schon angewendet worden ist und nennen wir nunmehr unsere Species

Voluta cincta.

Seite 42 vor *Conus* einzuschalten :

Ancillaria, Lamarck.

Dem glücklichen Funde des Herrn Dr. *Debey* verdanken wir in der Kreide auch einen Repräsentanten dieser Gattung, welche bis jetzt nur in dem Tertiären in sehr zahlreichen Species vertreten war. Herr Dr. *Debey* fand zwar nur einen gut erhaltenen Hohlabdruck in dem eigenthümlichen Feuerstein, welchen er als die Begränzung der oberen und unteren Kreideschichte der hiesigen Gegend bezeichnet, allein ein genomener Abgufs in Thon läßt nicht den mindesten Zweifel über die Gattung aufkommen. Nach dem Abgufs ist die Zeichnung angefertigt. Wir nennen die Species

1. *Ancillaria cretacea*, Müller. Tab. 6, fig. 23.

Das längliche, cylindrische Gehäuse ist glatt, ohne sichtbare Nähte. Unten auf der Kolumelle zeigen sich zwei Falten, über denselben sind auf dem Gehäuse zwei bis drei schwache Linien bemerkbar und noch eine solche oben, wo die Spira anfängt.

Beim Rückblick auf die von uns beschriebenen und selbst auf sämtliche bis jetzt aus der Kreide bekannten Gasteropoden ist es auffallend, wie klein und winzig die meisten derselben sind im Vergleich zu der Gröfse der Gasteropoden, welche die Jetztmeere hegen. Dasselbe läßt sich fast ebenso von den älteren Formationen sagen, denn auch in diesen gibt es keine so grofse Gebilde, wie die *Cassis*, *Strombus*, *Turbo*, *Triton*, *Murex* u. s. w. der Jetztwelt. Daraus folgt, dafs ihre Entwicklung eine fortschreitende gewesen ist, die ihren Kulminationspunkt erst jetzt erreicht hat.

In Bezug auf die Art des Versteinerns in hiesiger Gegend müssen wir zu dem, was wir bereits in der Einleitung zu den Gasteropoden, pag. 2, bemerkt haben, noch hinzufügen, dafs auffallender Weise grade in den Schichten, wo wir alle Petrefacten vollständig verkieselt fanden, die Austern und Exogyren nicht verkieselt waren, sondern verkalkt und zwar in so lockerer Masse, dafs wir die Schale nie erhalten konnten, während dieselben im Grünsand am Lusberg und vor dem Königsthor mit allen übrigen Petrefacten meist in feste Kalkmasse übergegangen sind.

Nach den aufgestellten Uebersichten enthält die Gegend um Aachen einen aufserordentlichen Reichthum an Thieren der Kreidemeere und zwar : Conchiferen 110, Gasteropoden 136, Brachiopoden 21, Radiaten 26, Serpuliten 15, zusammen 308 Species.



Wenn wir nun für die noch nicht beschriebenen Cephalopoden und die übrigen Thierklassen, Reptilien, Fische, Krebse und Korallen, die gewifs eher zu gering als zu hoch gegriffene Zahl 150 Species hinzufügen, so würde sich die Summe der hiesigen Petrefacten des Thierreiches über 450 Species herausstellen, ein Reichthum, den bis jetzt noch kein Gebiet von so geringem Umfange nachgewiesen hat.

Die Bilder, zu den in den Zusätzen ohne Abbildungen beschriebenen Petrefacten, werden in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westphalen nachgeliefert werden.

Aachen, im Oktober 1850.



Erklärung der Tafeln.

Tabula III.

- Figura 1. *Dentalium alternans*. a. In natürlicher Gröfse, b. ein Stück der Schale vergrößert.
" 2. *Dentalium rugosum*. In natürlicher Gröfse.
" 3. *Vermetus cochleiformis*. Vergrößert.
" 4. *Bulla cretacea*. a. Mundseite, b. Rückenseite, beide vergrößert, c. natürliche Gröfse.
" 5. *Rissoa incrassata (costata)*. In natürlicher Gröfse.
" 6. *Rissoa Winkleri*. a. Vordere, b. hintere Seite in natürlicher Gröfse.
" 7. *Scalaria macrostoma*. a. In natürlicher Gröfse.
" 8. *Eulima acuminata*. a. Hintere, b. vordere Seite vergrößert, c. Maßstab der natürlichen Gröfse.
" 9. *Eulima lagenalis*. Vergrößert.
" 10. *Pyramidella involuta*. In natürlicher Gröfse.
" 11. *Actæon doliolum*. In natürlicher Gröfse.
" 12. *Actæon cylindraceus*. In natürlicher Gröfse.
" 13. *Actæon acutissimus*. In natürlicher Gröfse.
" 14. *Actæon coniformis*. In natürlicher Gröfse.
" 15. *Avellana Humboldti*. a. Hintere, b. vordere Seite vergrößert, c. Maßstab.
" 16. *Avellana Hagenowi*. a. Stark vergrößert.
" 17. *Avellana paradoxa*. Vergrößert.
" 18. *Globiconcha nana*. Vergrößert.
" 19. *Natica Geinitzii*. In natürlicher Gröfse.
" 20. *Naticella Strombecki*. In natürlicher Gröfse.
" 21. *Cassidaria cretacea*. In natürlicher Gröfse.
" 22. *Melongena rigida (Strombus fenestratus)*. In natürlicher Gröfse.
" 23. *Mitra Murchisoni*. a. Hintere, b. vordere Seite in natürlicher Gröfse.
" 24. *Mitra nana*. Vergrößert.
" 25. *Mitra pyruliformis*. a. Hintere, b. vordere Ansicht in natürlicher Gröfse.
" 26. *Rostellaria minuta*. In natürlicher Gröfse.
" 27. *Rostellaria granulosa*. In natürlicher Gröfse.
" 28. *Rostellaria arachnoides*. In natürlicher Gröfse.



- Figura 29. *Rostellaria furca*. In natürlicher Gröfse.
 „ 30. *Rostellaria Nilssoni*. In natürlicher Gröfse.
 „ 31. *Murex pleurotomoides*. In natürlicher Gröfse.

Tabula IV. ¹⁾

- Figura 1. *Turritella multistriata*, Reufs. In natürlicher Gröfse.
 „ 2. „ *sealineata*, Roemer. In natürlicher Gröfse.
 „ 3. „ *quinclineata*, Müller. In natürlicher Gröfse.
 „ 4 & 6. „ *multilineata*. In natürlicher Gröfse.
 „ 5. „ *Reufsiana*. In natürlicher Gröfse.
 „ 7. *Chemnitzia Kochi*. Vergrößert.
 „ 8. *Turritella gothica*. Stark vergrößert.
 „ 9. „ *socialis*. In natürlicher Gröfse.
 „ 10. „ *Eichwaldiana*, Goldfufs. In natürlicher Gröfse.
 „ 11. „ *affinis*, Müller. In natürlicher Gröfse.
 „ 12. „ *Omaliusi*. Vergrößert.
 „ 13. „ *scalaris*. In natürlicher Gröfse.
 „ 14. „ *Carnalliana*. In natürlicher Gröfse.
 „ 15. „ *acanthophora*. In natürlicher Gröfse.
 „ 16. „ *Althausi*. In natürlicher Gröfse.
 „ 17. „ *Humboldti*. In natürlicher Gröfse.
 „ 18. „ *nodosa*, Roemer. In natürlicher Gröfse.
 „ 19. „ *acutissima*, Müller. Stark vergrößert.

Tabula V.

- Figura 1. *Natica Klipsteini*. a. Rückseite, b. die untere Seite mit der Mundöffnung und Nabel.
 „ 2. *Triton cretaceum*. In natürlicher Gröfse a. hintere, b. vordere Seite.
 „ 3. *Scalaria striato-costata*. In natürlicher Gröfse.
 „ 4. *Actæon bulliformis*. Steinkern, einmal vergrößert.
 „ 5. *Rostellaria Roemeri*. Steinkern in natürlicher Gröfse.
 „ 6. *Turbo glaber*. In natürlicher Gröfse a. die untere Seite mit dem Nabel, b. die vordere Seite.

¹⁾ Wir machen hier abermals auf den Irrthum aufmerksam, dafs bei den Turritellen im Texte diese Tafel als Tafel 3 angegeben ist.

- Figura 7. *Turbo quadricinctus*. Vergrößert a. die hintere Seite, b. die untere Seite.
 „ 8. *Turbo quinquecinctus*. Vergrößert.
 „ 9. *Cerithium Ryckholtii*. In natürlicher Gröfse,
 „ 10. *Turbo paludiniformis*, d'Archiac. Vergrößert.
 „ 11. *Trochus Konincki*, Müller. In natürlicher Gröfse.
 „ 12. *Pleurotoma Heisiana*. In doppelter Gröfse.
 „ 13. *Fusus Nysti*. In natürlicher Gröfse.
 „ 14. „ *Budgei*. In natürlicher Gröfse.
 „ 15. „ *Buchi*. In natürlicher Gröfse.
 „ 16. „ *Decheni*. In natürlicher Gröfse.
 „ 17. „ *Burkhardi*. In natürlicher Gröfse.
 „ 18. „ *Dunkeri*. Bruchstück in natürlicher Gröfse.
 „ 19. „ *Salm-Dyckianus*. In natürlicher Gröfse.
 „ 20. „ *Næggerathi*. In natürlicher Gröfse.
 „ 21. „ *glaberrimus*. Steinkern in natürlicher Gröfse.
 „ 22 & 23. *Rapa Monheimi*. In natürlicher Gröfse fig. 22 mit erhaltener Bedeckung, fig.
 23 Steinkern.
 „ 24. *Voluta cingulata*. In natürlicher Gröfse a. Rückseite, b. Seite mit der Mundöffnung.
 „ 25. *Voluta nitidula*. Vergrößert a. hintere, b. vordere Seite.
 „ 26. *Voluta laticosta*. In natürlicher Gröfse a. hintere, b. vordere Seite mit der Mund-
 öffnung.
 „ 27. *Voluta d'Orbigniana*. In natürlicher Gröfse a. hintere, b. vordere Seite.

Tabula VI.

- Figura 1. *Pyrula minima*, Hæninghaus. Steinkern.
 „ 2. *Pyrula coronata*, Roemer. In natürlicher Gröfse.
 „ 3. *Cerithium foveolatum*, Müller. a In natürlicher Gröfse, b. ein Schalenstück vergrößert.
 „ 4. *Cerithium Sartorii*. In natürlicher Gröfse a. die hintere, b. die vordere Seite.
 „ 5. *Voluta Benedeni*. In natürlicher Gröfse a. vordere, b. hintere Seite.
 „ 6. *Fusus Göpperti*. In natürlicher Gröfse.
 „ 7. *Pyrella Beuthiana*. In natürlicher Gröfse, Steinkern.
 „ 8. *Cerithium Geinitzii*. In natürlicher Gröfse.
 „ 9. *Capulus militaris*. In natürlicher Gröfse.
 „ 10. *Capulus carinifer*. In natürlicher Gröfse.
 „ 11. *Capulus Troscheli*. In natürlicher Gröfse a. vordere, b. Seitenansicht.
 „ 12. *Crepidula cretacea*. In natürlicher Gröfse a. obere, b. innere Ansicht.

Figura 13. *Rhyncholithus Buchi*. A. Obere, B. untere Seite, C. Ansicht des Profils vom Fortsatz aus genommen.

- „ 14. *Rhyncholithus Debeyi*. A. Obere, B. untere Seite, C. Queransicht.
- „ 15. *Turritella cingulato-costata*. Vergrößert.
- „ 16. *Terebratula Hagenowi*. Vergrößert a. Ventral-, b. Dorsalschale.
- „ 17. *Terebratula Bosqueti*. Vergrößert a. Ventral-, b. Dorsalschale, c. Seitenansicht.
- „ 18. *Astarte F. Roemeri*. In natürlicher Gröfse.
- „ 19. *Mytilus oviformis*. In natürlicher Gröfse.
- „ 20. *Ostrea Bronni*. In natürlicher Gröfse.
- „ 21. *Turritella tenuilineata*. In natürlicher Gröfse.
- „ 22. *Rissoa Sandbergeri*. In natürlicher Gröfse.
- „ 23. *Ancillaria cretacea*. In natürlicher Gröfse.



Verzeichnifs der Gattungen und Arten.

(Die römische Ziffer bezeichnet die Abtheilung der Monographie, die arabische die Seitenzahl.)

A.

- Actæon giganteus*, II. 10.
„ *affinis*, II. 10.
„ *Doliolum*, II. 11.
„ *cylindraceus*, II. 11.
„ *bulliformis*, II. 11.
„ *acutissimus*, II. 11.
„ *coniformis*, II. 11.
Ananchytes ovata, I. 10.
„ *striata*, I. 10.
Ancillaria cretacea, II. 79.
Arca exaltata, I. 18.
„ *glabra*, I. 18.
Astarte cælata, I. 22.
„ *F. Roemeri*, II. 65.
Asterias quinqueloba, I. 5.
„ *Dunkeri*, I. 5.
„ *punctata*, II. 57.
Avellana Archiaciana, II. 12.
„ *paradoxa*, II. 12.
„ *Humboldti*, II. 12.
„ *Hagenowi*, II. 13.
Avicula gryphoides, I. 29.
„ *pectinoides*, I. 29.
„ *modioliformis*, I. 29.

B.

- Bulla cretacea*, II. 7.
Burgetocrinus ellipticus, II. 57.
Buccinum Steiningeri, II. 78.

C.

- Capulus militaris*, II. 50.
„ *carinifer*, II. 50.
„ *Troscheli*, II. 50.
Cardita Goldfusii, I. 20.
Cardium tubuliferum, I. 21.
„ *Becksii*, I. 21.
„ *semipustulosum*, I. 21.
„ *Debeyanum*, I. 21.
„ *Marquartii*, I. 22.
„ *alutaceum*, I. 22.
„ *galeatum*, I. 22.
„ *Noeggerathi*, II. 65.
„ *gibbosum*, II. 65.

- Cassidaria cretacea*, II. 17.
Cassidulus lapiscancræ, I. 8.
Catopygus pyriformis, I. 8.
„ *Goldfusii*, I. 45.
Cerithium fasciatum, II. 48.
„ *foveolatum*, II. 48.
„ *Rhyckholtii*, II. 49.
„ *Sartorii*, II. 49.
„ *Geinitzii*, II. 49.
„ *Nerei*, II. 49.
„ *binodosum*, II. 50.
Chemnitzia Kochi, II. 9. II. 77.
„ *turritelliformis*, II. 77.
„ *bulimoides*, II. 77.
Cidaris vesiculosa, I. 6.
Conus cylindraceus, II. 42.
Corbula striatula, I. 25.
„ *lineata*, I. 26.
„ *obtusa*, I. 26.
Crania parisiensis, I. 42.
„ *nummulus*, I. 42.
„ *antiqua*, I. 43.
„ *Ignabergensis*, II. 71.
Crassatella arcacea, I. 23.
„ *rugosa*, II. 66.
Crepidula cretacea, II. 51.
Cucullæa glabra, I. 19.
„ *Goldfusii*, I. 19.
„ *texta*, I. 19.
Cyprina rostrata, II. 64.
„ *Ligeriensis*, II. 64.

D.

- Dentalium glabrum*, II. 5.
„ *ellipticum*, II. 5.
„ *alternans*, II. 5. II. 76.
„ *rugosum*, II. 6.
„ *Mosæ*, II. 6.

E.

- Echinus*, I. 7.
Eulima acuminata, II. 9.
„ *lagenalis*, II. 9.
Exogyra lateralis, I. 40.
„ *laciniata*, I. 40.



Exogyra cornu arietis, I. 41.

„ *plicata*, I. 41.

„ *decussata*, I. 42.

„ *haliotoidea*, I. 42.

„ *Münsteri*, II. 70.

F.

Fissurella laevigata, II. 51.

Fusus Renauxianus, II. 34.

„ *Clementinus*, II, 34.

„ *Buchi*, II. 35.

„ *Decheni*, II. 35.

„ *Noeggerathi*, II. 35.

„ *Salm-Dykianus*, II. 36.

„ *Burkhardi*, II. 36.

„ *Nysti*, II. 36.

„ *Dunkeri*, II. 36.

„ *glaberrimus*, II. 36.

„ *Budgei*, II. 37.

„ *Göpperti*, II. 37.

„ *Hüpschianus*, II. 37.

„ *nanus*, II. 78.

G.

Galerites vulgaris, II. 58.

Gastrochæna amphibæna, II. 63.

„ *voracissima*, II. 63.

Gervillia solenoides, I. 29.

Globiconcha nana, II. 13.

H.

Holaster granulosus, I. 10.

„ *nodulosus*, I. 10.

„ *radiatus*, I. 10.

„ *suborbicularis*, II. 58.

I.

Inoceramus concentricus, I. 30.

„ *Cripsii*, I. 30.

„ *planus*, I. 30.

„ *Brongnarti*, I. 30.

„ *Cuvieri*, I. 31.

Isocardia cretacea, I. 19.

„ *trigona*, II. 64.

L.

Lima semisulcata, I. 33.

„ *multicostata*, I. 34.

Lima Sowerbyi, II. 67.

„ *rectangularis*, II. 67.

„ *pseudocardium*, II. 67.

„ *inflata*, II. 68.

„ *dentata*, II. 68.

Lithodomus discrepans, ¹⁾ I. 36. II. 69.

Litorina rotundata, II. 16.

Lucina lenticularis, I. 23.

„ *Geinitzii*, II. 66.

„ *tenuis*, II. 66.

Lysianassa designata, I. 28.

M.

Mactra angulata, II. 66.

Melongena fenestrata, II. 39.

„ *rigida*, II. 78.

Micraster cor testudinarium, I, 10.

„ *bufo*, II. 58.

Mitra Murchisoni, II. 23.

„ *nana*, II. 23.

„ *pyrulliformis*, II. 23.

Modiola faba, I. 30.

Modiolina Bosqueti, II. 69. I. 36.

Murex pleurotomoides, II. 24.

Mya elongata, I. 29.

Mytilus lineatus, I. 34.

„ *scalaris*, I. 35. II. 68.

„ *gryphoides*, II. 68.

„ *inflatus*, I. 35.

„ *lanceolatus*, I. 35.

„ *tewelatus*, I. 35.

„ *falcatus*, I. 35.

„ *reversus*, II. 68.

„ *oviformis*, II. 69.

N.

Natica canaliculata, II. 13.

„ *acutimargo*, II. 14.

„ *vulgaris*, II. 14.

„ *Klipsteini*, II. 14.

„ *exaltata*, II. 15.

„ *unicarinata*, II. 15.

„ *Geinitzi*, II. 15.

Naticella Strombecki, II. 16.

Nucleolites, I. 8.

¹⁾ Die mit Cursivschrift gesetzten Namen haben wir zurückgezogen.



- Nucula* Försteri, I. 16.
 „ caudata, I. 16.
 „ tenera, I. 17.
 „ siliqua, II. 64.
- O.**
- Ophiura* Fürstenbergii, I. 6.
Orbicula ciliata, II. 70.
Ostrea vesicularis, I. 37.
 „ carinata, I. 38.
 „ flabelliformis, I. 39.
 „ larva, I. 39.
 „ armata, I. 39. II. 69.
 „ hippopodium, I. 39.
 „ Nilssoni, II. 70.
 „ minuta, I. 39.
 „ multiformis, I. 40.
 „ Bronni, II. 69.
- P.**
- Panopæa* plicata, I. 28.
Pecten laminosus, I. 31.
 „ lævis, I. 31.
 „ membranaceus, I. 31.
 „ Pecten Nilssoni, I. 32.
 „ arcuatus, I. 32.
 „ divaricatus, I. 32.
 „ cretosus, II. 67.
 „ pulchellus, I. 33.
 „ quadricostatus, I. 33.
 „ quinquecostatus, I. 33.
 „ striato-costatus, I. 33.
 „ æquicostatus, I. 33.
Pectunculus sublævis, I. 17.
Pinna quadrangularis, I. 34.
Pleurotoma Heisiana, II. 46.
 „ induta, II. 46.
Pleurotomaria gigantea, II. 46.
 „ linearis, II. 47.
Pollicipes ornatissimus, I. 43.
Pyramidella involuta, II. 9.
Pyrella planulata, II. 39.
 „ Beuthiana, II. 39.
Pyrula minima, II. 39.
- R.**
- Rapa* coronata, II. 40.

- Rapa* Monheimi, II. 40.
Rhyncholithus cretaceus, I. 13.
 „ aquensis, I. 45.
 „ Buchi, II. 60.
 „ Debeyi, II. 61.
- Rissoa* costata, II. 8.
 „ incrassata, II. 76.
 „ Sandbergeri, II. 77.
 „ Winkleri, II. 8.
- Rostellaria* papilionacea, II. 18.
 „ inornata, II. 19.
 „ Roemeri, II. 19.
 „ minuta, II. 19.
 „ calcarata, II. 19.
 „ anserina, II. 20.
 „ Vespertilio, II. 20.
 „ Parkinsoni, II. 21.
 „ striata, II. 21.
 „ furca, II. 21.
 „ Nilssoni, II. 21.
 „ granulosa, II. 21.
 „ arachnoides, II. 22.
- S.**
- Salenia* anthophora, I. 7.
Scalaria pulchra, II. 7.
 „ striato-costata, II. 7.
 „ Philippi, II. 7.
 „ macrostoma, II. 8.
- Schizaster* lacunosus, I. 9.
 „ Bucardium, I. 9.
 „ Prunella, I. 9.
- Serpula* socialis, I. 12.
 „ gordialis, I. 12.
 „ implicata, I. 12.
 „ quadrangularis, I. 12.
 „ subtorquata, I. 12.
 „ Lophioda, I. 12.
 „ ampullacea, I. 12.
 „ cincta, I. 12.
 „ conica, I. 12.
 „ subrugosa, I. 12.
 „ tuba, II. 58.
 „ prolifera, II. 59.
 „ heptagona, II. 59.



- Serpula arcuata*, II. 59.
 „ *umbilicata*, II. 59.
Solen compressus, I. 28.
 „ *aqualis*, I. 28.
Spatangus hieroglyphicus, I. 9.
Spondylus truncatus, I. 34.
 „ *lineatus*, I. 34.
 „ *undulatus*, II. 68.
Strombus fenestratus, II. 17. II. 78.
 „ *inermis*, II. 17.

T.

- Talpina*, II. 59.
Tellina strigata, I. 27.
 „ *costulata*, I. 27.
 „ *Goldfusii*, I. 27.
 „ *plana*, I. 28.
Terebratula Pisum, I. 14.
 „ *subplicata*, I. 14.
 „ *Mantelliana*, I. 14.
 „ *compressa*, II. 62.
 „ *Hagenowii*, II. 62.
 „ *Bosqueti*, II. 62.
 „ *striatula*, I. 14.
 „ *chrysalis*, I. 14.
 „ *Gisii*, I. 14.
 „ *gracilis*, I. 15.
 „ *carnea*, I. 46.
 „ *semiglobosa*, I. 15.
 „ *minor*, I. 15.
 „ *pumila*, I. 15.
Tetragramma variolare, I. 7.
Thecidea papillata, II. 71.
 „ *digitata*, II. 71.
 „ *hieroglyphica*, II. 71.
Trigonia alliformis, I. 15. II. 63.
Triton cretaceum, II. 47.
Trochus onustus, II. 44.
 „ *Konincki*, II. 44.
Turbo levis, II. 43.
 „ *concinus*, II. 43.
 „ *cyclostomoides*, II. 43.
 „ *quinquecinctus*, II. 43.
 „ *quadricinctus*, II. 43.

- Turbo Walfredini*, II. 43.
 „ *glaber*, II. 43.
 „ *paludiniformis*, II. 44.
Turritella multistriata, II. 27.
 „ *quinquelineata*, II. 28.
 „ *Hagenowiana*, II. 28.
 „ *sexlineata*, II. 28.
 „ *Reufsiana*, II. 28.
 „ *multilineata*, II. 29.
 „ *Carnalliana*, II. 29.
 „ *gothica*, II. 29.
 „ *microscopica*, II. 29.
 „ *socialis*, II. 30.
 „ *scalaris*, II. 30.
 „ *Eichwaldiana*, II. 30.
 „ *affinis*, II. 31.
 „ *Omalusi*, II. 31.
 „ *acutissima*, II. 31.
 „ *Nöggerathiana*, II. 31.
 „ *nodosa*, II. 32.
 „ *Althausi*, II. 32.
 „ *Humboldti*, II. 32.
 „ *acanthophora*, II. 32.
 „ *alternans*, II. 33.
 „ *cingulato-lineata*, II. 33.
 „ *Buchiana*, II. 33.
 „ *tenuilineata*, II. 78.

V.

- Venus ovalis*, I. 24.
 „ *fabia*, I. 24.
 „ *plana*, I. 25.
 „ *tumida*, I. 25.
 „ *numismalis*, I. 25. II. 66.
Vermetus cochleiformis, II. 6.
Voluta d'Orbigniana, II. 40.
 „ *cingulata*, II. 41.
 „ *cincta*, II. 79.
 „ *nitidula*, II. 41.
 „ *Benedeni*, II. 41.
 „ *laticosta*, II. 41.
 „ *ambigua*, II. 42.
Volvaria tenuis II. 10.



Tab. IV.







292

